四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四一册目次

證治準繩六種四十四卷（三） （明）王肯堂撰 明萬曆三十年至三十六年刻本 〇〇一

證治準繩六種四十四卷（三）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

雜病證治類方第七冊目錄

目

【目痛】補肝散　止痛散　桔梗丸
柴胡復生湯　當歸養榮湯　助陽活血湯
黃連羊肝丸　決明益陰丸　當歸補血湯
抵聖散　菊花散　洗肝散
四物龍膽湯　本事地黃丸　桑白皮散
大黃丸　玄參丸　瀉肺湯
朱砂煎　洗眼青皮湯　決明子丸

乳香丸　住痛解毒丸　定痛飲
救苦散　一捻金　點眼金華水
黃牛膽煎　局方湯泡散　三因立勝散
局方洗心散　瀉熱黃連湯　二术散
通明散　補肝散　加味八正散
磁石丸　三因羌活散　參芪麢角湯
槐子丸　上清散　加減知母湯
【目痒】還陰救苦湯　菊花決明散
神驗錦鳩丸　萬應蟬花散　芍藥清肝散

通氣利中丸　黃連天花粉丸　黃連爐甘石散
龍腦黃連膏　蕤仁春雪膏　搐鼻碧雲散
川芎行經散　消凝大丸子　菊花散
散熱飲子　竹葉湯　龍膽飲
決明子湯　麥門冬湯　瀉肝散
助陽和血補氣湯　退赤散　退赤丸（退赤　去赤脈）
碧天丸　本事針頭丸　救苦丸
廣大重明湯　滌風散　攻毒散
湯泡散　垂柳枝煎　銅青湯

拜堂散　宣明丸　分珠散
麥門冬湯　通血丸　膽歸糖煎散
車前散　真珠散　退血散
點眼蕤仁膏　魚膽傅眼膏　【目腫脹】金絲膏
琥珀煎　滌風散　神芎丸
瀉肝散　救睛丸　搜風散
還睛丸　糖煎散　田螺膏
洗痒散　洗翳散　土硃膏
清涼膏　地黃膏　【目淚】驅風一字散

子141-002

四生散　人參羌活散　菩薩散
杏仁龍膽草泡散　外障　羌活除翳湯
撥雲湯　流氣飲　撥雲散
神仙退雲丸　羌活退翳湯　消翳散 二方
五秀重明丸　羚羊角散　補陽湯
連蘗益陰丸　升陽泄陰丸　羌活勝風湯
撥雲退翳丸　梔子勝奇散　磨障靈光膏
消翳復明膏　通脾瀉胃湯　神消散
犀角丸　犀角飲　炙肝散

洗眼紫金膏　知母飲子　蕤仁散
洗肝散　桑白皮湯　琥珀散
雞距丸　防風瀉肝散　磁石丸
七寶丸　七寶湯　清涼散
洗刀散　二黃散　定心丸
南硼砂散　抽風湯　地黃散
七寶膏　羚羊角飲子　補腎丸
退熱飲子　青葙子丸　琥珀煎
荊防菊花散　白蘚皮湯　菊花散

磨光散　甘菊花散　道人開障散
撥雲散　五退散　朱僧熱翳方
珍珠退翳散　決明子散　真珠散
開明丸　去翳聖金膏　捲簾散
照水丸　通光散　指甲散
珊瑚散　青金丸　豬膽方
枸杞煎　雀乳煎　真珠膏
雞子殼散　羌活退翳膏　蠍附散
玉餅子　照水丸　內障　人參補胃湯

黃芩黃連湯　復明散　羌活退翳丸
冲和養胃湯　益氣聰明湯　瀉熱黃連湯
千金磁砞丸　石斛夜光丸　益陰腎氣丸
滋陰地黃丸　羚羊角湯　杏仁方
羚羊角散 二方　還睛散　蘆薈丸
大黃瀉肝散　墜翳丸　磁石丸
補肝散 二方　補腎丸　羚羊角飲子
生熟地黃丸　通肝散　八味還睛散
空青丸　涼膽丸　還睛丸 二方

除風湯　羅漢應夢丸　神仙碧霞丹
遠志丸　明目地黃丸　固本還睛丸
還睛丸　仙朮散　夢靈丸
五退還光丸　空青丸　蕤仁丸
觀音丸　八子丸　靈圓丹
磨翳丸　退翳丸　石決明散
韓相進靈丹　甘菊湯　太陰玄精石散
羗肝散　蟬花散　開明散
草龍膽散　菩薩膏　立應散

蟾光膏　碧霞膏　日精月華光明膏
熟地黃丸　保命當歸湯　濟陰地黃丸
抑陽酒連散　羊肝丸　千金補肝散
養肝丸　**目昏花**　地黃丸　補肝湯
雷巖丸　補肝丸　石決明丸
益本滋腎丸　補腎丸　羚羊羌活湯
菊睛丸　石決明丸　駐景丸
加減駐景丸　白附子散　補腎磁石丸
三仁五子丸　羚羊角散　蕤仁丸

摩頂膏二方　決明丸　白龍粉即玄明粉
羗肝散　芎藭散　磁石丸
四物五子丸　杞苓丸　瑞竹四神丸
夜光丸　密蒙花散　還睛補肝丸
鎮肝丸　真珠煎　青魚膽方
金絲膏　決明夜靈散　蛤粉丸
瀉肺飲　猪肝散　夜明丸
轉光丸　瀉膽散　天門冬飲子
玄參瀉肝散　牛黃膏　黃芪防風飲子

無比蔓荊子湯　青黛散　四退散
起睫膏　神効黃芪湯　連翹飲子
排風散　龍膽丸　菊花通聖散
柴胡散　黃連散　爐甘石散
當歸飲子　河間當歸湯　枸杞酒
二妙散　洗肝湯　瀉肝湯
木賊散　決明子方　羌活散二方
菊花散　蟬蛻餅子　阿膠散
本事二方　川芎丸　銀海止淚方

立應散　猪實散　白殭蠶散
眞珠散　乳汁煎　止淚散
麝香散　消毒飲　防風散結湯
五花丸　白薇丸　竹葉瀉經湯
蜜劑解毒丸　東垣龍膽飲子　地芝丸
定志丸　除風益損湯　加減地黃丸
加味四物湯　局方黑神散　内消散二方
經効散　一綠散　人參補陽湯
前胡犀角湯　茺蔚子丸　瀉肝散

羚羊角散　消毒化斑湯　決明散
蜜蒙散　蛇皮散　蟬蛻散
浮萍散　退翳散　穀精散
神功散　通神散　鱔血方
蟬花無比散　還睛丸　七寶散
撥雲散　蟬殼散　局方蜜蒙花散
三因羌活散　本事羊肝丸　地黃散
補肝散　陽丹　陰丹
日精丹　月華丹　光明丹

白龍丹　爐甘石散　紫金錠子
熊膽膏錠　開明膏　消翳復明膏
爐甘石膏　夜光膏　黃連膏
日精月華光明膏　碧玉散
乳香散　吹雲膏　金露膏
寶鑑春雪膏　點眼金絲膏　龍腦膏
散血膏　清淚膏

雜病證治類方第七冊

金壇王肯堂宇泰輯

目

目痛　補肝散簡易治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及羞明怕日

夏枯草伍錢　香附子壹兩

右爲末每服壹錢臘茶調下服無時

本事方治睛疼難忍者

川當歸　防風　細辛

薄荷各等分

右爲末每服貳錢麥門冬熟水調下食後日午夜卧各壹服

止痛散保命治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脉弦作内障也得之於飢飽勞役

柴胡壹兩半　甘草炙七錢半　瓜蔞根貳兩

當歸壹兩　黃芩肆兩一半酒浸一半炒

生地黃壹兩

右爲麤末每服叁錢水壹盞半薑叁片棗壹枚臨卧熱服小便不利加茯苓澤瀉各伍錢

桔梗丸保命治太陽經衛虛血實目腫赤瞼重頭中濕淫膚瞖睛痛肝風盛眼黑腎虛

桔梗壹斤　牽牛頭末貳兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服肆伍拾丸至壹伯丸食前溫水下日貳次

柴胡復生湯原機治紅赤羞明淚多眵少腦巔沉重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則痠疼翳陷下所陷者或圓或方或長或短如縷如錐如鑿

柴胡陸分　蒼朮　茯苓

黃芩各半錢　薄荷　桔梗

炙甘草　白芍藥各肆分　羌活

獨活　藁本　蔓荆子

川芎　白芷各叁分半　五味子貳拾粒

水貳盞煎至壹盞去滓食後熱服

右方以藁本蔓荆子爲君升發陽氣也川芎白芍羌活獨活白芷柴胡爲臣和血補血[illegible]

風行厥陰經也甘草五味子爲佐爲協諸藥斂藏氣也薄荷桔梗蒼木茯苓黃芩爲使爲凊利除熱去濕分上下實脾胃二土療目中赤腫也此病起自七情五賊勞役饑飽故使生意下陷不能上升今主以羣隊升發輔以和血補血導入本經助以相協收斂用以凊利除熱實脾胃也睛珠痛甚者當歸養榮湯主之

當歸養榮湯　治睛珠痛甚不可忍餘治同上

白芍藥　熟地黃　當歸
川芎各壹錢　羌活　防風
白芷各柒分半

右煎服法同上

右方以七情五賊勞役飢飽重傷脾胃脾胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎今生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經爲君白芍藥止痛益氣通血承接上下爲臣熟地黃補腎水眞陰爲佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰經爲使血爲邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服也服此藥後睛痛雖除眼睫無力常欲垂閉不減者助陽活血湯主之

助陽活血湯　治眼睫無力常欲垂閉餘治同上

黃芪　炙甘艸　當歸
防風各伍分　白芷　蔓荆子各肆分

升麻　柴胡各柒分

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服

右方以黃芪治虛勞甘草補元氣爲君當歸和血補血爲臣白芷蔓荆子防風主療風升陽氣爲佐升麻導入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥經肝經爲使心火乘金水衰反制者亦宜服也有熱者兼服黃連羊肝丸

黃連羊肝丸　治目中赤脉紅甚眵多餘治同上

黃連　白羯羊肝壹個

先以黃連研爲細末將羊肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入擂盆中研細入黃連末爲丸如梧子大每服叁伍拾丸加至柒捌拾丸茶清湯下忌猪肉及冷水

右方以黃連除熱毒明目爲君以羊肝肝與肝合引入肝經爲使不用鐵器者金尅木肝乃木也一有金氣肝則畏而不受蓋專治肝經之藥非與群隊者比也肝受邪者並皆治之睛痛者加當歸

決明益陰丸　治畏日惡火沙澀難開眵淚俱多久病不痊者並皆治之餘治同上

羌活　獨活　歸尾酒製

五味子　甘草炙　防風各伍錢

石決明煅叁錢　草決明　黃芩

黃連酒製　黃蘗　知母各壹兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服伍拾丸加至壹百丸茶湯下

右方以羌活獨活升清陽爲君黃連去熱毒當歸尾行血五味收歛爲臣石決明明目磨障草決明益腎療盲防風散滯袪風黃芩去目中赤腫爲佐甘草協和諸藥黃蘗助腎水知母瀉相火爲使此蓋益水抑火之藥也內急外弛之病並皆治之

加減地黃丸　除風益損湯俱見爲物所傷

龍腦黃連膏　嗃鼻碧雲散俱見目赤

當歸補血湯原機　治男子衄血便血婦人產後崩

漏亡血過多致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼瞼無力眉骨太陽俱各酸痛

當歸　熟地黃各陸分　川芎

牛膝　白芍藥　炙甘草

白朮　防風各伍分　生地黃

天門冬各肆分

水貳觥煎至壹觥去滓稍熱服惡心不進食者加生薑煎

右方專補血故以當歸熟地黃爲君川芎下

勝白芍藥為臣以其祛風續絕定痛而通血
血也甘草白朮大和胃氣用以為佐防風升
發生地黃補腎天門冬治血熱謂血亡生風
燥故以為使

滋陰地黃丸（見目昏）　選奇湯（見頭痛）

抵聖散　治目偏風牽疼痛

荊芥穗（兩）　芎藭　羌活（去蘆）
楮實（炒）　木賊（各壹兩）　甘草（炙半兩）

右為細末每服貳錢食後茶清調服

菊花散（本事）治肝腎風毒氣上衝眼痛

甘菊花　牛蒡子（炒各捌兩）　防風（叁兩）
白蒺藜（去刺壹兩）　甘草（伍錢）

右為細末每服貳錢熟水調下食後臨卧

瀉青丸　治眼暴發赤腫疼痛（見心頭痛）

洗肝散（和劑）治風毒上攻暴作赤目腫痛難開瘾
澀眵淚

薄荷葉　當歸　羌活
防風　山梔仁　甘草（炙）

大黃　川芎（各貳兩）

右為細末每服貳錢食後熱水調下

四物龍膽湯（海藏）治目赤暴作雲翳疼痛不可忍

四物湯（各半兩）　羌活　防風（各叁錢）
草龍膽（酒拌炒焦）　防己（各貳錢）

右水煎服

本事地黃丸　治風熱上攻眼目澀痛不可服
補藥者

熟地黃（壹兩半）　黃連　決明子（各壹兩）

没藥　菊花　防風
羌活　肉桂　朱砂（各半兩）

細末蜜丸梧子大每服叁拾丸食後熟水下

桑白皮散　治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛
腫脹日夜疼痛心胸煩悶

桑白皮　玄參　川升麻
旋覆花（去梗）　赤芍藥　杏仁
甘菊花（去枝梗）　甜葶藶（炒）　防風（去蘆）
黃芩　枳殼（去穰麩炒）　甘草（炙各壹兩）

子141 009

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑叁片煎至
捌分去滓食後温服

大黄丸　治白睛腫脹痛不可忍

大黄（剉炒）　蔓荊子（去皮）　甘菊花
土瓜根　防風（去叉）　陳皮（去白）
青皮（去瓤）　黄連（去鬚）　前胡
丹參　吳藍　萎蕤（各壹兩）
決明子（微炒）　冬瓜子　青葙子
地膚子　車前子（各壹兩半）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾
丸食前用温酒送下

玄參丸　治肺藏積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開
張不得赤澁疼痛

玄參　川升麻　漢防巳
羚羊角屑　沙參　車前子
梔子仁　桑根白皮　杏仁（湯浸去皮尖雙仁麸炒黄各壹兩）
大麻仁　川大黄（微炒各壹兩半）

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服貳拾丸
食後以温水送下臨卧時再服

瀉肺湯　治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活　玄參　黄芩（各壹兩半）
地骨皮　桔梗　大黄
芒硝（各壹兩）

右剉碎每服伍錢水壹盞煎至伍分去滓食
後温服

朱砂煎　治眼白睛腫起赤澁疼痛

朱砂（細研）　杏仁（湯浸去皮尖）　青鹽（各貳錢半）
馬牙硝（細研）　黄連（研末各半兩）

右研勻綿裹以雪水叁合浸壹宿濾入磁盒
中每用以銅筯點之

洗眼青皮湯　治眼白睛腫起赤磣痛痒

青皮（去瓤）　桑根白皮　萎蕤（各壹兩）
川大黄　玄參　梔子仁
青鹽（湯澄下各半兩）　竹葉（壹握）

以水貳大盞煎至壹盞半入鹽濾去滓微熱
淋洗冷即再煖

附方

治睛痛難忍者

白芷　細辛　防風

赤芍藥各等分

右為末每服叄錢水壹盞入砂糖貳錢同煎至柒分去滓不拘時溫服

決明子丸　治風熱上衝眼目或因外受風邪疼痛視物不明

決明子炒　細辛去苗　青葙子

蒺藜炒去角　茺蔚子　芎藭

獨活　羚羊角鎊　升麻

防風去叉各半兩　玄參　枸杞子

黃連去鬚各叄兩　菊花壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳拾丸加至叄拾丸淡竹葉煎湯送下

乳香丸　治眼疼頭痛或血攻作筋急遍身疼痛

五靈脂貳錢　乳香　沒藥

夏蠶沙　草烏各半兩　木鱉子伍枚

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服柒丸薄荷茶湯下如頭疼連進叄服即止

住痛解毒丸

川芎　荊芥　朴硝

白芷　石膏　菊花各壹兩

鵬砂伍兩　沒藥伍錢　麝香少許

右為細末米糊丸梧桐子大溫湯下

定痛飲

防己壹兩　當歸　黃芩各伍錢

右㕮咀水壹盞半煎至壹盞入紅酒半盞溫服

救苦散　治眼睛痛不堪忍

川芎　當歸　防己

防風各半兩

右為細末每服叄錢熱酒調服

一捻金　治眼睛痛

乳香　沒藥　黃連

雄黃　盆硝各等分

右為細末鼻內搐之　一方加腦麝少許

點眼金華水　治肝藏有熱血脉壅滯津液不榮目中澀痛

黃連末壹分　硇砂研皂豆大　乳香黑豆大研

銅綠壹字煅過　膩粉七研壹錢　杏仁去皮尖拾枚入雙仁研

龍腦研　滑石研　艾灰研各半錢七

青古老錢柒文與前藥

右已上九味研細令勻與古老錢在綿子內以井華水浸三七日後點目眥頭

黃牛膽煎　治眼澀痛

黃牛膽汁　鯉魚膽汁　猪膽汁

羊膽汁各半合　胡黃連研末　熊膽

黃連研末　青皮研末各貳錢半　白蜜叁兩

右將諸藥末與蜜并膽汁和勻入甆瓶內以油紙封頭牢繫坐飯甑中蒸待飯熟為度用新淨綿濾過每以銅筯取如麻子大點目眥日貳叁度

治眼澀痛方　治目澀痛不能視物及看日光并見燈火光不得者用熟羊頭眼中白珠子貳枚於細石上和棗汁研之取如小豆大安眼睛上仰卧日二夜一不過三四度瘥

局方湯泡散　治肝經風熱上壅眼目赤澀睛疼多淚

赤芍　當歸　黃連等分

右為末每貳錢湯頓調熱洗日三五次御藥院方加荊芥

三因立勝散　治風熱攻眼隱澀羞明腫痛

黃連　秦皮　防風

黃芩各等分

右㕮咀水煎熱用新羊毫筆蘸刷洗眼

天行赤熱證須審係何氣暴上法并目赤條分經絡陰陽表裏以施治不拘一方

暴風客熱證　風勝者羌活勝風湯見外障　熱勝者局方洗心散東垣瀉熱黃連湯　風熱俱盛洗肝散見前　瀉青丸見頭痛

局方洗心散　治風壅壯熱頭目昏痛熱氣上衝口舌唇焦咽喉腫痛心神煩躁多渴五心煩熱小便赤澀大便秘滯

大黃煨　甘草　當歸
芍藥　麻黃　荊芥穗各陸錢
白朮伍錢

右爲末每服貳叁錢生薑薄荷湯煎服以白朮合

大黃入心故名洗心而從以麻黃荊芥亦是表裏藥

東垣瀉熱黃連湯　治眼暴發赤腫疼痛

黃芩酒製炒　黃連製同上　草龍膽
生地黃　柴胡各壹兩　升麻半兩

㕮咀每服肆錢水煎去滓日午前飯後熱服

按此手少陰太陰足陽明少陽少陰藥也

火脹大頭證普濟消毒飲子見頭痛

羞明怕熱證決明益陰丸見前　明目細辛湯見旧

連翹飲子見眼急小　吹雲膏見通治

瞼硬睛疼證通肝散見內障

二朮散　治瞼硬睛疼去翳障

蟬蛻　白朮　黃連
枸杞子　蒼朮米泔浸炒　龍膽草
地骨皮　牡丹皮各等分

右爲末每服壹錢食後荊芥湯下

赤痛如邪證小柴胡湯見往來寒熱　合四物湯見虛勞

氣眼證復元通氣散見氣

治氣眼方

石決明　草決明　楮實子
香附子　木賊　甘草
蟬蛻去足　川芎各等分

右爲細末茶清下

又方

石決明　草決明　香附子
蚌粉各等分

右爲細末每服貳錢茶清調下

通明散　治氣眼凡人之目必患後損其經絡喜怒哀樂之情有傷於心發作不時此乃輪受病故也

升麻　山梔子各壹兩半　細辛
川芎　白芷　防風
羌活　草決明　白芨
白斂　夏枯草各壹兩　揚梅皮
蟬蛻　五倍子各伍錢　甘草壹錢
右㕮咀每服叁錢水壹盞半淡竹葉柴皮同
煎食後溫服
痛如針刺證　洗心散見前　加味八正散見後　還
睛散見內障

補肝散　治眼痛如針刺外障
人參　茯苓　芎藭
五味子　藁本各壹兩　細辛
羌蔚子各壹兩半
右為細末每服壹錢空心米飲調服
熱結膀胱證　五苓散見消癉　導赤散見淋　益元
散見傷暑
加味八正散　治心熱衝眼赤腫澀痛熱淚羞
明

瞿麥　扁蓄　滑石
車前子　甘艸　梔子
木通　大黃　桑白皮
燈心　苦竹葉　生地黃
右水煎食後服
大小雷頭風證　左右偏頭風證治見頭痛門
磁石丸　治雷頭風變內障
磁石燒赤醋淬叁次　五味子炒　乾薑
牡丹皮　玄參已上各壹兩　附子炮半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸
食前茶清或鹽湯送下
三因羌活散　治風毒上攻眼目昏澀翳膜生
瘡及偏正頭疼目小黑花累累者
羌活　川芎　天麻
旋覆花　青皮　南星炮
藁本各壹兩
右為末每服貳錢水煎入生薑叁片薄荷柴
葉

參芪羚角湯　治風牽眼偏斜外障

羚羊角 鎊　防風　五味子

赤茯苓　人參 各壹兩　黄芪

茺蔚子　知母 各壹兩半

右水煎食後服

槐子丸　治肝虛風邪所攻致目偏視

槐子仁 貳兩　酸棗仁 微炒　覆盆子

柏子仁　車前子　蔓荊子

茺蔚子　牛蒡子　蒺藜子 各壹兩

右為末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸空心溫白湯送下

陰邪風證　選奇湯　祛風清上散 俱見頭痛

上清散　治頭風痛眉骨痛眼痛

川芎　鬱金　赤芍藥

荊芥穗　薄荷葉　芒硝 各半兩

乳香 另研　没藥 另研各壹錢　腦子 半錢另研

右為細末每用壹字鼻內搐之甚妙

陽邪風證　小芎辛湯 見頭痛

正偏風證外證羌活勝風湯 見外障 內證沖和養胃湯 見內障

巔頂風證　挾痰濕者動輒眩暈用

大黃 [illegible]　酒芩 叁錢　白殭蠶

酒天麻　陳皮 鹽煮去白　桔梗 各伍錢

半夏 [illegible]　薄荷葉 叁錢

白芷　青礞石 各貳錢

右末之滴水丸如菉豆大食後臨卧茶吞貳錢　分外內證治同前

逆風證加減知母湯

知母 貳錢　黄耆 去蘆　白术

羌活　防風　明天麻

甘菊花　山茱萸肉　蔓荊子

藁本　川芎　當歸 各壹錢

細辛　甘草 各伍分

水貳鍾煎至壹鍾溫分貳服日三　頭面腫加牛蒡子 炒研 貳錢

邪風證　羌活勝風湯 見外障

目赤 還陰救苦湯原機 治目久病白睛微變青色黑睛稍帶白色黑白之間赤環如帶謂之抱輪紅視物不明昏如霧露中睛白高低不平其色如死甚不光澤口乾舌苦眵多羞澀上焦應有熱邪

升麻　蒼朮　桔梗
甘草炙　柴胡　防風
羌活各半兩　細辛貳錢　藁本肆錢
川芎壹兩　紅花壹錢　當歸尾柒錢

黃連　黃芩　黃蘗
知母　連翹　生地黃各半兩
龍膽草叁錢

每服柒錢水貳盞煎至壹盞去滓熱服

右方以升麻蒼朮甘草諸主元氣爲君爲損者溫之也以柴胡防風羌活細辛藁本諸升陽化滯爲臣爲結者散之也以川芎桔梗紅花當歸尾諸補行血脉爲佐爲留者行之也以黃連黃芩黃蘗知母連翹生地黃龍膽草諸去除熱邪爲使爲客者除之也奇經客邪之病強陽搏實陰之病服此亦具驗

菊花決明散 治證同上

草決明　石決明東流水煮壹伏時另研極細入藥
木賊草　防風　羌活
蔓荊子　甘菊花　甘草炙
川芎　石膏另研極細入藥　黃芩各半兩

爲細末每服貳錢水壹盞半煎捌分連末服食後

右方以明目除翳爲君者草決明石決明木賊草也以散風升陽爲臣者防風羌活蔓荊子甘菊花也以和氣順血爲佐者甘草川芎也以療除邪熱爲使者黃芩石膏也內急外弛之病亦宜其治

神驗錦鳩丸 治證同上兼口乾舌苦眵多羞澀上焦邪熱

甘菊花　牡蠣洗煆粉各伍錢　肉桂貳兩
瞿麥　蕤仁去皮　草決明

羌活各叁兩　白茯苓肆兩　蒺藜炒去尖
細辛　防風　黃連各伍兩
斑鳩壹隻跌死去皮毛腸嘴以文武火慢炙乾
羯羊肝壹具竹刀切片批炙令焦乾研細少
蔓菁子以井水淘淨蒸一伏時曬乾
右爲細末煉蜜爲劑杵五百下丸如梧子大每服貳拾丸加至叁伍拾丸空心溫湯下
右方以甘菊花草決明主明目爲君以蕤仁牡蠣黃連蒺藜除濕熱爲臣以防風羌活細辛之升上瞿麥茯苓之分下爲佐以斑鳩補腎羊肝補肝肉桂導群藥入熱邪爲使此方制之大者也腎肝位遠服湯藥散不厭頻多之義也

萬應蟬花散　治證同上
蟬蛻去土半兩　蛇蛻炙叁錢　川芎
防風　羌活　炙甘艸
當歸　白茯苓各壹兩　赤芍藥叁兩
蒼朮肆兩　石決明用東流水煮一伏時研極細末兩半

右爲細末每服貳錢食後臨卧時濃米泔調下熱茶清亦得
右方制之複者也奇之不去則偶之是爲重方也今用蟬蛻又用蛇蛻者取其重蛻之義以除翳爲君也川芎防風羌活皆能清利頭目爲臣也甘草蒼朮通主脾胃又脾胃多氣多血故用赤芍藥補氣當歸補血爲佐也石決明鎮墜腎水益精還陰白茯苓分陰陽上下爲使也亦治奇經客邪之病

黃連羊肝丸　助陽活血湯俱見目痛　千金磁石丸見內障
芍藥清肝散原機　治眵多眊矂緊澀羞明赤脉貫睛臟府祕結者
白朮　川芎　防風
羌活　桔梗　滑石
石膏各叁分　黃芩　薄荷
荊芥　前胡　炙甘草
芍藥各貳分半　柴胡　山梔

知母各貳分 大黃肆分 芒硝叁分
水貳鍾煎至壹鍾食後熱服

右方為治淫熱反尅而作也風熱不制之病熱甚大便鞕者從權用之盖苦寒之藥也苦寒敗胃故先以白朮之甘温甘草之甘平主胃氣為君次以川芎防風荊芥桔梗羌活之辛温升散清利為臣又以芍藥前胡柴胡之微苦薄荷黃芩山梔之微苦寒且導且攻為佐終以知母滑石石膏之苦寒大黃芒硝之大苦寒祛逐淫熱為使大便不鞕者減大黃芒硝此逆則攻之治法也大熱服者反治也

通氣利中丸 治證同上

白朮壹兩 白芷 羌活各半兩
黃芩 滑石取末各壹兩半 大黃貳兩半
牽牛取末壹兩半

除滑石牽牛另研極細末外餘合為細末入上藥和勻滴水為丸如桐子大每服叁拾丸加至百丸食後臨睡茶湯下

右方以白朮苦甘温除胃中熱為君白芷辛温解利羌活苦甘平微温通利諸節為臣黃芩微苦寒齊熱滋化滑石甘寒滑利小便以分清濁為佐大黃苦寒通大便瀉諸實熱牽牛辛苦寒利大便除風毒為使逆攻之法也風熱不制之病熱甚而大便鞕者亦可兼用然牽牛有毒非神農藥今與大黃並用者取性猛烈而快也大抵不宜久用久用傷元氣盖從權之藥也量虛實加減

黃連天花粉丸 治同上

黃連 菊花 川芎
薄荷各壹兩 連翹貳兩 天花粉
黃芩 山梔子各肆兩 黃蘗陸兩

為細末滴水丸如梧子大每服伍拾丸加至百丸食後臨卧茶清下

右方為淫熱反尅藏府不祕結者作也風熱不制之病稍熱者亦可服以黃連天花粉之苦寒為君菊花之苦甘平為臣川芎之

薄荷之辛苦為佐連翹黃芩之苦微寒黃蘗梔子之苦寒為使合之則除熱清利治目赤腫痛

黃連爐甘石散　治眼眶破爛畏日羞明餘治同上

爐甘石壹斤　黃連肆兩　龍腦量入

先以爐甘石置巨火中煅通紅為度另以黃連用水壹盞磁器盛貯納黃連於水內却以通紅爐甘石淬七次就以所貯磁器置日中

曬乾然後同黃連研為細末候用時以壹錢貳兩再研極細旋量入龍腦每用少許井花水調如稠糊臨睡以筯頭蘸傅破爛處不破爛者點眼內眥鋭眥尤佳不宜使入眼內

右方以爐甘石收濕除爛為君黃連苦寒為佐龍腦去熱毒為使諸目病者俱可用病宜者治病不宜者無害也奇經客邪之病量加朴硝泡湯滴眼瘀肉黃赤脂上

龍腦黃連膏　治目中赤脈如火溜熱炙人除治同上

黃連半斤　龍腦壹錢

先剉黃連令碎以水三大碗貯磁器內入黃連於中用文武火慢熬成大半碗濾去滓入薄磁碗內重湯頓成膏半盞許龍腦以壹錢為率用則旋量入之以筯頭點入眼內不拘時

右方以黃連治目痛解諸毒為君龍腦去熱毒為臣乃君臣藥也諸目痛者俱宜用

蕤仁春雪膏　治紅赤羞明眊矂癢痛沙澀

蕤仁去油肆錢　龍腦伍分

先以蕤仁研細入龍腦和勻用生好真蜜壹錢貳分再研調勻每用筯頭點內眥鋭眥

右方以龍腦除熱毒為君生蜜解毒和百藥為臣蕤仁去暴熱治目痛為使此藥與黃連爐甘石散龍腦黃連膏並用

嗜鼻碧雲散　治腫脹紅赤昏暗羞明癮澀疼痛風癢鼻塞頭痛腦痠外翳攀睛眵淚稠粘

鵞不食草貳錢 青黛 川芎各壹錢

爲細末先噙水滿口每用如米許嗃入鼻内以淚出爲度無時

右方以鵞不食草解毒爲君青黛去熱爲佐川芎大辛除邪破留爲使升透之藥也大抵如開鍋盖法常欲使邪毒不閉令有出路然力少而銳嗃之隨効宜常嗃以聚其力諸目病俱可用

羌活勝風湯見外障

川芎行經散 治目中青黲如物傷狀重者白睛如血貫

羌活 白芷 防風

荊芥 薄荷 蔓荊子

獨活各肆 柴胡 炙甘草

當歸 川芎 枳殼各陸

桔梗伍、 茯苓叁分 紅花少許

水貳盞煎至壹盞去柤大熱服食後

右方以枳殼甘草和胃氣爲君白芷防風荊芥薄荷獨活療風邪升胃氣爲臣川芎當歸紅花行滯血柴胡去結氣茯苓分利除濕爲佐羌活蔓荊子引入太陽經桔梗利五藏爲使則胃脉調小腸膀胱皆邪去凝行也見熱者以消凝大丸子主之

消凝大丸子 治證同上或有眵淚沙澁並治

川芎 當歸 桔梗

炙甘草 連翹 菊花各七錢

防風 荊芥 羌活

藁本 薄荷各半兩 滑石

石膏 白朮 黃芩

山梔各壹兩

先將滑石石膏另研餘作細末和勻煉蜜爲劑每劑壹兩分捌丸每服壹丸或貳丸茶湯嚼下

右方消凝滯藥也君以川芎當歸治血和血臣以羌活防風荊芥藁本薄荷桔梗療風散邪引入手足太陽經佐以白朮甘草滑石石

嘗謂補胃虛通泄滯氣除足陽明經熱使以黃芩山梔連翹菊花去熱除煩淫反尅風熱不制者俱宜服也

黑神散見鼻衄　消風散見頭痛

洗肝散丸目赤

菊花散和劑治肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澀痛

白蒺藜炒去刺　羌活去蘆不見火　木賊去節

蟬蛻去頭足翅各叁兩　菊花陸兩

爲細末每服貳錢食後茶清湯調服

四物湯見虛勞　養正丹　蘇子降氣湯並見氣

黑錫丹並見上　三黃丸見熱　四物龍膽湯見目痛

散熱散子保命治眼赤暴發腫

防風　羌活　黃芩

黃連各壹兩

每服半兩水貳盞煎食後溫服　大腑祕加大黃壹兩　痛甚加川當歸地黃　煩躁不得臥加梔子壹兩

寫青丸見頭痛

竹葉湯　治肝臟實熱目赤腫痛

淡竹葉　黃芩去黑心　犀角屑

木通各壹兩　車前子　黃連去鬚

玄參各壹兩貳錢半　芒硝貳兩　梔子仁

大黃壹兩半微炒各

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至捌分去滓食後溫服

龍膽飲　治同前

龍膽草　梔子仁各貳錢　防風

山茵陳　川芎　玄參

荊芥　甘菊花　楮實

甘草各壹錢

右爲細末每服壹錢半食後茶清調下

決明子湯　治肝臟實熱目眥生赤肉澀痛

決明子炒　柴胡去苗　黃連去鬚

苦竹葉　防風去叉　升麻各壹兩錢半

細辛去苗貳錢半　菊花　甘草炙各半兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎捌分去滓食後温服

麥門冬湯 治肝實熱毒氣上熏於目赤腫痛痒

麥門冬 去心 秦皮 去麤皮 赤茯苓 去黑皮

萎蕤 各壹兩半 大黃 生用 升麻 各壹兩

右剉片每服伍錢水壹盞半入竹葉拾片煎至捌分去滓入朴硝末壹錢更煎令沸空心温服

瀉肝散 治肝熱赤眼腫痛

梔子仁 荊芥 大黃

甘草 已上各等分

每服貳錢水煎食後服

羊肝丸 見目痛

助陽和血補氣湯 東垣 治眼發上熱壅白睛紅眵多淚無疼痛而癮澀難開此服寒藥太過而眞氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣 方見目痛

退赤散

大黃 黃芩 黃連

白芷 赤芍藥 當歸

山梔子 各等分

右剉爲散桑白皮同煎食後服

退赤丸

生地黃 草決明 黃芩

當歸 白朮 木通

連翹 甘草 各等分

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服肆拾丸淡竹葉煎湯呑下

退赤

山梔子 壹兩 當歸 伍錢 酒浸 大黃 煨

甘草 炙 各貳錢

右㕮咀爲散每服叁錢水壹盞半煎至柒分去滓温服

去赤脉

赤芍藥 貳兩 川芎 熟地黃

當歸　山梔子各壹兩
右㕮咀爲散水煎服
碧天丸東垣　治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱有如火熏赤而不痛紅絲血脉滿目貫睛瞖悶昏暗羞明畏日或上下瞼赤爛或不伏風土而内外鋭眥皆破以此洗之
瓦粉炒壹兩　銅綠爲末柒分　枯白礬貳分另研壹錢中伍分之一
右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉研勻熱水和之共爲丸每用壹丸熱湯半盞浸一二個時辰洗至覺微澁爲度少合眼半時辰許臨臥更洗了瞑目就睡尤神妙一丸可洗十日如再用湯内頓熱此藥治其標爲裏熱治已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱
本事針頭丸　治男婦室女小兒諸般赤眼
川烏尖柒枚懷乾　白殭蠶柒枚去嘴懷乾
鵰砂拾文
右爲末用猪膽汁調藥成軟塊攤碗内

艾各壹兩皁角小者壹莖燒將藥碗覆熏之常將藥膏攪勻轉又攤又熏以皁角荊芥艾盡爲度再捜成塊用油紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春秋一日夜取出丸如針頭大每壹丸點眼中妙
救苦丸保命　治眼暴赤發腫痛甚者
黃連壹兩　川當歸貳錢　甘草壹錢
右剉細水半碗浸壹宿以火熬約至減半綿絞去查令淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以物盖之用熟艾壹大塊如彈大底下然之熏膏子艾盡爲度入下項藥
硃砂壹錢　腦子伍分　乳香
沒藥研各等分
右研入膏和丸如米大每用兩丸點眼兩角仰面臥藥化方起
廣大重明湯東垣　治兩目瞼赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼瞼痒及痒極抓至破爛赤腫眼楞生瘡痂日多眵痛癮澀難開

草龍膽稍　防風　甘草根
細辛各等分
右剉如麻豆大內甘草不剉只作壹挺先以水壹大碗半煎草龍膽壹味乾壹半再入餘叁味煎至小半碗去查用清汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用伍柒次洗畢合眼須臾即去努肉縱長及痒亦減矣

搽風散　治風毒攻眼赤腫痒痛
黃連去鬚　蔓荊子各半兩　五倍子叁錢
右剉細分三次新汲水煎濾清汁以手沃洗

截惡眼立効方
明礬如皂豆大　山梔子壹枚剉去皮
右㕮咀用無縫絹帛包定以井水小半盞浸之候水浸透水黃洗眼貳叁拾次壹宿次早無事立効

攻毒散　治風毒上攻兩眼瘀赤隱澀難開
右用乾薑不以多少洗淨㕮咀每用貳錢以薄綿緊裹沸湯泡乘熱洗如冷再暖洗

湯泡散　治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜
杏仁　防風　黃連去鬚
赤芍藥　當歸尾各半兩　銅青貳錢
薄荷葉叁錢
右剉散每用貳錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖用日兩三次一方入白鹽少許閉目沃洗鹽亦散血

垂柳枝煎　治風赤眼

垂柳枝　桃枝　枸杞枝
桑枝各長貳寸各七莖　馬牙硝貳錢半細研　竹葉肆拾玖片
黃連去鬚　決明子各半兩　龍腦細研半錢
右除硝龍腦外以漿水貳大盞於銅器中煎至一半去滓以綿濾淨入硝及龍腦攪勻更煎令稠每以銅筯頭取如小豆許點眼日三五次

又方　治一切風赤眼眼皮上瘙痒赤爛久治不効此藥之功不可具述

輕粉拾字 白蜜 白蠟各叁錢
臘月猪脂半兩
右先鎔猪脂成油漸下蜜次下蠟候三味總
化成油入輕粉攪令勻非時搽眼赤皮上
銅青湯 治風弦赤眼
銅青黑豆大 防風壹寸許 杏仁弍粒去尖不去皮
右各細切於盞中新汲水浸湯瓶上頓令極
熱洗之如痛加當歸數片
治風赤澀痛

取訶梨勒核入白蜜研注目中神良一方以
鷹嘴者壹枚滴蜜於石磨點
治風熱生膚赤白眼及去眼中風痒痛搗枸杞
子汁點眼立驗亦治暴赤眼風熱赤膜一方
用葉搗汁含一滿口待稍溫就噀之
拜堂散 治風赤眼
右以五倍子研細末貼破赤處
熏洗方 治風眼爛弦臨洗加輕粉少許凡時
氣赤眼自外而入非臟腑病者不必服藥云云

淡足矣
黄連去毛 川芎去蘆 荆芥穗各壹錢半
蔓荆子壹錢去膜 五倍子叁錢搗碎去垢銚內火炒得赤色鋪紙地上用盞蓋片時出火氣
右剉碎作叁服每服用毛絹一小方洗淨入
藥絹內以線紮定水煎仍以紙糊瓶口勿令
氣出却於無風處就瓶口紙上破小孔向眼
熏之候氣稍平揭去紙就瓶口熏之氣溫傾
藥水出用淨絹蘸洗如此叁次爲驗仍避風

毒
嗜鼻藥 治目風熱腫赤難開
雄黄水透 辰砂各貳錢半 細辛半兩
片腦 麝香各少許
右爲細末口含水少許嗜鼻中
瘀血灌睛宜明丸 治眼內血灌瞳神赤腫澀
痛大熱上壅
赤芍藥 當歸 黄連
生地黄 大黄 川芎

薄荷　黄芩各等分
右爲末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸食後米
飲下
分珠散　治眼患血灌瞳神惡血不散
槐花　白芷　地黄
梔子　荊芥　甘草
黄芩　龍膽草　赤芍藥
當歸各壹兩
右水煎服春加大黄瀉肝夏加黄連瀉心秋

加桑白皮瀉肺
麥門冬湯　治血灌瞳神昏澀疼痛及轆轤轉
關外障
麥門冬去心　大黄炒　黄芩去黑心
桔梗去蘆　玄參各壹兩　細辛去苗
芒硝半兩
右剉碎每服伍錢匕水壹盞半煎至柒分去
滓下芒硝少許食後溫服
通血丸　治血灌瞳神

生地黄　赤芍藥　甘草各伍錢
川芎　防風　荊芥
當歸各壹兩
右爲末煉蜜丸如彈子大食後荊芥薄荷湯
嚼下血既散而歸肝又恐目生花須再用前
還睛散服之
腦歸糖煎散　治血灌瞳神及暴赤目疼痛或
生翳膜
龍膽草　細辛　當歸

防風各貳兩
右用沙糖壹小塊同煎服
車前散　治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血
灌瞳人羞明多淚
車前子　密蒙花去枝　草決明
白蒺藜　龍膽草　黄芩
羌活　菊花　粉草各等分
右爲細末每服貳錢食後米湯調服
真珠散　治眼血灌瞳人生障膜

真珠　水晶　琥珀

馬牙硝各半兩　硃砂壹兩　龍腦壹分

右同研如粉以銅筯取如半小豆大點之

血灌瞳神　四物湯地黃用生芍藥用赤　益陰腎氣丸見內障

單方用生地黃汁溫服壹盞頻服以瘥爲度

色似胭脂退血散

當歸　赤芍藥　木賊

防風　細辛　龍膽草各等分

㕮咀白水煎先乘熱薰眼後溫服

赤脉貫睛　芍藥清肝散見前

赤絲亂脉　點眼蕤仁膏　治風熱眼飛血赤

脉痒痛無定

蕤仁去皮細研半兩　好酥一栗子大

右將蕤仁與酥和研勻攤碗內用艾壹小團

燒煙出將椀覆烟上熏待艾煙盡即止再研

勻每以麻子大點兩眥頭日二度

魚膽傳眼膏　治飛血赤脉作痛及暴赤

鯉魚膽伍枚　黃連去鬚研末半兩

右以膽汁調黃連末內磁盒盛飯上蒸壹次

取出如乾入蜜少許調似膏塗傳目背目五

七度

目珠俱青　還陰救苦湯[illegible]

[illegible]　麥門冬湯　瀉肝散　龍膽飲俱見目赤

金絲膏　治風熱上攻目赤腫痛

黃連去鬚各兩　大黃　黃蘗去麤皮

龍膽草　山梔仁　當歸各壹兩

青竹葉壹伯片切　大棗貳拾枚去核　燈心切

硼砂研者　乳香研各貳錢伍分

右用水伍升不拘冬夏浸壹時辰取出於銀

石器內慢火熬不令大沸候泣盡汁輟下火

放冷用絹絞取汁於無風塵處澄壹時辰去

滓於銀器內用慢火熬及半入白蜜半斤

同攪候有蜜背以手撚起有絲則止放冷再

以夾絹袋濾過用磁盒盛之朝取一茶匙許

研龍腦壹字極細入膏同研壹貳千遍[illegible]

取少許點之

琥珀煎　治風毒衝目腫赤痒痛

乳香 貳錢 另研　蕤仁 半兩 另研　滑石 另研

鉛丹 貳兩 另研 各　黃連 另研　青皮 各壹兩

黃芩 去黑心　白蜜 各肆兩　木鼈子 去殼 拾枚

槐枝　柳枝 長用四寸者各壹拾枝

右將槐柳枝青皮黃芩竹石以水叁碗同煎至兩碗去滓下乳香蕤仁鉛丹木鼈子與蜜同熬如琥珀色却下黃連末再煎至壹碗半

用熟絹濾去查入磁器內密封繩繫墜井底壹宿出火毒每用銅筯點以目瞼爲度熬點

俱忌鐵器

滌風散 見目赤

大黃丸　桑白皮散

青皮湯　玄參丸

瀉肺湯　朱砂煎 俱見前目痛條

目脹如杯　洗肝散 見前

瀉青丸 見目痛

神芎丸　治濕熱內甚目赤腫或白睛黃色

大黃　黃芩 各貳兩　牽牛

滑石 各肆兩　黃連　薄荷

川芎 各半兩

右爲末水丸如小豆大溫水下拾丸至拾伍

求拾丸

形如蝦座　宣明丸　分珠散 俱見前

狀若魚胞　桑白皮散　玄參丸　瀉肺湯

鶻眼凝睛　四物湯加酔將軍　連翹散 見目赤

旋臚泛起　瀉肝散

升麻　大黃　赤芍藥

黃芩　薄荷　梔子

木賊　陳皮　黃連

朴硝　菊花　甘草

防風　五靈脂　葶藶

細辛 各等分

右爲細末每服貳錢爲散亦可水煎服食後

老人加枳殼厚朴

救睛丸　治睛腫旋螺突出青盲有瞖

蒼朮　枳實　甘草

川芎　荆芥　蟬蛻

薄荷　當歸　木賊

草決明　穀精草各等分

右爲末煉蜜丸彈子大每服壹丸食後茶清磨下

旋螺尖起　搜風散治旋螺尖起外障

防風　大黄　天門冬

五味子　桔梗　細辛

赤芍藥　茺蔚子等分

右水煎食後服

法製黒豆

大黄　黄連　黄芩各半兩

甘草　蜜蒙花　朴硝各壹兩

右爲末用黒豆壹升水叁碗入藥煮乾將豆每服貳拾粒細嚼清米泔送下

還睛丸

川芎　白蒺藜　白朮

木賊　羌活　兎絲子

熟地黄　甘草各等分

右爲細末煉蜜丸如彈子大空心熱湯嚼下

神珠自脹　查前去風熱劑中加破血收歛之藥

珠突出眶　分珠散治目赤

瀉肝散　治風熱攻眼赤腫昏花隱澀難開

龍膽草　防已　大黄

荆芥穗　赤芍藥　土當歸

甘草　防風各壹　川芎半兩

右㕮咀爲散每服肆錢水壹盞沙糖壹小塊同煎服

水淋法　治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻數換水眼睛自入更以麥門冬桑白皮梔子仁煎湯通口服

田螺膏　治眼睛腫脹突出及赤眼生瞖膜

田螺去殼　撮地金錢多　生地黄根

田茶菊葉

右同搗爛貼太陽穴及眼胞

洗癢散 附 治癢眼及眼胞赤腫瞖膜遮睛

田茶菊　七層樓　鉄梗子

雞屎子

右水煎七碗入鹽少許泡去查洗眼

洗翳散　治同上

赤梗蔻枇草搗爛沸湯泡濾清洗眼神効

土硃散 附 治患眼赤腫閉合

目腫脹　類方七　四十九

土硃 叁分　石膏 煅壹分　片腦 少許

右為末新汲水入蜜調敷眼眥頭尾及太陽處更以梔子煎湯調治眼流氣飲末服之

清涼膏　治暴赤火眼腫痛難開及癢眼并打撲傷損眼

大黃　朴硝　黃連

黃蘗　赤芍藥　當歸

細辛　薄荷　芙蓉葉 各等分

右為末用生地黃汁鷄子清蜜同調勻貼太陽穴及眼胞上

地黃膏　治赤腫疼痛外障等眼

大黃　黃蘗　黃連

黃芩　赤芍藥　當歸

菉豆粉　芙蓉葉　薄荷 各等分

右製貼法俱同上

附 驅風一字散　治目痒極難忍

川烏 炮　川芎　荊芥 各伍錢

羌活　防風 各貳錢半

目痒　類方七　五十

右為末每服貳錢食後薄荷湯調下

乳汁煎 見目淚

四生散　治腎風上攻眼目作痒或作昏花

白附子　黃芪　獨活

蒺藜 各等分

右為末每服貳錢用猪腰子壹枚批開入藥濕紙包裹煨熟細嚼鹽湯下風癬酒下

人參羌活散　治肝熱眼澀痒昏矇

羌活　獨活　人參

川芎　柴胡　桔梗
枳殼　赤茯苓　前胡
天麻　甘草　地骨皮
右水煎服或加防風荆芥
菩薩散　治風毒攻眼昏淚癮痒
蒼朮　防風　蒺藜炒各
荆芥壹兩　甘草鹽水炒各伍錢半
右末每服壹錢入鹽少許沸湯調下或用消
風散夾和亦佳

杏仁龍膽草泡散　治風上攻眊矂赤痒
龍膽草　當歸尾　黃連
滑石另研水飛　杏仁去皮尖　赤芍藥各壹錢
以白沸湯泡頻蘸洗冷熱任意不拘時候
右方以龍膽草黃連苦寒去熱毒為君當歸
尾行血杏仁潤燥為佐滑石甘寒泄氣赤芍
藥苦酸除癢為使惟風癢者可用
頭痛　簡要夏枯草散附見頭痛　選奇湯見頭痛
羌活除翳湯東垣　治太陽寒水翳膜遮睛不能
物
麻黃根壹錢　薄荷葉貳錢　生地黃酒洗壹錢
當歸根　川芎各叁錢　黃檗肆錢
知母伍錢酒製　荆芥穗煎成入　藁本各柒錢
防風壹兩　羌活壹兩二　川椒伍分
細辛少許
右㕮咀每服叁錢水叁大盞煎至壹盞半入
荆芥穗再煎至壹盞去滓食後稍熱服忌酒
濕麵

撥雲湯東垣　戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮
下出黑白翳二箇隱澀難開兩目緊縮而無
疼痛兩手寸脉細緊按之洪大無力知足太
陽膀胱為命門相火煎熬逆行作寒水翳及
寒膜遮睛與下項藥一服神効外證呵欠善
悲健忘噴嚏時自淚下面赤而白能食不大
便小便數而欠氣上而喘
黃芪　柴胡各柒分　細辛葉
葛根　川芎各伍分　生薑

甘草梢　川升麻　藁本

知母　當歸身　荊芥各壹錢

防風　羌活　黃蘗各壹錢半

水貳大盞煎至壹盞稍熱服食後

流氣飲和劑 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明堆眵赤腫隱澀難開或生障翳倒睫拳毛眼弦赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼病並宜服之

大黃煨　川芎　菊花去梗

牛蒡子炒　細辛去苗　防風去苗

山梔子去皮　白蒺藜炒去刺　黃芩去蘆

蔓荊子　荊芥去梗　木賊去根節

甘草炙　玄參去蘆各壹兩　草決明壹兩半

蒼朮米泔浸控炒叁兩

右搗羅爲末每服貳錢半臨臥時用冷酒調下小兒有患只令乳母服之

撥雲散寶鑑 治因眼發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明隱澀難開

川芎　草龍膽　楮實

薄荷　羌活　荊芥穗

石決明　草決明　蒼朮

大黃　甘草　木賊

密蒙花　連翹　川椒

甘菊花　桔梗　石膏

地骨皮　白芷　白蒺藜

檳榔以上各壹兩　石燕壹對

右搗羅細末每服叁錢溫茶清壹盞調下食後日叁服忌雜魚鳥諸肉

溫白丸見積聚

神仙退雲丸東垣 治一切翳暈內外障昏無睛者

川芎　當歸各壹兩半　犀角酒洗

枳實　川楝子　蟬蛻洗

薄荷葉不見火　甘菊花各半兩　瓜蔞仁生者陸錢

蛇退　密蒙花　荊芥穗各貳錢此叁味同甘草焙乾去甘草不用　地骨皮洗　白蒺藜微炒去刺

生地黃（酒洗焙乾） 羌活（各壹錢） 川木賊（壹兩半去節童便浸壹宿晒乾）

右為細末煉蜜和丸每壹兩作拾丸米泔湯調服日進貳叁丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之在人消息

本事方治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生瞖膜遮障服此藥逐旋消退不犯刀針

青葙子　防風　枳殼（各壹兩）

茺蔚子　細辛　黃連（各半兩）

枸杞子　澤瀉　生地黃

石决明（各壹兩半）　車前子　川當歸

麥門冬（去心各貳兩）

右各如法修事焙乾為末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸飯飲吞下忌一切熱毒物

羌活退翳湯

羌活　五味子　黃連

升麻　當歸身（各貳錢）　黃芩

黃蘗（酒炒）　草龍膽（酒洗）　芍藥

甘草（各伍錢）　柴胡　黃芪（各叁錢）

防風（壹錢半）　石膏（貳錢半）

右剉細分作貳服水貳盞煎至壹盞入酒少許去查臨卧熱服忌言語

消翳散（一名龍膽飲子）

青蛤粉　穀精草　川鬱金（各半兩）

羌活　龍膽草　黃芩（炒各叁錢）

升麻（貳錢）　麻黃（壹錢半）　蟬蛻（壹作蛇蛻）

甘草根（炙各伍分）

右為細末每服貳錢食後溫茶調下

又方

川芎　羌活　旋覆花

防風（各貳兩）　甘草　蒼朮（米泔浸去皮各壹兩）

乾不見火　楮實　楮葉（五八月採陰乾各壹兩）

甘菊花　枳實　蟬蛻

木賊（各壹兩半）

右木臼中杵為末茶清調下貳錢早食後臨卧各一服治暴赤眼忌濕麵及酒楮實須八

無實者取葉不爾諸藥無効合時不得焙及
犯鐵器（予觀此方取楮葉必無實者蓋陰去陽合相匹配耳有實者陽也無實取葉者陰也所以不得貞楮實者悉無効）
五秀重明丸（寶鑑）治眼翳膜遮睛隱澀昏花常服
清利頭目
甘菊花（開頭五百朵） 荊芥（伍百穗） 木賊（去節伍百節）
楮實（伍百枚） 川椒（開口者伍百粒）
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服壹丸細
嚼時時嚥下食後噙化無時臨卧大忌酒麪
熱物（已上二方無熱者宜之）

羚羊角散（保命）治氷翳久不去者
羚羊角　升麻　細辛（各等分）
甘草（半錢）
右為末壹半煉蜜為丸每服伍柒拾丸用壹
半為散以泔水煎吞丸子食後
補陽湯（東垣）
柴胡（去苗貳兩）　獨活　甘草梢
熟地黄　人參（去蘆）　黄芪（一方用黄芩）
羌活　白朮（各壹兩）　白芍藥
澤瀉（研為末）　防風　陳皮（去白各半兩）
當歸身（去蘆酒製）　生地黄（炒）　白茯苓（去皮）
知母（炒黄色各叁錢）　肉桂（壹錢）
右為麤末每服半兩水貳盞煎至壹盞去滓
温服空心使藥力行盡方許食
連柏益陰丸
羌活　獨活　甘草根（炒）
當歸身（酒製）　防風　五味子（各半兩）

黄連（酒洗或拌製炒火色壹兩）　石决明（燒存性伍錢）
草决明　黄芩　黄蘗
知母（各壹兩）
右為細末煉蜜丸如菉豆大每服伍拾丸漸
加百丸止臨卧清茶送下常以助陽湯多服
少服此藥一則妨飲食二則力大如升陽湯
不可多服
升陽泄陰丸（名升陽柴胡湯）
羌活　獨活　甘草根

當歸身　白芍藥　熟地黄各壹兩
人參　生地黄酒洗炒　黄芪
白朮　楮實酒炒各半兩　澤瀉
陳皮　白茯苓　防風各叁錢
知母酒炒如夏暑加壹錢　柴胡去苗壹錢半
肉桂半錢
右㕮咀每服伍錢水煎熱服另合壹料煉蜜
為丸如桐子大食遠茶清送下每日伍拾丸與
煎藥各壹服不可飽服如天氣熱甚加五味

子叁錢或半兩天門冬去心半兩楮實亦加
半兩
右上叁方合治一證空心補陽湯臨卧連檗
丸食遠升陽泄陰丸
羌活勝風湯原機治眵多眊矂緊澀羞明赤脉貫
睛頭痛鼻塞腫脹涕淚臉䐃瘡凡重眉骨痠疼
外翳如雲霧絲縷秤星螺蓋
白朮伍分　枳殼　羌活
川芎　白芷　獨活
防風　前胡　桔梗
薄荷各肆分　荊芥　甘草各叁分
柴胡柒分　黄芩伍分
作壹服水貳鍾煎至壹鍾去滓熱服
右方為風熱不制而作也夫窍不利者皆脾
胃不足之證故先以白朮枳殼調治胃氣為
君羌活川芎白芷獨活防風前胡諸治風藥
皆主升發為臣桔梗除寒熱薄荷荊芥清利
上焦甘草和百藥為佐柴胡解熱行少陽厥

陰經黄芩療上熱主目中赤腫為使又治傷
寒愈後之病熱服者熱性炎上令在上散不
令流下也生翳者隨翳所見經絡加藥翳凡
自內背而出者加蔓荊子治太陽經加蒼朮
去小腸膀胱之濕內背者手太陽足太陽之
屬也自銳背而入客主人斜下者皆能膽草
為膽草味苦與膽味合少加人參益三焦之
氣加藁本乃太陽經風藥銳背客主人斜是
少陽手少陽足少陽太陽之分也凡自目系而下

者倍加柴胡行肝氣加黃連瀉心火曰系者足厥陰手少陰之屬也自抵過而上者加木通導小腸中熱五味子酸以收斂抵過者手太陽之屬也

噙鼻碧雲散 見目痛　還陰救苦湯 見目赤

撥雲退翳丸　治陽蹻受邪內眥即生赤脈縷縷根生瘀肉瘀肉生黃赤脂脂橫侵黑睛漸蝕神水銳眥亦然俗名攀睛

蔓荊子　木賊 去節　密蒙花 各貳兩

川芎　白蒺藜 去刺　當歸 各壹兩半

菊花　荊芥穗　地骨皮 各壹兩

川椒皮 柒錢　天花粉 陸錢　薄荷葉

楮桃仁　黃連　蟬蛻 各半兩

蛇蛻 炙　甘草 炙各叁錢

為細末煉蜜成劑每兩作捌丸每服壹丸食後臨卧細嚼茶清下

右方為奇經客邪而作也八十一難經曰陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池風池者腦戶也故以川芎治風入腦以菊花治四肢游風一療其上一平其下為君蔓荊子除手太陰之邪蟬蛻蛇蛻木賊草密蒙花除翳為臣薄荷葉荊芥穗白蒺藜諸療風者清其上也楮桃仁地骨皮諸通小便者利其下也為佐黃連除胃中熱天花粉除腸中熱甘草和協百藥川椒皮利五臟明目諸所病處血亦病故復以當歸和血為使也楮桃仁即楮實子也

梔子勝奇散　治證同上并有眵淚羞澀難開

蛇蛻　草決明　川芎

荊芥穗　蒺藜 炒　穀精草

菊花　防風　羌活

密蒙花　甘草 炙　蔓荊子

木賊草　山梔子　黃芩 各等分

為細末每服貳錢食後臨睡熱茶清調下

右方以蛇蛻之鹹寒草決明之鹹苦為君 [illegible]

者通通者通其經絡也川芎荊芥穗

白蒺藜穀精草之苦辛溫菊花之苦甘平防風之甘辛爲臣爲氣辛者發熱發熱者升其陽也羌活之苦甘溫蜜蒙花之甘微寒甘草之甘平蔓荆子之辛微寒爲佐爲氣薄者發泄發泄者清利其諸關節也以木賊草之甘微苦山梔子黃芩之微苦寒爲使爲厚味者泄泄者攻其壅滯有餘也

磨障靈光膏　治證同上

黃連 剉如豆大壹兩童便浸壹宿曬爲末　黃丹 水飛叁兩

盧甘石 陸兩另以黃連壹兩剉置水中燒通紅淬七次

當歸 取細末貳錢　輕粉 另研　硇砂 另研末

白丁香 取末　海螵蛸 取末各壹錢

麝香 另研　乳香 另研各半錢　龍腦 末少許

先用好白沙蜜壹拾兩或銀器砂鍋內熬五七沸以淨紙搭去蠟面除黃丹外下餘藥用柳木攪勻次下黃丹再攪慢火徐徐攪至紫色却將乳香麝香輕粉硇砂和勻入上藥內以不粘手爲度急丸如皂角子大以紙裹之每用壹丸新汲水化開旋入龍腦少許時時點翳上

右方以黃連去邪熱主明目爲君以黃丹除熱除毒盧甘石療濕收散爲臣以當歸和血脈麝香乳香諸香通氣輕粉殺瘡爲佐以硇砂之能消海螵蛸之磨障白丁香之主病不移龍腦之除赤脈去外障爲使也

消翳復明膏　治證同上

黃丹 水飛肆兩　訶子 八箇去核取末　海螵蛸 叁錢取末

青鹽 另研壹兩　白蜜 壹斤

先將蜜熬數沸淨紙搭去蠟面却下黃丹用棍攪勻旋下餘藥將至紫色取出

黃連 拾兩　龍膽草 貳兩　木賊 壹兩

杏仁 柒拾伍粒去皮尖　蕤仁 半兩

通入磁器內水壹斗浸之春秋五日夏三日冬十日入鍋內文武火熬至小半升濾去粗重湯頓成膏子却入前藥熬之攪成紫色入龍腦壹錢每用少許點上藥乾淨水化開用

右方以黃連爲君爲療邪熱也蕤仁杏仁龍膽草爲臣爲除赤痛潤煩燥解熱毒也黃丹青鹽龍腦白蜜爲佐爲收濕爛益腎氣療赤腫和百藥也訶子海螵蛸木賊草爲使爲澀則不移消障磨翳也

萬應蟬花散 見前

黃膜上衝證通脾瀉胃湯

防風 大黃 玄參

知母各壹兩 天門冬 黃芩各壹兩半

麥門冬 茺蔚子各貳兩

每服伍錢水壹盞煎五分去滓食遠溫服

神消散 治眼內黃膜上衝赤膜下垂

黃芩 蟬退 甘草

木賊各伍錢 穀精草 蒼朮各壹兩

龍退叁條炒

右末每服貳錢夜卧冷水調下

皂角丸 治內外一切障膜此藥能消膜退翳如十六般內障同生熟地黃丸用之神効

龍退柒條 蟬退 玄精石生

穿山甲炒 當歸 白朮

白茯苓 穀精草 木賊各壹兩

白菊花 刺蝟皮炒 龍膽草

赤芍藥 連翹各□ 豶猪爪炙焙蛤粉炒

人參 川芎各□兩

右末一半入猪牙皂角貳挺燒灰和勻煉蜜丸桐子大每服叁拾丸空心食前杏仁湯下一半入仙靈脾壹兩爲末和勻每服用猪肝夾藥煮熟細嚼及用原汁送下日叁

犀角飲 治黃膜上衝

犀角貳兩 白附子炮 麥門冬各貳錢半

車前子 羌活 黃芩各伍錢

右水煎食後溫服

赤膜下垂 炙肝散 治外障赤內翳膜遮睛不明

石決明洗 穀精草各□ 皂角炙去皮子貳錢

黃芩去黑心 木賊各伍錢 甘草炙貳兩

蒼朮（米泔浸宿日切片焙半斤）

右為細末每用獖猪肝壹葉去筋膜劈數縫摻藥末五錢於縫內仍摻鹽壹錢合定用旋着濕𣏐枝三四條閣起慢火炙香熟早晨空心令喫盡仍喫冷飯壹盞壓之仍於三里穴灸二三七壯三日後有淚下為驗七日瞖膜必退每旦用新水漱口

洗眼紫金膏（新增）治遠年近日瞖膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注瞼生風粟或連瞼赤爛怕日羞明隱澀難開

黃連（去鬚半兩）　赤芍藥　當歸

朱砂（另研）　乳香（另研）　硼砂（另研各[illegible]錢半）

雄黃（研飛貳錢）　麝香（半錢另研）

右為細末入研藥拌勻再研煉蜜丸如皂角子大每用壹丸安淨盞內沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨熱依前洗壹貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗

[illegible]散　見內障

治瞖白陷證知母飲子

知母　茺蔚子（各貳兩）　防風

細辛（各壹兩[illegible]）　桔梗　大黃

茯苓　芒硝（各[illegible]）

每服伍錢水[illegible]盞煎[illegible]分去滓食後溫服

蕤仁散　治目生花瞖多年不退

蕤仁（[illegible]赤皮）　秦艽（去苗各[illegible]）　枳殼（炒黃）

赤茯苓（各壹兩半）　川大黃（[illegible]）　車前子

青葙子　赤芍藥（[illegible]）　柴胡（去苗壹兩）

右為細末每服叁錢水壹盞煎陸分連滓熱服

洗肝散　治花瞖

川芎　當歸尾　赤芍藥

防風　生地黃　白蒺藜

木賊　蟬蛻　羌活

薄荷　蘇木　菊花

紅花（[illegible]）　甘草（[illegible]）

㕮咀每服叁錢水壹盞半松絲拾餘根煎服

外用通明散七寶膏盧甘散點

桑白皮湯　治目生花瞖白點狀如棗花

桑白皮　木通各壹兩半　澤瀉

犀角屑　黃芩　茯神

玄參　旋覆花　川大黃炒各壹兩

甘菊花半兩　甘艸炙貳錢半

右為細末每服貳錢七水壹盞煎六分連滓

溫服

琥珀散　治目積年生花翳

琥珀　珊瑚　硃砂

硇砂白者　馬牙硝各半兩　烏賊魚骨先於

鐵石磨去其澀用好者壹錢　真珠末壹兩

右研極細令勻每用三五次點

雞距丸　治花翳淚出

乾薑炮末錢半　蕤仁細研　麝香

胡粉各半兩　黃連各半兩　礬石煅研壹錢貳分半

為細末棗肉丸如雞距汁服大背日再

防風瀉肝散　治蠏眼睛疼

防風　遠志　桔梗

羚羊角　甘艸　赤芍藥

細辛　人參　黃芩各等分

右為細末溫水調服

磁石丸　治肝腎虛蠏眼睛疼

黃芪　青鹽　人參

紫巴戟　蓯蓉　附子

木香　沉香　防風

牛乳　牛膝　覆盆子

桂心　乾薑　遠志

熟地黃　茯苓　磁石

蒼朮　陳皮　白朮

川芎　檳榔　大腹皮

白芷　青皮　烏藥

獨活各等分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸

溫鹽湯送下

七寶丸　治内障氷翳如氷凍堅結睛上先以
鍼撥取之後以此藥散翳
石决明（搗碎壹兩）　茺蔚子　人參（各壹兩）
琥珀（搗研末錢半）　龍腦（貳錢另研）　熊膽
眞珠（搗研各半兩）
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾伍
丸加至貳拾丸食前茶清下
七寶湯　治外障横翳横著瞳人中心起而劒
脊鍼撥後用

羚羊角（鎊）　犀角（鎊各壹兩）　胡黄連
車前子　石决明（洗刮搗研）　炙甘草（各半兩）
丹砂（另研）
右除丹砂决明外麤搗篩每服叄錢匕水壹
盞煎柒分去滓入丹砂末半錢决明末壹字
再煎兩沸食後温服
清涼散　治氷瑕深翳
蔓荆子　荆芥　苦竹葉
甘草（各半兩）　梔子（貳錢半）

右薄荷水煎服
洗刀散　治風熱眩爛眼目赤腫内外障翳羞
明怕日倒睫出淚兩瞼赤爛紅筋瘀血宜用
此藥
防風　連翹　羌活
獨活　草决明　蔓荆子
木賊　玄參（各壹兩）　當歸
荆芥　滑石　薄荷
麻黄　白术　赤芍藥

大黄（各伍錢）　黄芩　川芎
梔子　桔梗　石膏
芒硝　蟬蛻　白菊花
蒺藜（各肆錢）　甘草　細辛（各叄錢）
右薑同煎食後服再用清涼洗眼之藥
二黄散　治努肉攀睛
黄芩　大黄　防風
薄荷（各等分）
右水煎入蜜少許食後服

定心丸　治努肉攀睛
石菖蒲　枸杞子　白菊花各伍錢
辰砂貳錢　遠志貳錢半　麥門冬去心壹兩
右爲末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸食後
熟水下
南硼砂散　治努肉蔽尖及瘢瘡入眼生翳膜
南硼砂[illegible]　片腦壹分
右研細末點眼用玄參麥門冬生地黃煎湯
調洗心散末服

抽風湯　治雞冠蜆肉外障
防風　桔梗　大黃
細辛　黃芩　玄參
芒硝　車前子
右水煎食遠服
地黃散　治混睛或白睛先赤而後痒痛迎風
有淚隱澀難開
生地黃壹兩　芍藥　土當歸
甘草各半兩

每服叁錢水壹盞半煎至柒分食後溫服
七寶膏　治混睛外障
真珠　水晶　貝齒各壹兩
石決明　琥珀各叁錢半　空青
瑪瑙　龍腦各半
右爲細末研勻水伍升石器內煎至壹升去
滓再煎至壹盞入蜜半兩煎和爲膏每至夜
卧時點之早晨不得點
羚羊角飲子　治黑翳如珠外障

羚羊角　五味子　細辛
大黃　知母　芒硝各壹兩
防風貳兩
右剉碎每服伍錢水壹盞煎至伍分去滓食
後溫服
補腎丸　治證同上
人參　茯苓　細辛
五味子　肉桂　桔梗各壹兩
乾山藥　栢子仁各貳兩半　乾地黃壹兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸
空心茶下

退熱飲子　治膜入水輪外障

防風　黃芩　桔梗
茺蔚子各貳兩　大黃　玄參
細辛　五味子各壹兩

右剉碎每服壹錢水壹盞煎伍分去滓食後
溫服

青葙子丸　治肝心毒熱丁翳入黑睛

青葙子　藍實　枳殼去瓤麩炒
大黃剉炒　菊花　甘草炙各貳兩
草決明　黃連去鬚　茺蔚子
細辛去苗　麻黃去根節　車前子各壹兩半
鯉魚膽　雞膽各壹枚陰乾　羚羊角鎊屑兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸食
後茶清送下日三兼治內外一切眼病

琥珀煎　治眼生丁翳久治不瘥

琥珀　龍腦各貳錢半　貝齒
硃砂各半兩　馬牙硝煉過者各壹錢半

右同研如麵以水壹大盞別入白蜜壹兩攪
和入通油磁瓶中用重湯煮以柳木篦攪取
壹合已來即住以綿濾於不津磁瓶中盛之
或銅器亦得每取少許點之一方為細末點

荊防菊花散　治眼中[illegible]及瞳人如蠅翅
狀

白菊花　防風　木通
仙靈脾　木賊　荊芥去梗

甘草炙各等分

右為末每服壹錢食後茶清調下

白蘚皮湯　治目膚翳睛及瞳人上有物如蠅
翅狀令人視物不明

白蘚皮　款冬花　車前子
柴胡去苗　枳殼去瓤麩炒　黃芩去黑心各壹兩
百合蒸兩　菊花　蔓荊子各壹兩半
甘草炙半兩

右剉碎每服伍錢水壹盞半煎捌分去滓

後溫服臨臥再服

菊花散　治肝受風毒眼目昏矇漸生瞖膜

蟬蛻　木賊各壹兩　蒺藜炒

羌活各貳兩　白菊花肆兩　荊芥

甘草炙壹兩

右爲末每服貳錢食後茶清調下

磨光散　治諸風攻眼消磨瞖膜

蒺藜炒　防風　羌活

白菊花　甘草　石決明煅

草決明　蟬蛻　蛇蛻炒

川芎各等分

右爲末每服壹錢麥門冬湯食後臨臥服

甘菊花散　治肝氣壅塞瞖膜遮睛隱澀難開

甘菊花壹兩　木賊　防風去叉

白蒺藜　甘草炙各半兩　木香貳錢

右爲細末每服壹錢匕不拘時沸湯點服

道人開障散　治諸瞖翳

蛇蛻洗淨焙　蟬蛻洗淨　黃連去鬚各

菉豆壹兩　甘草生用貳錢

右剉細每服貳錢食後臨臥新水煎服

撥雲散　能散風毒退瞖障及赤爛弦者

羌活　防風　川芎

白蒺藜　荊芥　蟬蛻

甘菊花各壹兩

右爲細末每服貳錢食後桑白皮煎湯調服

五退散　治眼中瞖障

蟬退　蛇退　蠶退

猪退蹄　鯪鯉甲　防風

菊花　草決明　石決明

甘草各等分

右爲細末每服貳錢食後薄荷煎湯調服

朱僧熱瞖方

蟬退去足　蒺藜炒去刺　防風

甘菊花　羌活　川芎

細辛　荊芥穗　秦皮

梔實　藁本　甘草

木賊去節剉便浸壹宿各貳錢半焙乾

右為細末每服壹錢茶清調下

珍珠退翳散

珍珠少許　白澤石脂　烏賊魚骨

真蚌粉等分

右為細末每服半錢用筆[illegible]大米泔調食後

臨臥常服

決明子散　治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆

裹瞳人

決明子　黃連去鬚　川升麻

枳殼去瓤麩炒　玄參各壹兩　黃芩半兩

車前子　梔子仁　地膚子

人參去蘆各半兩

右剉碎每服叁錢水壹中盞煎至陸分去滓

食後溫服

真珠散　治眼忽生翳膜赤澀疼痛

真珠研半兩　青葙子　黃芩各貳兩

人參去蘆　甘菊花　石決明搗碎細研水飛

芎藭　甘艸炙各壹兩

右為細末每服壹錢食後溫漿水調下

開明丸　治年深日近翳障昏盲寂無所見一

切目疾

熟地黃[illegible]　兔絲子[illegible]

車前子　麥門冬去心　蕤仁去皮

決明子　地膚子　茺蔚子

枸杞子　黃芩　五味子

防風去蘆　澤瀉　杏仁去皮尖

細辛去葉不見火　青葙子　北葶藶炒各壹兩

官桂半兩　羊肝須用白羊者只用肝薄切焙乾了作末[illegible]只以肝煮爛研為丸[illegible]可久留少則以蜜濟之

右為細末丸如梧桐子大每服叁拾丸熱水

下日叁仍忌生薑糟酒炙煿等熱物

秘傳去翳聖金膏

爐甘石[illegible]

[illegible]

黃連[illegible]

用水飛起太於砂銚內煑此藥最難
冬月用雪水和藥曬乾再研汸細

蜜陀僧 火煅醋淬研極細水飛過半兩　烏賊魚骨 半兩研細入煎

乳香 要通明者用箬葉焙過用　沒藥 研用黃連等水飛各叁錢

白丁香 水飛去重湯內煑乾再研入煎　南硼砂 研細入

輕粉 研細各一錢入

鷹條 壹錢以水壹碗煎沸同丁香用小盞煎至八分以水入鐵銚內熬乾

硇砂 如鹽者佳白者如蚯蚓者細入藥壹兩以鐵銚火煅研細入前入水

黃丹 壹兩以重湯煑乾再研一時研細入煎

蜜 肆兩用水壹盞銅銚內煎以葱白貳莖攪候煎了取銚離地上用淨紙一片

掠去面上藥

當歸 半兩再以一半煎乾研細末再用此水研一半煎水用　龍膽草 壹兩截碎水煎

右先以黃連當歸龍膽草叁味截碎用銚子
煎貳大椀水用此水研乳香沒藥飛過可用
此水飛過鷹條白丁香獨將黃連肆兩洗淨
令乾碾爲細末重羅了又研飛過或別作法
度但要極細分秘銚內用淨蜜肆兩同煮却
旋入諸藥熬成膏可丸即止獨後入下弍味

麝香 半錢研細羅過用　片腦 半錢另研細羅過

藥煎成膏却入此二味

此藥遠年目疾皆治須隨病輕重爲大小丸
與之每以淨湯一鷄彈殼大化開日洗五七
次或如麥粒大點眼尤妙

捲簾散 治久新病眼昏澀難開翳膜遮睛或
成努肉連瞼赤爛常多冷淚或暴發赤眼腫
痛

爐甘石 壹兩　朴硝 半兩細研　黃連 叁錢捶碎以水壹碗煑數沸去渣

右先將爐甘石末入甘鍋內開口煆令外有
霞色爲度次將黃連朴硝水中浸飛過候乾
又入黃連半錢水飛過再候乾次入

膩粉 另研　硇砂 另研　白礬 半生用半飛過

黃連 研爲末各半兩　銅青 半兩　白丁香 另研

乳香 另研　鉛白霜 另研　青鹽 另研

膽礬 各一錢

右爲細末同前藥研勻每用少許點眼

點不大 治目生翳障

龍腦　　滑石　　丹砂通明者

烏賊魚骨去甲

右各壹錢研細再同研勻先用黃蠟皁子大於新白磁盞內慢火熔以沙吊子濾在淨器內再熔了將前藥末同拌和捏作餅子如半破豌豆大用薄絹或紗袋子盛了以硇砂半兩放淨碗內上安橫安竹片放藥在上面鋪着錯硇砂氣熏用大楪子一片合碗上勿令透氣掘一地坑放藥椀在坑內用竹筆一片

蓋了然後以黃土蓋之七日出淨磁瓶中收其硇砂不用如患浮翳膜侵睛人及一切目疾但臨臥將壹餅割在眼背頭即睡至曉用水壹椀向東觀水椀其藥自落在水中淨浴却用絹帛子裹起安潔淨處臨臥依前再使每餅可用半月淚藥力慢時方易壹餅如兩目有疾即用兩餅

通光散　治外障翳膜昏澀風毒腫痛洗眼方

右用瓜蔞壹枚割下頂蓋取瓤并子同以

子搗勻却裝在瓜蔞內用元蓋蓋之坐淨土上取桑條子拾兩約長肆伍寸簇瓜蔞上用炭火燒扇之烟盡將成灰即住火扇冷和灰通研極細每用貳錢沸湯浸澄清去脚洗之

指甲散　治眼翳及諸物入眼

右以左手中指甲洗淨放乾以刀刮甲屑用燈草蘸點眼中翳處，其次即去或用懷孕婦人爪甲屑置目中去翳

珊瑚散　治眼赤痛生翳障遠視不明痒澀

珊瑚米錢半　硃砂伍錢　龍腦壹錢

右各研細令勻每以銅筋取壹米許日叁肆度點之神効

青金丸　治風毒攻眼成外障翳膜

銅青真者　蕤仁去皮尖與銅青同研

石決明淨水煮研　生犀角

龍腦研　白丁香　海螵蛸水飛過

右將銅青與蕤仁先研如糊次入白丁香研次入四味研極細用好墨研濃汁於淨器中

和熟為丸如菉豆大每用人乳汁化開點眼
未用者常以龍腦養於磁器中

猪膽方

右以猪膽壹枚用銀銚或瓦銚煎成膏入冰腦如黍米大點入眼中微覺翳輕又將猪膽白膜皮陰乾合作小繩如釵股大小止用一頭燒灰待冷點翳數日後翳退雙目如舊此治翳如重者尤良不過三五度差

療翳五十年不瘥

貝齒壹枚燒 豆豉叁拾粒 三年苦酒叁升一作醋叁升

右先漬貝齒叁宿消盡後內豆豉微火煎如膠取叁合藥置筒中夜卧時着如小麥大於眥頭明日以湯洗之

治赤眼後生翳膜

右以蘭香子洗淨曬乾每用壹粒以筋頭點大眥頭閉目即覺藥在目內團圓旋轉藥少過即不轉須臾自隨眵淚出惹翳膜在[illegible]

魚眼再入壹粒以病退為度一方為細末每取如米大點眼眥頭昔廬州知錄彭大辯父在臨安暴得此疾一僧以此藥治之坐間瞭然因得此方屢以治人

枸杞煎 治眼中翳少輕者點治眼澀痛

右取枸杞及車前子葉各等分手中熟挼使汁欲出又別取桑葉兩重裹之懸於陰地經宿乃摘破桑葉取汁點目中不過三五度瘥

雀乳散 治眼熱每卒生翳及赤白膜

右以雄雀糞細研用人乳汁和點之

真珠膏 治眼虛熱目赤痛卒生翳膜昏暗

真珠研壹兩 麝香 硃砂

胡粉各貳錢半 貝齒伍枚燒灰 鯉魚膽貳枚

白蜜肆兩煎濾過

右除魚膽蜜外搗研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調令勻慢火煎成膏每以銅筋取少許點之日三四

雞子殼散 治眼卒生翳膜

雞子殼（抱出子者去膜取白殼研貳錢半） 貝齒（叁枚燒灰）
右研極細入磁盒中盛取少許日三五度點
之
羌活退翳膏（一名復明膏） 治足太陽寒水膜子遮左
右睛白翳在上視物不明
羌活根（柒分） 椒樹東南根（…分）
當歸梢（陸分） 黃連（壹錢） 防風根
柴胡根 麻黃（去節根） 升麻根
生地黃（各叁分） 甘草梢（肆分） 蕤仁（陸個）

漢防巳 藁本（各貳分）
右用淨新汲水壹大椀先將漢防巳黃連甘
草梢生地黃煎至一半下餘〔藥〕外藥再煎至
壹盞去滓入銀石器中再熬如膏點之有効
為度
蠍附散 搐鼻退翳膜
全蠍 附子尖 雄黃
青黛（各半錢） 薄荷 鵝不食草（半兩）
右為細末口含水搐少許

玉餅子 治翳膜
海螵蛸 蛤粉（南康真者各伍分） 片腦（半分）
黃蠟（伍分）
右為末先熔蠟持起攪微冷入末為丸如青
葙子大帶扁些每用壹餅臨卧納入眼中翳
膜上經宿以水照之其餅自出
照水丸 治翳神驗
海螵蛸（壹錢） 朱砂（伍分） 片腦（半分）
黃蠟（捌分）

右末先熔蠟攪微冷入末和為丸如麻子大
帶扁些臨卧納眼中翳膜上次日照水自落
內障 人參補胃湯（試効） 治勞役所傷飲食不節
內障昏暗
黃芪 人參（各壹兩） 炙甘艸（捌錢）
蔓荊子（貳錢半） 黃蘗（酒拌炒四遍） 白芍藥（各叁錢）
右㕮咀每服叁伍錢水貳盞煎至壹盞去滓
食遠稍熱服臨卧叁伍服後兩目廣大視物
如童時覺兩脚踏地不知高下蓋冬天多服

升陽藥故也病減住服候五七日再服此藥
春間服乃時藥也
圓明內障升麻湯 即冲和養胃湯
黃芩黃連湯
黃芩 酒洗炒 生地黃 酒洗 草龍膽 酒洗炒以
上各壹兩 黃連 酒洗炒
右㕮咀每服貳錢水壹盞煎數沸去滓再煎
至壹盞熱服午後晚間俱不可服唯午飯時
服之方効

復明散 治內障
黃芪 壹錢半 生地黃 柴胡
連翹 甘草 炙各壹錢 當歸 貳錢
蒼朮 川芎 陳皮 各伍分
黃蘗 叁分
水貳大盞煎至壹盞去柤稍熱服食後忌酒
濕麵辛熱大料之物
羌活退翳丸 見外障 治內障右眼小眥青白翳
大眥微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡熱太
便澀或時難小便如常遇天熱煖處頭痛睛
脹能食日沒後天陰則昏暗此證亦可服滋
陰地黃丸
熟地黃 壹兩 生地黃 酒製 黃蘗 酒製
當歸身 酒製 茺蔚子 丹參 各半兩
黑附子 炮 寒水石 生用各壹錢
芍藥 壹兩叁錢 防巳 貳錢酒製 知母 酒製
牡丹皮 羌活 川芎 各叁錢
柴胡 半兩或叁錢

右為細末煉蜜丸如小豆大每服伍柒拾丸
空心白湯送下如消食未盡候飢時服之忌
語言隨後以食壓之東垣蘭室秘藏方云翳
在大眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羌活
是也
當歸湯 見瞳子散大
沖和養胃湯 治內障初起視覺微昏空中有
黑花神水變淡綠色次則視物成二神水變
淡白色久則不覩神水變純白色

柴胡 柒錢 人參 當歸 酒浸
炙甘草 白朮 升麻
葛根 各壹兩 黃芪 羌活 各壹兩半
白芍藥 陸錢 防風 伍錢 白茯苓 叁錢
五味子 貳錢 乾生薑 壹錢
右㕮咀每服陸錢水弍盞煎至貳盞入黃芩黃連湯貳錢再煎至壹盞去滓稍熱食後服
右方以肝木不平內挾心火故以柴胡平肝人參開心黃連瀉心火為君酒製當歸榮百脉五味斂百脉之沸心包絡主血白芍藥順血脉散惡血為臣白茯苓瀉膀胱之濕羌活清利小腸之邪甘草補三焦防風升膽之降為佐陰陽皆總於脾胃黃芪補脾胃白朮健脾胃升麻葛根行脾胃之經黃芩退壯火乾生薑入壯火為導為使此方逆攻從順反異正宜俱備

益氣聰明湯 治證同上并治耳聾耳鳴
黃芪 人參 各壹錢貳分半 升麻 柒錢半
葛根 叁錢 蔓荊子 壹錢半 芍藥
黃蘗 各壹錢 酒炒 炙甘草 半錢
每服肆錢水貳盞煎至壹盞去柤臨睡熱服五更再煎服
右方以黃芪人參之甘溫治虛勞為君甘草之甘平承接和協升麻之苦平微寒行手陽明足陽明足太陰之經為臣葛根之甘平蔓荊子之辛溫皆能升發為佐芍藥之酸微寒補中焦順血脉黃蘗之苦寒治腎水膀胱之不足為使酒製又炒者因熱用也或有熱可漸加黃蘗春夏加之盛暑倍加之加多則不效脾胃虛者去之熱倍此者瀉熱黃連湯主之

瀉熱黃連湯 治內障證同上有眵淚眊矂
黃芩 酒炒 黃連 酒炒 柴胡 酒炒
生地黃 酒洗 各壹兩 龍膽草 叁錢 升麻 伍錢
每服叁錢水貳盞煎至壹盞去滓午食前熱服午後服之則陽逆不行臨睡休服為反助

陰也
右方治主治客之劑也治主者升麻主脾胃柴胡行肝經為君生地黃涼血為臣為陽明太陰厥陰多血故也治客者黃連黃芩皆療濕熱為佐龍膽草專除眼中諸疾為使為諸濕熱俱從外來為客也

千金磁硃丸　治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有黑花漸覩物成二體久則光不收及內障神水淡綠色淡白色者

磁石　吸針者　辰砂　神麯

先以磁石置巨火中煅醋淬七次晒乾另研極細貳兩辰砂另研極細壹兩生神麯末叁兩與前藥和勻更以神麯末壹兩水和作餅煮浮為度搜入前藥煉蜜為丸如梧桐子大每服拾丸加至叁拾丸空心飯湯下
右方以磁石辛鹹寒鎮墜腎經為君令神水不外移也辰砂微甘寒鎮墜心經為臣肝其母此子能令母實也肝實則目明神麯辛溫甘化脾胃中宿食為佐生用者發其生氣熟用者斂其暴氣也服藥後俯視不見仰視漸覩星月者此其効也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之則永不更作空心服此午前更以石斛夜光丸主之按此方磁石法水入腎朱砂法火入心而神麯專入脾胃乃道家黃婆媒合嬰姹之理妙手擇之罄費詞矣或加沉香半兩升降水火尤佳

石斛夜光丸　治證同上

天門冬　焙　人參　茯苓　各貳兩
麥門冬　熟地黃　生地黃　各壹兩
兔絲子　酒浸　甘菊花　草決明
杏仁　去皮尖　乾山藥　枸杞子
牛膝　酒浸各柒錢半　五味子　蒺藜
石斛　蓯蓉　川芎
炙甘草　枳殼　麩炒　青葙子
防風　黃連　烏犀角　鎊
羚羊角　鎊各伍錢

為細末煉蜜丸如桐子大每服叁伍拾丸溫

酒鹽湯任下
右方衰補藥也補上治下利以緩利以久不
利以速也故君以天門冬人參兎絲子之通
腎安神強陰塡精也臣以五味子麥門冬杏
仁茯苓枸杞子牛膝生熟地黃之歛氣除濕
凉血補血也佐以甘菊花蒺藜石斛肉蓯蓉
川芎甘艸枳殼山藥青葙子之治風療虛益
氣袪毒也使以防風黃連草决明羚羊角生
烏犀之散滯泄熱解結明目也陰弱不能配

陽之病並宜服之此從則順之治法也
益陰腎氣丸　治證上同
熟地黃酒蒸兩　生地黃酒製炒乾四兩
當歸尾酒製　牡丹皮　五味子
乾山藥　山茱萸　柴胡各半兩
茯苓　澤瀉各二錢半
爲末煉蜜丸如桐子大水飛辰砂爲衣每服
五柒拾丸空心淡鹽湯下
右方壯水之主以鎭陽光氣爲怒傷散而不

聚也氣病血亦病也肝得血而後能視又目
爲心之竅心主血故以熟地黃補血衰當歸
尾行血牡丹皮治積血爲君茯苓和中益眞
氣澤瀉除濕瀉邪氣生地黃補腎水眞陰爲
臣五味子補五臟乾山藥平氣和胃爲佐山
茱萸强陰益精通九竅柴胡引入厥陰經爲
使蜜劑者欲泥膈難下也辰砂爲衣者爲通
於心也然必兼千金磁硃丸服之庶易効

滋陰地黃丸　治證同上眵多眊矂者並治
黃芩　當歸身酒製　熟地黃各半兩一
天門冬焙　甘草炙　枳殼
柴胡　五味子各參錢　人參
地骨皮各貳錢　黃連壹兩　生地黃酒製壹兩半
爲細末煉蜜丸桐子大每服百丸食後茶湯
下日參服
右方治主以緩緩則治其本也以黃連黃芩
苦寒除邪氣之盛爲君當歸身辛溫生熟地
黃苦甘寒養血凉血爲臣五味子酸寒體輕

浮上收神水之散大人參甘草地骨皮天門
冬枳殻苦甘寒瀉熱補氣爲佐柴胡引用爲
使也亡血過多之病有熱者亦宜服

羚羊角湯　治青風内障勞倦加昏重頭旋腦
痛眼内痛澁者

羚羊角　人參　玄參

地骨皮　羌活各壹兩　車前子壹兩半

右爲末以水壹盞散壹錢煎至伍分食後去
滓温服

婁全善云此方并後羚羊角散補肝散羚羊
角引子皆以羚羊角玄參細辛羌活防風車
前子爲君盖羚羊角行厥陰經藥也丹溪云
羚羊角入厥陰經甚捷是也玄參細辛行少
陰經藥也海藏云玄參治空中氤氲之氣無
根之火爲聖藥也羌活防風車前子行太陽
經藥也如筋脉枯澁者諸方中更加夏枯草
能散結氣有補養厥陰血脉之功嘗試之有
驗然此諸方又當悟邪之所在若氣脱者必

與參芪補胃相半服之氣虚者必與東垣補胃人
參湯益氣聰明湯之類相半服之血虚者必
與熟地黄丸之類相兼服之更能内觀靜守
不干塵累使陰氣平伏方許作効

杏仁方　治肝腎風虚瞳人帶青眼多黒暗潤
澤臟腑洗垢開光能爲風明目

右用杏仁伍枚去皮尖五更初就床端坐勿
言勿呼息慮澄神嚼杏仁壹粒勿嚥逐一細
嚼伍粒候津液滿口分爲三嚥直入肝腎惟

在久而成功

羚羊角散　治緑風内障頭旋目痛眼内痛澁
者

羚羊角　防風　知母

人參　茯苓　玄參

黄芩　桔梗　車前子各壹兩

細辛叁兩

右爲末以水壹盞散壹錢煎伍分食後去粗
温服

又羚羊角散　治綠風内障

白菊花　川烏炮　川芎

車前子　防風各伍錢　羌活

半夏　羚羊角　薄荷各貳錢半

細辛貳錢

右生薑煎服或爲末荊芥湯調服

白附子散　補腎磁石丸　出見目昏花

還睛散　治眼翳膜昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎　草龍膽　草決明

石決明　荊芥　枳實

野菊花　野麻子　白茯苓去皮

炙甘草　木賊　白蒺藜

川椒炒去子　仙靈脾　茵陳各半兩

右爲細末每服貳錢食後茶清調下日叁服忌雜魚肉及熱麵蕎麥等物一方有楮實子無仙靈脾茵陳枳實叁味

蘆薈丸　治黑水凝翳内障不痛不痒微有頭旋脉澁者

蘆薈　甘草各貳錢半　人參

牛膽各半兩　柏子仁　細辛各壹兩

羚羊角蜜炙貳兩

右爲末煉蜜丸如桐子大空心茶清下拾丸

大黃瀉肝散　治烏風

郁李仁　荊芥各貳錢　甘草

大黃各伍錢

右水煎食後服

墜翳丸　治偃月内障及微有頭旋額痛

青羊膽　青魚膽　鯉魚膽各柒箇

熊膽貳錢　牛膽半兩　石決明壹兩

麝香少許

右爲細末麪糊爲丸如桐子大每服拾丸空心茶清下

磁石丸　治雷風内障頭旋惡心嘔吐

磁石燒赤醋淬五次　五味子　牡丹皮

乾薑　玄參各壹兩　附子炮半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大食前茶下拾丸

補肝散　治肝風內障不痛不痒眼見花發黃
白黑赤或一物二形難辨
羚羊角　防風各叁兩　人參
茯苓各貳兩　細辛　玄參
車前子　黃芩炒　羌活各壹兩
右爲末食後米飲調服壹錢

又補肝散　治圓翳內障
熟地黃　白茯苓　白菊花
細辛　白芍藥　柏子仁
甘草　防風　北柴胡
右水煎食後服

補腎丸　治圓翳內障
巴戟　山藥　破故紙炒
牡丹皮　茴香各伍錢　肉蓯蓉
枸杞子各壹兩　青鹽貳錢半
右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服叁拾丸
空心鹽湯下

羚羊角飲子龍木　治圓翳內障不痛不痒
羚羊角叁兩　細辛　知母
車前子　人參　黃芩各貳兩
防風貳兩半
右爲末每服壹錢以水壹盞煎至伍分食後
去滓溫服

皁角丸見外障

生熟地黃丸龍木　治肝虛目暗膜入水輪眼見黑
花如豆累累數十或見如飛蟲者治不瘥或
視物不明混睛冷淚翳膜遮障內外障眼並
皆治之

石斛　枳殼　防風
牛膝各壹兩　生地黃　熟地黃各壹斤半
羌活　杏仁各肆兩　菊花壹斤
右末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸以黑豆
叁升炒令烟盡爲度淬好酒陸升每用半盞
食前送下或蒺藜湯下

通肝散　治氷翳內障
梔子　蒺藜炒　枳殼

荆芥各肆錢 車前子 牛蒡子炒各貳錢

甘草肆錢

右末每服貳錢苦竹葉湯食後調下

八味還睛散 治散翳内障

蒺藜炒 防風 甘草炙

木賊 梔子各肆錢 草决明捌錢

青葙子炒 蟬蛻各貳錢

右末每服貳錢麥門冬湯調食後服

空青丸 治沉翳細看方見其病最深

空青壹錢壹方用壹銖 細辛

五味子 石决明另研 車前子各壹兩

知母 生地黃 防風各貳兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服拾丸空心茶湯下

涼膽丸 治眼狀青色大小皆頭澀痛頻頻下淚口苦少飲食兼治黑花翳

黃連[illegible] 黃芩 荆芥

龍膽草各半兩 蘆薈 防風各壹兩

黃檗去麄皮 地膚子各貳錢半

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸食後薄荷湯送下

還睛丸

川芎 白蒺藜 木賊

白朮 羌活 兎絲子

熟地黃 甘艸各等分

右爲細末煉蜜丸如彈子大空心熟湯嚼下

又方

川烏 地黃 白朮

茯苓 石决明 杏仁

川芎 兎絲子各叄兩 當歸

防風 荆芥 蔓荆子各半兩

右爲末猪膽汁和丸如梧子大每服叄拾丸麥門冬湯下

除風湯 治五風變成内障頭旋偏腫痛瞳子結白者

羚羊角 車前子 芍藥

人參　茯苓　大黃
黃芩　芒硝各壹兩
右爲末水壹盞散壹錢煎至伍分食後去滓
溫服

本事方治內障
白羯羊肝只用子肝壹片薄切新瓦上焙　熟地黃壹兩半
兎絲子　蕤仁　車前子
麥門冬　地膚子去殼　澤瀉
防風　黃芩　白茯苓

五味子　杏仁炒　桂心炒
細辛　枸杞子　茺蔚子
苦葶藶　青葙子各壹兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服叁肆拾丸溫湯下日叁服不拘時候張臺卿嘗苦目暗京師醫者令灸肝俞遂轉不見物因得此方服月遂明一男子內障醫治無効因以餘劑遺之一夕燈下語其家曰適偶有所見如隔門縫見火者及旦視之眼中翳膜俱裂如[illegible]

張云此藥靈勿妄與人忽之則無驗予益信之且欲廣其傳也

羅漢應夢丸　治內障及因病赤眼食鹹物而得者
夜明沙炒　當歸　蟬蛻去
木賊去節各等分
右爲末用羯羊子肝肆兩水煮爛搗如泥入前藥末搗和丸如桐子大每服伍拾丸食後熟水下百日眼如故昔日徐道亨奉母至孝

患眼食蟹遂內障晴誦般若經與市得錢米旣侍母忽一夕夢羅漢授此方服眼得復明

神仙碧霞丹　治內障
當歸　沒藥各貳錢　血竭
白丁香　硼砂　片腦
麝香各壹錢　馬牙硝　乳香各半錢
黃連叁錢　銅綠壹兩半爲衣
右爲細末熬黃連膏和丸如雞頭實大每用新汲水半盞於磁盒內浸常用每壹丸可洗

四五日大病不過壹月小病半月冷淚叁日
見効
內外障通治 遠志丸 清心明目益肝退翳
遠志(水浸去心薑汁醃焙) 車前子
白蒺藜(炒去刺) 細辛(各柒錢半) 全蝎(伍枚)
蟬殼(壹兩洗焙) 熟地黃(酒洗焙) 茯神(去木)
川芎 人參 茺蔚子
蘆薈(研) 琥珀 生地黃
蔓荊子(各半兩)

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服伍拾丸
空心用米飲臨睡用菖蒲湯下
局方明目地黃丸 治男女肝腎俱虛風邪所
乘熱氣上攻目翳遮睛目澀多淚
牛膝(酒浸叁兩) 石斛 枳殼(炒)
杏仁(去皮炒) 防風(各肆兩) 生熟地黃(各壹斤)
右爲末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食前
鹽湯下
固本還睛丸 治遠年一切目疾內外翳膜遮

睛風弦爛眼及老弱人目昏多糊迎風冷淚
視物昏花等證
天門冬 麥門冬 生地黃
熟地黃(各叁兩) 白茯苓 枸杞子
人參 山藥(各壹兩伍錢) 川牛膝
石斛 草决明 杏仁
兎絲子(酒煮焙) 甘菊花 枳殼(各壹兩)
羚羊角(屑) 烏犀角(屑) 青葙子
防風(各捌錢) 五味子 甘草(炙)

蒺藜 川芎 黃連(各柒錢)
右爲末煉蜜丸梧子大每服伍拾丸鹽湯下
還睛丸 治眼目昏翳
蟬蛻 蒼朮 熟地黃
川芎 蒺藜(炒各壹兩) 羌活
防風 茺蔚子 木賊
白菊花 荊芥 蔓荊子
杏仁 兎絲子(酒煮焙) 石决明(煅)
蛇皮(酒浸洗淨焙各伍錢)

右為末煉蜜丸如彈子大每服壹丸細嚼薄荷茶下

仙朮散　治眼中翳膜

蛇皮甘草水洗　木賊　蟬蛻

蒺藜炒　穀精草　防風

羌活　川芎　杏仁

甘草各伍分　蒼朮米泔浸壹兩焙乾

右細末每服壹錢食後蜜湯下

蒙靈丸　治內外障眼

防風蜜炙　威靈仙　枸杞子

蕤仁去殼　蒼朮米泔浸　石決明水壹升煮乾

蚌粉飛過　穀精草各壹兩　菊花貳兩

右為細末用雄猪肝壹具竹刀切去筋膜和藥搗千餘杵入麵少許共搗丸梧桐子大每服伍拾丸食後鹽湯下忌煎煿酢豆腐等毒物

五退還光丸　治內外障眼

蟬退炒　蛇退炒　猪前爪燒存性

刺蝟皮麩炒去皮　蒼朮泔水浸炒乾　枳實

防風　草決明各壹兩　蠶退半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服貳拾丸茶清送下壹日貳服

空青丸　治肝腎久虛目暗漸生翳膜

空青研細水飛　真珠研細各貳錢半　犀角屑

羚羊角屑　防風去叉　防巳

升麻剉各半兩　麥門冬去心焙　人參

茺蔚子　陽起石細研　前胡去蘆各壹兩

虎睛壹對

右為細末煉蜜丸如梧子大每服伍丸加至拾丸麥門冬煎湯送下溫椒湯亦得

蕤仁丸　治內外障眼

蕤仁叁兩　車前子　黃連去鬚各貳兩

青葙子湯浸　黃芩去黑心　秦艽去苗

生地黃　羚羊角末　防風去叉各壹兩

人參　天門冬去心焙　升麻

苦參炒　地膚子　菊花

玄參炒　羌活去蘆　决明子炒
地骨皮　甘草炙　丹砂各壹兩
麥門冬去心焙柒錢半
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸加
至叁拾丸食後煎百合湯送下但有瞳人不
詢內外翳並治之
觀音丸　治內外障失明或欲結青光內障或
赤脈疼痛
血竭　熊膽研各貳錢　人參

蛇蛻皂角水洗新瓦焙各壹兩　地骨皮洗晒
木賊去節童便浸焙　蒼术童便浸二宿晒　鷹爪黃連去鬚
威靈仙　蔓荊子　茺蔚子
車前子　川芎　當歸
羌活　蟬蛻洗晒　石决明煅半生
雄蠶蛻紙貳拾張燒　各壹兩
右爲細末用羯羊肝壹具去筋膜慢火煑半
生半熟帶血性和藥同搗以粟米粉用肝汁
煑糊丸如梧子大每服柒捌拾丸食後溫水

泔或石膏煎湯送下
八子丸　治風毒氣眼翳膜遮睛不計久新及
內外障眼
青葙子　决明子炒　葶藶子炒
車前子　五味子　枸杞子
地膚子　茺蔚子　麥門冬去心焙
細辛去苗　官桂去皮　生地黃洗焙
赤茯苓去皮　澤瀉　防風去叉
黃芩去黑心各壹兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳拾
丸加至叁拾丸茶清送下溫米飲亦得日叁
靈圓丹　治男子婦人攀睛翳膜痒澀羞明赤
筋碧暈內外障瘀肉風赤眼
蒼术米泔浸肆兩　川芎　柴胡
白附子　遠志去心　羌活
獨活　甘菊花　石膏
防風　全蝎　青葙子
青皮　陳皮　荊芥

仙靈脾酥炙 木賊去節 楮實
黃芩 甘草各壹兩
右爲細末水浸蒸餅丸如彈子大每服壹丸食後細嚼荊芥湯或茶清送下日貳服忌酒麵

磨翳丸 治眼生諸般翳膜大效
木賊 黃連 川芎
穀精草 當歸 白芷
赤芍藥 蟬退 荊芥

防風 羌活 大黃
獨活 黃芩 白菊花
生地黃 石膏煅 龍退
梔子 青葙子 蠶退
甘草 石決明煅 草決明
蔓荊子各等分
右爲末米糊丸如桐子大每服叁拾丸食後茶清下

退翳丸 治一切翳膜
蟬退 白菊花 夜明沙
車前子 連翹各伍錢 黃連去鬚
蛇退去土微炒
右爲末用猪肝煮爛爲丸如梧子大每服叁拾丸薄荷湯下

石決明散 治障瞖
石決明煅 枸杞子 木賊
荊芥 晚桑葉 穀精草
粉草 金沸草 蛇退

蒼朮 白菊花各等分
右爲末每服貳錢茶清調食後服

韓相進靈丹 去內外障
防風 石決明 威靈仙
蕤仁 蛤粉 穀精草
枸杞子 蒼朮 甘草
菊花各壹兩
右爲末用雄猪肝壹具竹刀切開去膜[illegible]爛和藥爲丸如菉豆大每服叁拾丸[illegible]

治內外障有淚

羌活　甘草　蒼朮

川芎　木賊　菊花

石決明　石膏　蒺藜

蛇蛻　旋覆花　蟬蛻

青葙子　楮實各等分

右爲細末煉蜜丸龍眼大食後茶清湯嚼下

甘菊湯　治內外障翳一切眼疾

甘菊花　升麻　石決明

旋覆花　芎藭　大黃炒各半兩

羌活去蘆　地骨皮　石膏碎

木賊炒　青葙子　車前子

黃芩去黑心　防風去蘆　梔子仁

草決明炒　荊芥穗　甘草炙各壹兩

黃連去鬚各貳錢半

右剉碎每服叁錢水壹盞蜜少許同煎至柒分去滓夜臥食後溫服

太陰玄精石散　治內外障眼

玄精石壹兩細研須眞者　蟬退洗去土

菊花去梗各壹兩　石決明煅存性　羌活各半兩

甘草半兩

右爲細末每服壹錢食後麥門冬湯調下

羊肝散　治內外障翳眼

右用羊肝壹具竹刀批開[illegible]用沙糖貳錢七摻在肝內麻線縛定[illegible]煮令肝轉色白取出爛嚼[illegible]用湯送下食後服

蟬花散　治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外障眼

蟬蛻洗淨去土　菊花去梗　穀精草洗去土

白蒺藜炒　防風去蘆　羌活

蜜蒙花去梗　草決明炒　黃芩去土

川芎不見火　蔓荊子　山梔子去皮

荊芥穗　木賊草　甘草炙各等分

右爲細末每服貳錢用茶清調服或荊芥湯入茶少許調服亦可食後臨臥皆可服

開明散　治風毒氣眼朦澀障膜

甘菊花去萼貳兩　防風　羌活

蒺藜炒去刺　川芎　天麻

茯苓　蒼朮童便浸壹伯焙　蟬蛻各半兩

荆芥　茺蔚子　華陰細辛

甘草炙各貳錢半

右為細末每服貳錢食後鹽湯調服

草龍膽散　治上焦風熱氣毒攻衝眼目暴赤碜痛羞明多眵迎風有淚翳膜努肉攀睛

龍膽草去蘆　木賊去節　菊花去梗

草决明微炒　甘草炙各貳兩　香附子炒去毛

川芎不見火各肆兩

右為細末每服貳錢用麥門冬熟水入砂糖少許同煎食後調服或米泔調服亦可

單服蒼朮法　補下元明目治内外障

金州蒼朮拌大與削令淨稱壹斤分作肆分壹分用無灰好酒浸叁日壹分用米醋浸叁日壹分用童便浸叁日壹[illegible]分用米泔浸伍日壹日壹換

右浸日數足漉出更不淘洗切作片或晒或焙乾入黑芝麻叁肆兩同入鍬上炒令甘香搗為細末以前浸藥餘酒煮糊為丸如桐子大若酒少入醋些少丸每服肆伍拾丸白湯或酒送下

菩薩膏　治内外障

滴乳　南硼砂各貳錢　片腦半錢

蕤仁[illegible]　蕪荑去殼各拾枚　白沙蜜壹兩

右先將蕪荑蕤仁研去油入諸藥再研取沙蜜於湯瓶上蒸熔以紙濾過同諸藥攪勻用

瓶盛貯紙封遇患挑少許在盞内沸湯泡洗

洗眼方　治内外障翳膜赤脉昏澀

右以桑條於二三月間採嫩者曝乾淨器内燒過令火自滅成白灰細研每用叁錢入磁器或銀石器中以沸湯泡打轉候澄傾清者入於別器内更澄以新綿濾過取清者置重湯内令熱開眼淋洗逐日壹次但是諸眼疾皆効

立應散　治内外障翳昏澀多淚及暴赤眼一

切目疾並皆治之叄次嗃鼻

香白芷洗　當歸洗去蘆　雄黃另研後入

鵞不食草淨洗　川附子炮各等分　躑躅花半兩

右為細末入麝香少許和勻含水嗃鼻內去盡濁涕眼淚為度

治內外障眼嗃藥

麻黃根壹兩　當歸身壹錢

右同為麤末炒黑色入麝香乳香少許乃為細末口含水鼻內嗃之

蟾光膏　治遠年病目不通道路退去雲膜須用十二月開成日合

白砂蜜貳兩用隔年葱根去鬚皮切碎與蜜同熬去白膜候葱熟為度以綿濾淨紙取蠟面

黃丹　蜜陀僧各水飛叄錢生用

爐甘石火煅各錢水飛

已上叄味研極細入前蜜中桃柳無節者各壹枝攪勻

當歸　赤芍藥各半兩　黃連去蘆各試兩

杏仁湯泡去皮尖　川芎各伍錢　秦皮

訶子皮　防風　石膏

玄精石　井泉石　無名異

玄參　代赭石　石決明各叄錢

已上拾伍味㕮咀用雪水或長流水伍升於銀器內熬至貳升濾去滓淨再熬至壹升傾入前藥蜜內銀器內慢火熬紫金色時再下後藥勿令過火

乳香　沒藥　琥珀

硃砂　蕤仁各叄錢

已上五味先乾研極細入蕤仁研細水飛澄清極細方傾入前藥一同復熬以筯點藥於水中不散為度勿令過與不及取下於土中埋七日取出置於銀器或磁器中如法收貯便再添入後細藥以桃柳枝攪勻

南硼砂　珎珠　龍腦

珊瑚枝各壹錢　麝香半錢

右五味硏極細入藥中封定如有取不盡藥用淨水斟酌洗滌熬過另於洗眼或膏子潤

了傾些小調解

碧霞膏　治內外障並効

爐甘石　黃丹各肆兩　銅綠貳兩

黃連壹兩　當歸尾貳錢　乳香

沒藥　朱砂　硼砂

血竭　海螵蛸　青鹽

白丁香　輕粉各壹錢　麝香伍分

右爲細末黃連膏爲丸如皂角子大每用壹丸新汲水半盞於磁盒內浸洗每壹丸可洗肆伍次大病不過壹月小病半月冷淚叁日見効

日精月華光明膏　能開一切內障善治翳膜遮睛及攀睛努肉不日掃除無問年久日深或單目兩目俱患但能見人影者悉皆治之如雲開見日

黃連[illegible]　當歸壹兩　訶子壹對去核研

石決明[illegible]　石膏壹兩水飛[illegible]

大鵞梨[illegible]　猪胰貳具[illegible]

爐甘石肆兩火燒童子小便淬燒伍次　黃丹肆兩炒研細

馬牙硝貳錢半飛　銅綠研　真膽礬研

鵰砂各壹錢半另研　沒藥肆錢另研　乳香叁錢另研

防風壹錢　天花粉半錢　輕粉半錢另研

麝香半錢另研　片腦半錢另研

右先將黃連等伍味浸叁日却用大砂鍋壹口內藥水再添滿叁分熬重綿濾過至肆伍椀却入鵞梨猪胰再熬至叁椀再濾過再下鍋入爐甘石黃丹再熬至貳椀又濾過却下馬牙硝等捌味以槐柳枝不住手攪匀候成膏仍濾淨入瓶內却入腦麝粉叁味攪匀以油紙密封勿令水入放冷水內浸叁日取出每用以銅筋點眼良

瞳神散大　熟地黃丸　治血弱陰虛不能養心致火旺於陰分瞳子散大少陰爲火君主無爲不行其令相火代之與心包絡之脉出心系分爲三道少陽相火之體無形其用在中矣火盛則能令母實乙木肝旺是也

之脉挾目系肝之脉連目系況手足少陽之脉同出耳中至耳上角斜起終於目外小眥風熱之盛亦從此道來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物昏花血虚陰弱故也法當養血凉血益血收火散火而除風熱則愈矣

熟地黄 壹兩　柴胡 去苗捌錢　生地黄 酒浸焙柒錢半

當歸身 酒洗　黄芩 各半兩　天門冬 去心焙

五味子　地骨皮　黄連 各叁錢

人參 去蘆　枳殼 炒　甘艸 炙各貳錢

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服壹百丸茶湯送下食後日貳服制之緩也大忌辛辣物助火邪及食寒冷物損其胃氣藥不上行也

又一論云瞳子黑眼法於陰由食辛熱之物助火乘於胸中其睛故散睛散則視物亦大也

保命集當歸湯 治瞳散補益瞳子散大

黄連　柴胡 各壹錢　當歸身

黄芩　芍藥 各貳錢　熟地黄

甘草 炙各叁錢

右水煎臨卧服

濟陰地黄丸 治足三陰虧損虚火上炎致目睛散大視物不的或昏花澀緊作痛畏明或卒見非常之處等證其功効與六味還少丹相似

五味子　麥門冬　當歸

熟地黄　肉蓯蓉　山茱萸

乾山藥　枸杞子　甘菊花

巴戟肉 各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服柒捌拾丸空心白湯下

瞳神緊小

抑陽酒連散 治神水緊小漸如菜子許及神水外圍相類蟲蝕者然皆能覩物不昏微有眊矂羞澀之證

生地黄　獨活　黄蘗

防風　知母　防已 各叁分

蔓荊子　前胡　羌活

白芷　生甘草各肆分　黃芩酒製
梔子　寒水石　黃連酒製各伍分
水貳盞煎至壹盞去滓大熱服
右方抑陽緩陰之藥也以生地黃補腎水眞陰爲君獨活黃蘗知母俱益腎水爲臣蔓荊子羌活防風白芷羣隊升陽之藥爲佐者謂既抑之令其分而更不相犯也生甘草黃芩梔子寒水石防已黃連寒而不走之藥爲使者惟欲抑之不欲祛除也酒製者爲引導也
還陰救苦湯　嚐鼻碧雲散俱目赤

目昏花　羊肝丸　鎮肝明目
羯羊肝壹具新瓦盆中焙了更焙之肝大止用壹半
甘菊花　羌活　栢子仁
細辛　官桂　白朮
五味子各半兩　黃連柒錢半
右爲細末煉蜜丸如梧子大空心食前溫湯下叁肆拾丸
千金補肝散　治目失明
青羊肝壹具去膜薄切以瓦瓶子未用者於中炭火炙之爲極細末
蓼子壹合熬令香
右爲末食後服方寸匕日貳加至叁匕不過壹貳劑能一歲服可夜讀細書
養肝丸　治肝血不足眼目昏花或生眵淚
當歸酒洗　車前子酒蒸　防風去蘆
白芍藥　蕤仁去殼　熟地黃酒蒸焙
川芎　枳實各等分
右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服柒拾丸熟

水送下不拘時　一方無川芎枳實
地黃丸一名菊花丸　治用力勞心肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜兼肝腎風毒熱氣上衝目痛久視傷血血主肝故勤書則傷肝而目昏肝傷則木生風而熱氣上湊目昏亦盛不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣
熟地黃壹兩　甘菊花　防風
光明硃砂　羌活　桂心
沒藥各半兩　決明子　黃連各壹兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食後熟水下日叁晉范甯嘗苦目痛就張湛求方湛戲之曰古方宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太冲凡此諸賢並有目疾得此方云省讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦起晚五夜早眠六凡六物熬以神火下以氣篩蘊於胷中七日然後納諸方寸修之一時近能數其目睫遠視尺箠之餘長服不已

非但明目且亦延年審如是而行非可謂之嘲戲亦奇方也

補肝湯　治肝虛兩脇滿痛筋脈拘急不得喘息眼目昏暗面多青色

防風去叉　細辛去苗　栢子仁
白茯苓去皮　官桂去粗皮　山茱萸
蔓荊子去浮皮　桃仁去皮尖麩炒　甘草微炒各等分

右㕮咀每服伍錢水壹盞半大棗貳枚擘破同煎至捌分溫服無時日再

雷巖丸　治男婦肝經不足風邪內乘上攻眼睛淚出羞明怕日多見黑花翳膜遮睛瞼生風粟或痒或痛隱澀難開兼久患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能旣濟肝木此藥久服大補腎藏添目力

枸杞子　菊花各肆兩　肉蓯蓉
巴戟酒浸去心　牛膝去蘆各壹兩　川椒去目叁兩
黑附子青鹽貳錢以泔水叁升同煮水盡去皮臍

右爲細末浸藥酒煮麵糊和丸梧子大每服拾丸空心酒送下

補肝丸　治眼昏暗將成內障

茺蔚子　青葙子　枸杞子
五味子　決明子　杏仁
茯苓去皮各壹兩　乾地黃叁兩　兎絲子貳兩
山藥　車前子　地骨皮焙
柏子仁　大黃　黃芩去黑心
黃連去鬚　人參　細辛
防風去叉　甘草炙各壹兩半

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸加至叁拾丸食後米飲下

石決明丸　治證同上

石決明　槐子　肉蓯蓉酒浸壹宿去鱗甲炙乾　兔絲子酒浸叁日曝乾另研爲末　陽起石酒浸七日細研水飛過　熟地黃各壹兩　桂心半兩　磁石壹兩半火煅醋淬七次細研水飛過

右爲細末煉蜜和擣貳叁百杵丸如梧子大每服貳拾丸旋加至叁拾丸食前鹽湯下

益本滋腎丸

黃蘗去麁皮　知母去毛各剉碎酒洗炒各等分

右爲極細末滴水丸如桐子大每服壹伯伍拾丸空心熱湯下服後以乾物壓之

補腎丸　治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸成內障

磁石煅醋淬七次水飛過　兔絲子酒浸焙貳次　五味子　枸杞子　石斛去根各貳兩　熟地黃酒蒸焙　覆盆子酒浸　楮實子

蓯蓉酒浸焙　車前子酒蒸各壹兩　沉香　青鹽各半兩另研

右爲末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心鹽湯下

六味地黃丸　八味地黃丸並見虛勞

千金磁硃丸　石斛夜光丸

益陰腎氣丸　滋陰地黃丸並見內障

羚羊羌活湯　治肝腎俱虛眼見黑花或作蠅翅

羚羊角鎊　羌活　黃芩去黑心　附子炮去皮　人參　澤瀉　秦艽去苗　山茱萸　車前子　青葙子　決明子微炒　柴胡去苗各壹兩半　黃芪壹兩　甘草炙半兩

每服伍錢水壹盞半煎至捌分去滓不拘時溫服日再

菊睛丸　治肝腎不足眼昏常見黑花多淚

枸杞子叁兩　蓯蓉酒浸炒　巴戟去心各壹兩

甘菊花 肆兩

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服伍拾丸溫酒鹽湯食遠任下 余太宰方加熟地黃貳兩 一

石決明丸 治肝虛血弱日久昏暗

知母 焙　山藥　熟地黃 焙
細辛 去苗 各壹兩　石決明　五味子
兎絲子 酒浸 各壹兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲送下

駐景丸 治肝腎虛眼昏翳

熟地黃　車前子 各叁兩　兎絲子 酒浸 伍兩

爲末煉蜜丸桐子大每服伍拾丸食前白茯苓石菖蒲湯任下 又方加枸杞子 壹兩 尤佳

加減駐景丸 治肝腎氣虛視物䀮䀮血少氣多

車前子 炒　五味子　枸杞子 各貳兩
當歸 去蘆　熟地黃 各伍兩　楮實 無翳者不用
川椒 炒 各壹兩　兎絲子 酒浸 焙 半斤

右爲細末蜜水煮糊丸如桐子大每服叁拾丸空心溫酒送下鹽湯亦可

白附子散 治發散初起黑花昏朦內障

荊芥　白菊花　防風
木賊　白附子　甘草
蒼朮　人參　羌活
蒺藜

右水煎食後服

補腎磁石丸 治腎肝氣虛上攻眼目昏暗遠視不明時見黑花漸成內障

磁石 火煅醋淬　甘菊花　石決明
肉蓯蓉 酒浸　兎絲子 酒浸 各壹兩

右爲細末用雄雀拾伍隻去毛嘴足留肚腸以青鹽貳兩水叁升同煮令雄雀爛水欲盡爲度取出先搗如膏和藥末爲丸如梧子大每服貳拾丸空心溫酒送下

千金神麴丸 [illegible]

三仁五子丸 治[illegible]不足體弱眼昏[illegible]

花不計近遠
栢子仁　薏苡仁　酸棗仁
兎絲子酒製　五味子　枸杞子酒蒸
覆盆子酒浸　車前子酒浸　肉蓯蓉
熟地黃　白茯苓　當歸
沉香各等分
右為細末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸空
心用鹽酒送下
羚羊角散　治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

羚羊角鎊　羌活去蘆　玄參
車前子　黃芩去黑心　山梔仁
瓜蔞各半兩　胡黃連　菊花各柒錢半
細辛去苗貳錢半
右為細末食後竹葉煎湯調服貳錢
蕤仁丸　治眼見黑花飛蠅澀痛昏暗漸變青
盲
蕤仁去皮　地膚子　細辛去苗
人參　地骨皮去土　石決明洗淨別搗細

白茯苓去皮　白朮各貳兩　熟地黃焙
楮實各六兩　空青另研　防風去叉各壹兩半
石膽半兩研如粉　鯉魚膽伍枚　青羊膽壹枚
右為細末研勻以膽汁同煉蜜搜和丸如桐
子大每服貳拾丸食後米飲送下
熟地黃丸見擁神散人
摩頂膏　治肝腎虛風上攻眼生黑花或如水
浪
空青研　青鹽各研半兩　槐子

木香　附子各壹兩　牛酥貳兩
鵞脂肆兩　旱蓮草自然汁壹升
龍腦半錢　丹砂貳錢半研
右為細末先以旱蓮草汁牛酥鵞脂銀器中
熬叁伍沸下諸藥末煎減壹半即止盛磁器
中臨臥用舊鏵鐵壹片重貳叁兩蘸藥於頂
上摩貳叁拾徧令入髮竅中次服決明丸忌
鐵器
又方　治眼前見花黃黑紅白不定

附子炮裂去皮臍 木香各壹兩 朱砂貳錢半
龍腦半錢 青鹽壹兩 牛酥貳兩
鵝脂肆兩
右將前藥爲末同酥脂以慢火熬成膏每用
少許不拘時頂上摩之
決明丸 治眼見黑花[illegible]
決明子 甘菊花[illegible]兩 防風去蘆
車前子 [illegible] 細辛
梔子仁 蔓荊子 玄參

白茯苓 薯蕷各半兩 生地黃柒錢半
右爲細末煉蜜和搗貳叁伯杵丸如梧子大
每服貳拾丸食後煎桑枝湯送下日叁
白龍粉 治腎水衰虛肝經邪熱視物不明或
生障翳努肉攀睛或迎風淚出眼見黑花或
如蠅飛或如油星或睛澀腫痛或痒不可忍
並皆治之
右用硝叁斤於二九月造壹大罐熬水化開
以綿濾過入銀器或石器內煎至壹半已上
[illegible]內放溫傾銀盆內於露地放壹宿次日
結成塊子於別水內洗淨再用小罐熬水化
開熬入蘿蔔貳箇切作片子同煑以蘿蔔熟
爲度傾在磁器內撈蘿蔔不用於露地露壹
宿次日結成塊子去水於日中曬壹日去盡
水入好紙袋盛放於透風日處掛曬至風化
開成用逐旋於乳鉢內研極細點眼如常
法亦名玄明粉
煑肝散 治眼生黑花漸成內障及鬬睛偏視

風毒攻眼腫痛澀痒短視倒睫雀目
羌活去蘆 獨活去蘆 青葙子
甘菊花各壹兩
右爲細末每服叁錢匕羊子肝壹葉劃細淡
竹葉數片同裹如粽子別用㷀黑豆肆拾玫
粒米泔壹碗銀石器內同煑黑豆爛泔乾爲
度取肝細嚼溫酒下又將豆食盡空心日午
夜卧服
服椒方 治肝腎虛風上攻眼目生黑花[illegible]

不利能通神延年用川椒壹斤揀淨去目及合口者於銚內炒令透於地上鋪淨紙貳重用新盆合定周廻用黃土培之半日去毒出汗然後取之曝乾爲度只取椒於磁盒子內收每日空心新汲水下拾粒

芎藭散 治目昏澀視物不明

芎藭 地骨皮 荊芥穗
何首烏去皮 甘菊花 旋覆花
草決明 石決明刷淨 甘草炙各壹兩
青葙子 蟬蛻去土 木賊各半兩
白芷貳錢半

右爲細末每服壹錢匕食後米泔水調下

磁石丸 治眼因患後起早元氣虛弱目無翳膜視物昏暗欲成內障

磁石貳兩燒醋淬七次杵碎細研水飛過
肉蓯蓉壹兩酒浸壹宿去皴皮炙令乾
菟絲子酒浸伍日曬乾另研爲末叁兩
補骨脂微炒 巴戟去心 石斛去根

遠志去心 熟地黃各壹兩 木香
五味子 甘草炙 桂心各半兩

右爲細末研勻煉蜜和擣貳叁百杵丸如梧子大每服叁拾丸食前溫酒送下一方有茯神無遠志石斛

四物五子丸 治心腎不足眼目昏暗

當歸酒浸去皮 川芎 熟地黃
白芍藥 枸杞子 覆盆子
地膚子 菟絲子酒浸炒 車前子隨意量虛實加減各等分

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服伍拾丸不拘時鹽湯送下

杞苓丸 治男子腎藏虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障

枸杞子肆兩酒浸 白茯苓捌兩去皮 當歸貳兩
菟絲子肆兩酒浸 青鹽壹兩別研

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸食前用白湯送下

瑞竹四神丸 治腎經虛損眼目昏花補虛益損及雲翳遮睛

甘州枸杞子 壹斤揀色赤滋潤者以酒壹杯潤之分作肆分 壹分同川椒壹兩炒壹分同小茴香壹兩炒壹分同芝麻壹合炒壹分獨炒用

炒過將川椒等篩去不用再加熟地黃白朮白茯苓各壹兩共為細末煉蜜和丸如梧子大每服伍柒拾丸空心溫酒送下或加甘菊花壹兩

夜光丸 [illegible]名要 治眼目昏暗及諸疾兼退翳膜

蜀椒 去目并合口者炒出汗壹斤半搗末壹斤 甘菊花 取末壹斤

右和勻取肥地黃拾伍斤切搗研絞取汁捌玖升許將前藥末拌浸令勻曝稍乾入盤中攤曝叁肆日內取乾候得所即止勿令太燥入煉蜜貳斤同搗數千杵丸如梧桐子大每服叁拾丸空心日午熟水下久服目能夜視髮白再黑通神強志延年益壽一方用熟地黃貳兩酒浸九蒸九曝食後細嚼新淅米拾粒以湯送下或茶下亦得

密蒙花散 治冷淚昏暗

密蒙花 甘菊花 杜蒺藜

石決明 木賊 去節 白芍藥

甘草 炙各等分

右為細末每服壹錢茶清調下服半月後加[illegible]錢

[illegible]飲 治風熱上攻眼目不明常見黑花 見外障

遮睛補肝丸 [illegible]肝臟虛[illegible]目昏暗衝風淚下

白朮 細辛 去苗 芎藭

決明子 微炒 人參 羌活 去蘆

當歸 切焙 白茯苓 去皮 苦參

防風 去叉 官桂 去麤皮 地骨皮

玄參 黃芩 去黑心 五味子

車前子 微炒 菊花 青葙子

甘草 炙各等分

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸加至肆拾丸不拘時米飲下

鎮肝丸 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏[illegible]

暗痒痛隱澀難開多眵洒淚怕日羞明時發腫赤或生翳障

遠志去心　地膚子　茺蔚子

白茯苓去皮　防風去蘆　決明子

蔓荊子　人參各一兩　山藥

青葙子　柴胡去苗　柏子仁炒

甘草炙　地骨皮　玄參

車前子　甘菊花各半兩　細辛去苗

右為細末蜜水煮糊丸如桐子大每服叁拾丸食後用米湯下日叁

真珠煎　治肝虛寒目茫茫不見物

真珠貳錢半細研　鯉魚膽拾枚　白蜜半兩

右合和銅器中微火煎取壹半新綿濾過磁瓶中盛每以銅筯點如黍米著目眥即淚出頻點取瘥

又方

以黃蘗壹爪甲許每朝含使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此終身行之永除

眼疾

治暑月或行路目昏澀多眵粘者以生龍腦薄荷伍柒葉淨洗手揉爛以生絹捩汁滴入眼中妙

治眼目昏瞎

用桑老皮燒灰水壹盞煎至柒分去滓澄清洗壹週年如童子眼光明并開洗眼日于後

正月初八　二月初八　三月初五

四月初八　五月初八　六月初七

七月初七　八月初三　九月初十

十月初九　十一月初十　十二月二十二

又方　用朴硝陸錢重用水壹盞煎至捌分候冷定澄清下次分定每月壹日洗至壹年之間眼如童子光明

正月初一　二月初八　三月初四

四月初五　五月初五　六月初四

七月初五　八月初一　九月十三

十月十三　十一月十六　十二月初五

青魚膽方　治目暗

右用青魚膽汁滴目中

又方用鷹眼睛壹對炙乾擣末研令極細以人乳汁再研每以銅筯取少許點於瞳人上日夜參度可以夜見物或取臘月鸜鵒眼依上法用効　參日見碧霄中物忌烟熏

金絲膏　治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼痛

宣黃連半兩剉碎水壹盞浸壹宿取汁再添水半盞浸滓經半日絞取汁與前汁放壹處澄淨用水半盞浸

蜜壹兩　白礬壹字　井鹽壹分如無以青鹽代

山梔子好者貳錢槌碎與黃連滓同煎去殼滾湯取盡力淋濾去滓與前藥連汁壹處入餘藥

右用銀礶器內熬十餘沸用生絹上綿紙數重再濾過用時常點

點鹽法　明目去昏翳大利老眼得補益之良

右以海鹽隨多少淨揀以百沸湯泡去不淨濾取清汁於銀石器內熬取雪白鹽花用新瓦器盛每早用壹大錢作牙藥揩擦以水漱動用左右手指背遞互口內蘸鹽津洗兩眼大小眥內閉目良久却用水洗面名洞視千里明目堅齒實爲妙法東坡手錄目赤不可用湯浴并忌用湯泡足湯歸觸中熱併集於頭目喪明必矣

救睛丸　方缺　[illegible]

決明夜靈散　治目至夜則昏雖有燈月亦不能覩

石決明另研　夜明砂另研各貳錢

猪肝壹兩生用不食猪者以白羯羊肝代

右二藥末和勻以竹刀切肝作兩片以藥鋪於壹片肝上以壹片合之用麻皮纏定勿令藥得泄出淘米泔水壹大碗貯沙罐內不犯鐵器入肝藥於中煑至小半碗臨睡連肝藥汁服之

右方以決明鎮腎經益精爲君夜明沙升陽

主夜明爲臣米泔水主脾胃爲佐肝與肝合
引入肝經爲使

蛤粉丸　治雀目日落不見物
蛤粉細研　黄蠟等分
右熔蠟搜粉爲丸如棗大每用猪肝壹片貳
兩許批開裹藥壹丸麻線纏入罐内水壹碗
煮熟傾出乘熱薰目至溫喫肝以愈爲度

瀉肺飲　治肝虚雀目恐變成内障
防風去叉　黄芩去黑心　桔梗炒

芍藥　大黄炒各壹兩
右剉碎每服叁錢匕水壹盞半煎至壹盞入
芒硝半字去滓放溫食後臨卧服

猪肝散　治雀目
蛤粉　黄丹　夜明沙各等分
右末猪肝切開入藥末用線紮米泔水煮熟
不拘時嚼服原汁送下

夜明丸　治雀目青盲
夜明沙　木賊　防風
田螺殼　青木香　細辛各等分
右爲末爛煮猪肝用末藥於淨沙盆内研令
極勻丸如桐子大每服叁拾丸米飲或酒下

轉光丸　治肝虚雀目青盲
生地黄　白茯苓　川芎
蔓荊子　熟地黄　防風
山藥　白菊花　細辛各等分
右爲末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸空
心桑白皮湯送下

灸雀目疳眼法寶鑑
小兒雀目夜不見物灸手大指甲後壹寸内
臁横文頭白肉際灸壹炷如小麥大
小兒疳眼灸合谷貳穴各壹壯炷如小麥大
在手大指次指兩骨間陷者中　按灸法詳見資生等經故不備錄

[illegible]　瀉膽散　治瞳仁乾缺外障
玄參　黄芩　地骨皮
麥門冬　知母各壹兩　黄芪

茺蔚子各壹兩半

每服伍錢水壹盞煎伍分去滓食後溫服

[illegible] 天門冬飲子

天門冬　茺蔚子　知母各貳兩

五味子　防風各壹兩　人參

茯苓　羌活各壹兩半

每服伍錢水壹盞半煎伍分去滓食後溫服

玄參瀉肝散

麥門冬貳兩　大黃　黃芩

細辛　芒硝各壹兩　玄參

桔梗各壹兩半　右水煎食後服

麥門冬湯見目赤

雙目睛通　牛黃膏　治小兒通睛

牛黃壹錢　犀角貳錢　甘艸壹分貳釐

金銀箔各伍片

右為末煉蜜丸菉豆大每服柒丸薄荷湯下

倒睫拳毛　黃芪防風飲子　治眼稜緊急以致

倒睫拳毛損睛生翳及上下瞼皆赤爛羞澀

難開眵淚稠粘

蔓荊子　黃芩各半錢　炙甘草

黃芪　防風各壹錢　葛根半

細辛貳分　一方有人參壹錢當歸柒分半

水貳盞煎至壹盞去滓大熱服 [illegible]

右方以蔓荊子細辛為君除手太陽手少陰

之邪肝為二經之母子中必實此實則瀉其

子也以甘草葛根為臣治足太陰足陽明之

弱肺為二經之子母薄子單此虛則補其母

也黃芪實皮毛防風散滯氣用之以為佐黃

芩療濕熱去目中赤腫為之使也

無比蔓荊子湯　治證同上

黃芪　人參　生甘草各壹錢

黃連　柴胡各七分　蔓荊子

當歸　葛根　防風各伍分

細辛葉叁分

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服

右方爲肺氣虛黃芪人參實之爲君心受邪黃連除之肝受邪柴胡除之小腸受邪蔓荊子除之爲臣當歸和血葛根解肌爲佐防風療風散滯生甘草大瀉熱火細辛利九竅用藁者取其升上之意爲使也

決明益陰丸 見目痛　菊花決明散 見目赤

瀉肝散　洗刀散　五退還光散　五退散

皂角丸 俱見前

青黛散　治眼倒睫神効

棗樹上黃直棘針　蝟皮 炒焦

白芷　青黛 各等分

爲細末口噙水左眼倒睫左鼻內嗃之右眼倒睫右鼻內嗃之

四退散　治倒睫拳毛

蟬退　蛇退 醋煮　豬蹄退 炒

蠶退　荊芥 各貳錢半　川烏 炮

穿山甲 燒　粉草 各半兩

右爲末每服壹錢淡鹽湯調下又方加防風

石決明　草決明 各伍錢

起睫膏

木鼈子 去殼壹錢　自然銅 伍分 煆

右搗爛爲條子嗃鼻又以石燕末入片腦少許研水調敷眼弦上

起倒睫　用石燕爲細末先鑷去睫毛次用水調末貼眼弦上常以黃連水洗之

[illegible]神効黃芪湯　治目緊急縮小羞明畏日或隱澀難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少睛光或目中熱如火服伍六次神効

黃芪 貳兩　人參 去蘆　炙甘草

白芍藥 各壹兩　陳皮 去白半兩　蔓荊子 貳錢

每服肆伍錢水壹盞剉分煎至壹盞去滓臨臥稍熱服如小便淋澀加澤瀉伍分如有大熱證加黃檗叁錢酒洗如麻木不仁雖有熱不用黃檗再加黃芪壹兩如眼緊小去芍藥忌酒醋濕麪大料物葱韭蒜及淡滲生

冷硬物

撥雲湯 見外障

連翹飲子 治目中溜火惡日與火隱澀小角
緊久視昏花迎風有淚

連翹 當歸 紅葵花
蔓荊子 人參 甘草生用
生地黃各貳分 柴胡貳分 黃芩酒製
黃芪 防風 羌活各半錢
升麻壹錢

右剉每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓食後
稍熱服

雷巖丸 見目昏　蟬花無比散 見通治

睥肉粘輪

排風散 治兩瞼粘睛外障

天麻 桔梗 防風各貳兩
五味子 烏蛇 細辛
芍藥 乾蠍各半兩

右爲細末每服壹錢食後米飲調下

龍膽丸 治眼兩胞粘睛赤爛成瘡

苦參 龍膽草 牛蒡子各壹分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服貳拾丸食
後米泔下

廣大重明湯 見外障

風沿爛眼

紫金膏 見外障

菊花通聖散 治兩瞼赤爛又生風粟

白菊花壹兩半 滑石壹兩 石膏
黃芩 甘草 桔梗
牙硝 黃連 羌活各壹兩

防風 川芎 當歸
赤芍藥 大黃 薄荷
連翹 麻黃 白蒺藜
芒硝各半兩 荊芥 白朮
山梔子各貳錢半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片同煎
柒分食後服

洗刀散 見外障

柴胡散 治眼眶濕爛因風而作用冷氣藥

柴胡　羌活　防風
赤芍藥　桔梗　荊芥
生地黃　甘草
右水煎服
撥雲散 見外障　蟬花無比散 見通治
黃連散　治眼爛弦風
黃連　防風　荊芥
赤芍藥　五倍子　蔓荊子
覆盆子根 即甜瓜根

右煎沸入鹽少許濾淨又入輕粉末少許和
勻洗眼赤効
爐甘石散　治爛風眼
以爐甘石不拘多少先用童便煅淬柒次次
用黃連濃煎汁煅淬柒次再用穀雨前茶芽
濃煎煅淬柒次又併叁汁合在一處再煅
淬叁次然後安放地上一宿出火氣細細研
入氷片麝香照上件如煆時須用好紫銅炭
極大者鑿一孔以安爐甘石

[illegible]當歸飲子
當歸　大黃　柴胡
人參　黃芩　甘草
芍藥各壹兩　滑石半兩
右剉細每服叁錢至伍錢水壹盞生薑叁片
同煎柒分去滓溫服
河間當歸湯　治風邪所傷寒中目淚自出肌
瘦汗不止
當歸　人參各叁兩　官桂

陳皮各壹兩　乾薑炮　白朮
白茯苓　甘草　川芎
細辛　白芍藥各半兩
右為末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗貳枚
同煎至捌分去滓溫服不計時併叁服
枸杞酒　治肝虛風眼淚
右用枸杞子肥者貳升搗破內絹袋置罐
中以酒壹斗浸之密封勿泄氣候叁柒日每
日取飲之勿醉

二妙散　養肝氣治目昏視物不明淚下
當歸　熟地黃各等分
右爲細末每服貳錢匕不拘時無灰酒調下
治肝虛或當風眼淚鎮肝明目
右用臘月牯牛膽盛黑豆不計多少浸候百
日開取食後夜間吞叁柒粒神効
洗肝湯　治肝實眼
人參　黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮
山梔子仁　芎藭　柴胡去苗

地骨皮　甘菊花　桔梗炒各壹兩
黃連去鬚　甘草炙各半兩
右㕮咀每服叁錢水壹盞入苦竹葉柒片煎
至柒分去滓食後服
瀉肝湯　治目熱淚生翳者肝受熱故也
桑白皮炒　地骨皮去心各兩　甘草伍錢炒
右㕮咀每服叁錢白水煎食後服
木賊散　治眼出冷淚實則用此
木賊　蒼朮　蒺藜

防風　羌活　川芎
甘草
右水煎服
決明子方　治肝經熱止淚明目治風赤眼
右以決明子朝朝取壹匙接令淨空心水吞
下百日見夜光一方取決明作菜食之
羌活散　治目風冷淚久不瘥
羌活去蘆貳兩　木香　官桂去粗皮
胡黃連　山藥　升麻

艾葉醋炒各壹兩　牛膝酒浸切焙　山茱萸去核
白附子炮各柒錢半
右剉每服叁錢水壹盞煎至捌分去滓食後
溫服日叁
羌活散　治風氣攻眼昏澀多淚
羌活　川芎　天麻
旋覆花　藁本　防風
蟬蛻洗　甘菊花　細辛
杏仁去皮各壹兩　炙甘草半兩

右為細末每服貳錢新水壹盞半煎食後服

菊花散　治目風淚出

蒼朮（肆兩肥者用銀石器入河水同皂莢壹寸煮壹日去皂莢取朮銅刀刮去黑皮曝乾取叁兩）　菊花　木賊（新者）

草决明（洗曝乾）　荊芥穗　旋覆花

甘草（炙各壹兩）　蟬蛻（去頭足錢半）　蛇蛻（去炙貳錢半）

右為細末用不津器盛每服壹錢臘茶半錢同點空心臨臥時服

蟬蛻餅子　治目風冷淚去翳暈

蟬蛻（洗焙）　木賊（新者）　甘菊花（各壹兩）

荊芥穗　芎藭（各貳兩）　蒼朮（米泔浸焙叁兩）

甘草（炙半兩）

右為細末煉蜜和捏作餅子如錢大每服壹餅食後細嚼臘茶送下日叁

阿膠散　治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠　馬　鈴（各壹兩半）　紫苑

款冬花（各壹兩）　甘　（半兩）　白蒺藜（貳錢半炒）

糯米（壹兩）

右㕮咀每服貳錢水壹盞半煎捌分温服不拘時候

本事方治頭風冷淚龐安常二方

甘菊花　决明子（各貳錢）　白朮

羌活　川芎　細辛

白芷　荊芥穗（各半兩）

右為細末每服壹錢食後温湯調下日叁

又方

川芎　甘菊　細辛

白芷　白朮（各等分）

右為末蠟丸如黍米大夜臥服壹丸日中壹時辰換壹丸

川芎丸（本事）　治風盛隔壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒閒緊急作頭痛

川芎　柴胡（各壹兩）　半夏麴

甘草（炙）　甘菊　人參

前胡　防風（各半兩）

右每服肆錢水壹盞生薑肆片薄荷伍葉同
煎柒分去查溫服

銀海止淚方

蒼术（米泔浸壹兩半） 木賊（去節貳兩） 香附子（炒去毛）

右爲末煉蜜丸如桐子大食後鹽湯下叁丸

治冷淚方

夏枯草 香附子（各等分）

右爲細末麥門冬湯調下

又方用胞棗叁枚去核以花椒貳拾粒入內用

濕紙裹煨熟細嚼白湯下

立應散 治冷淚

橡斗子（壹箇） 甘草（叁錢）

右爲細末每服貳錢熟水調下

楮實散 治冷淚

楮實子（去白膜炒） 夏枯草 甘草（各半兩）

香附子（炒） 夏桑葉（炒各壹兩）

右爲細末熟水調服不拘時

白殭蠶散 治衝風淚出

白殭蠶（炒） 粉草 細辛

旋覆花 木賊（各伍錢） 荊芥（貳錢半）

嫩桑葉（壹兩） 右水煎食後溫服

真珠散 治肝虛目風淚出

真珠（研） 丹砂（研各壹分） 乾薑（研貳分）

貝齒（伍枚以炭火煆爲粉末）

右研極細令勻以熟絹帛羅叁遍每仰卧以
少許點眼中合眼少時

乳汁煎 治風淚澀痒

人乳（壹升） 黃連（去鬚研取末壹錢半）

蕤仁（研爛壹兩） 乾薑（炮爲末貳錢半）

右除乳外再同研極細以乳漬壹宿明旦內
銅器中微火煎取叁合綿濾去滓每以黍米
大點眥中勿當風點

止淚散 治風眼流淚不止

爐甘石（壹錢） 海螵蛸（叁分） 片腦（伍釐）

右研細點眼大眥頭目井口淚自收二藥澡
要加腦和則不澀也

人參散　治眼冷淚不止

香附子　川椒目各等分　蒼朮

麝香許各少　右爲細末吹鼻中

睥瘡疱消毒飲　治瞼生風粒

大黃　荆芥　牛蒡子

甘艸

右水煎食後溫服

防風散結湯　治目上下瞼隱起肉疣用手法除病後服之

防風　羌活　白芍藥

當歸尾　茯苓　蒼朮

獨活　前胡　黃芩各伍分

炙甘草　防巳各陸分　紅花

蘇木各少許

右作壹服水貳盞煎至壹盞熱服査再煎

右方以防風羌活升發陽氣爲君白芍藥當歸尾紅花蘇木破凝行血爲臣茯苓瀉邪氣蒼朮去上濕前胡利五臟獨活除風邪黃芩療熱滋化爲佐甘草和諸藥防巳行十二經爲使病在上瞼者加黃連柴胡以其手少陰足厥陰受邪也病在下瞼者加藁本蔓荆子以其手太陽受邪也

漏睛五花丸　治漏睛膿出目停風熱在胞中結聚膿汁和淚相雜常流涎水久而不治至烏珠墜落

金沸草肆兩　巴戟叁兩　川椒皮

枸杞子　白菊花各貳兩

右末煉蜜丸梧桐子大每服貳拾丸空心鹽酒下

白薇丸　治漏睛膿出

白薇伍錢　防風　蒺藜

石榴皮　羌活各叁錢

右末米粉糊丸桐子大每服貳拾丸白湯下

糖煎散見外障

治眼膿漏不止

黃耆　防風　大黃

黄芩各叁兩 人參 遠志去心
地骨皮 赤茯苓 蒲蘆各貳兩
右每服伍錢水煎食後服
竹葉瀉經湯 治眼目癮澀稍覺眊矂視物微
昏内眥開竅如鍼目痛按之浸浸膿出
柴胡 梔子 羌活
升麻 炙甘艸 黄連
大黄各伍分 赤芍藥 草決明
茯苓 車前子 澤瀉各肆分
黄芩陸分 青竹葉壹拾片

作壹服水貳鍾煎至壹盞食後稍熱服
右方逆攻者也先以行足厥陰肝足太陽膀
胱之藥爲君柴胡羌活是也二經生意皆總
於脾胃以調足太陰足陽明之藥爲臣升麻
甘草是也肝經多血以通順血脉除肝邪之
藥膀胱經多濕以利小便除膀胱濕之藥爲
佐赤芍藥草決明澤瀉茯苓車前子是也總
破其積熱者必攻必開必利必除之藥爲使

梔子黄芩黄連大黄竹葉是也
蜜劑解毒丸 治證同上
石蜜煉壹斤 山梔拾兩末 大黄伍兩末
杏仁去皮尖貳兩另研
蜜丸梧子大每服叁拾丸加至百丸茶湯下
右方以甘潤治燥爲君爲燥爲熱之原也山
梔子微苦寒治煩爲臣爲煩爲熱所産也石
蜜甘平温安五臟爲佐爲其解毒除邪也大
黄苦寒性走不守瀉諸實熱爲使爲攻其積
不令其重疊不解也

東垣龍膽飲子 治肝眼流膿生瘡翳濕熱爲
病
黄芩炒 青蛤粉 草龍膽酒洗炒黄
羌活各叁錢 升麻貳錢 麻黄壹錢半
蛇退 穀精草 川鬱金
炙甘草各半錢
右爲細末食後茶調服貳錢
地芝丸 亦能治脉風成瘡

生地黃焙 天門冬去心各肆兩
枳殼炒 甘菊花去蒂各貳兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服壹佰丸茶
清送下
能近視不能遠視 定志丸
遠志去苗 菖蒲各貳兩 人參
白茯苓各壹兩去皮
爲細末煉蜜丸以朱砂爲衣每服拾丸加至
貳拾丸米飲下食後

目閉不開 助陽活血湯見目痛
目爲物所傷 除風益損湯
熟地黃 當歸 白芍藥
川芎各壹錢 藁本 前胡
防風各柒分
作壹服水貳盞煎至壹盞去滓大熱服
右方以熟地黃補腎水爲君黑睛爲腎之子
此虛則補其母也以當歸補血爲目爲血所
養今傷則血病白芍藥補血又補氣爲血病

氣亦病也爲臣川芎治血虛頭痛藁本通血
去頭風爲佐前胡防風通療風邪俾不凝留
爲使兼治亡血過多之病傷於眉骨者病自
目系而下以其手少陰有隙也加黃連療之
傷於頰者病自抵過而上傷於耳者病自銳
眥而入以其手太陽有隙也加柴胡療之傷
於額交顛耳上角及腦者病自內眥而出以
其足太陽有隙也加蒼朮療之傷於耳後耳
角耳前者病自客主人斜下傷於頰者病自

銳眥而入以其足少陽有隙也加龍膽草療
之傷於額角及巔者病自目系而下以其足
厥陰有隙也加五味子療之凡傷甚者從權
倍加大黃瀉其敗血睢多淚多羞澀赤腫者
加黃芩療之
加減地黃丸 治目爲物傷
生地黃酒 熟地黃各半斤 牛膝
當歸各叁兩 枳殼貳兩 杏仁去皮
羌活 防風各壹兩 一本各等分

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服叄拾丸空心食前溫酒送下淡鹽湯亦可

右方以地黃補腎水眞陰爲君夫腎水不足者相火必盛故生熟地黃退相火也牛膝逐敗血當歸益新血爲臣鉄炒枳殼和胃氣謂胃爲多血生血之所是補其原杏仁潤燥謂血少生燥爲佐羌活防風俱升發淸利大除風邪爲使七情五賊勞役饑飽之病睛痛者與當歸養榮湯兼服傷寒愈後之病及血少血虛血亡之病俱宜服也

補肝丸　補腎丸　石決明丸

犀角丸　生熟地黃丸（倶見內外障）

加味四物湯　治打損眼目

當歸　川芎　白芍藥

熟地黃　防風　荆芥（各等分）

右㕮咀爲散每服叄錢水壹盞半煎至壹盞再入生地黃汁少許去滓溫服再以生地黃杏仁（一兩去皮尖）研細用綿子裹藥放在眼上

令乾再將瘦豬肉薄切貼於眼上再服局方黑神散

局方黑神散

蒲黃　熟地黃　肉桂

當歸　赤芍藥　白薑

甘草（各等分）

右爲末童子小便生地黃汁相和調服

內消散　治傷損眼

羌活　獨活　蘇木

紅內消　當歸　川芎

大黃　鈎藤　白芷

紅花　桃仁　甘草節

赤芍藥　生地黃　瓜蔞根

紫金皮　金鎖匙　血竭草

右水煎食後服次用生地黃壹兩杏仁伍拾枚搗爛貼眼上復以精豬肉貼之

又方

羌活　獨活　紅內消

蘇木　赤芍藥　鈎藤
白芷各伍錢　甘草節叁錢　地榆
瓜蔞根各肆錢
右㕮咀每服叁錢白水煎食後服
經效散　治撞刺生翳
大黃　當歸　赤芍藥各半兩
粉草　連翹各貳錢半　北柴胡壹兩
犀角壹錢　右水煎食後服
一綠散　治打撲傷損眼胞赤腫疼痛

芙蓉葉　生地黃各等分
右搗爛敷眼胞上或爲末以鷄子清調勻敷
治目被物刺損有翳
生地黃　生薄荷　生巨葉
生土當歸　朴硝
右不拘多少搗爛貼太陽二穴
傷寒愈後之病　人參補陽湯　治傷寒餘邪不
散上走空竅其病癮澀赤脹生翳羞明頭腦
骨痛

羌活　獨活各陸分　白芍藥
生地黃　澤瀉各叁分　人參
白朮　茯苓　黃耆
炙甘草　當歸　熟地黃酒洗焙各肆分
柴胡　防風各伍分
作壹服水貳盞煎至壹盞去柤熱服
右方分利陰陽升降上下之藥也羌活獨活
爲君者導陽之升也茯苓澤瀉爲臣者導陰
之降也人參白朮大補脾胃內盛則邪自不

容黃芪防風大實皮毛外密則邪自不入爲
之佐也當歸熟地黃俱生血謂目得血而能
視生地黃補腎水謂神水屬腎白芍藥理氣
柴胡行經甘草和百藥爲之使也
羌活勝風湯見外障　加減地黃丸見前
嗃鼻碧雲散見目赤
前胡犀角湯　治傷寒兩目昏暗或生浮翳
前胡去蘆　犀角屑　蔓荊子
青葙子　防風去叉　梔子仁

麥門冬去心 生地黃焙 菊花
羗活去蘆 决明子微炒 車前子微炒
細辛 甘草炙各壹兩 黃芪壹兩半
右剉每服伍錢水壹盞半煎至捌分去滓食
後温服

羗蔚子丸 治時氣後目暗及有翳膜
羗蔚子 澤瀉各壹兩半 枸杞子
青葙子 枳殼去瓤麩炒 生地黃焙各壹兩
石决明 麥門冬去心焙 細辛去苗葉
車前子各半兩 黃連去鬚叁兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食
後熟水送下

瀉肝散 治天行後赤眼外障
知母 黃芩 桔梗各壹兩半
羗蔚子 大黃 玄參
羗活 細辛各壹兩
右剉每服伍錢水壹盞半煎至伍分去滓食
後温服

痘疹餘毒

羚羊角散 治小兒斑疹後餘毒不解上攻眼目生翳羞明眵淚俱多紅赤腫閉
羚羊角鎊 黃芩 黃芪
草决明 車前子 升麻
防風 大黃 芒硝各等分
作壹服水壹盞煎半盞去滓稍熱服
右方以羚羊角主明目爲君升麻補足太陰以實內逐其毒也黃芪補手太陰以實外禦其邪也爲臣防風升清陽車前子瀉濁陰爲佐草决明療赤痛淚出黃芩大黃芒硝用以攻其錮熱爲使然大黃芒硝乃大苦寒之藥智者當量其虛實以爲加減未滿二十一日而目疾作者消毒化斑湯主之

消毒化斑湯 治小兒斑疹未滿二十一日而目疾作者餘治同上
羗活 升麻 防風
麻黃各伍分 黃連 當歸
酒黃蘗 連翹各叁分 藁本

酒黃芩　生地黃　蒼朮泔浸炒

川芎　柴胡各貳分　細辛

白朮　生芩　陳皮

生甘草　蘇木　葛根各壹分

吳茱萸　紅花各半分

作壹服水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服

右方功非獨於目且甚於瘢者而設也今以治瘢之劑治目者以其毒所熾盛又傷害於目也夫瘢疹之發由膀胱壬水克小腸

丙火羌活藁本乃治足太陽之藥次則腎經癸水又克心火細辛主少陰之藥故爲君終則二火熾盛反制寒水故用黃芩黃連黃蘗以療二火酒製者反治也生地黃苦寒水故爲臣麻黃防風川芎升發陽氣祛諸風邪葛根柴胡解利邪毒升麻散諸鬱結白朮蒼朮除濕和胃生甘草大退諸熱故爲佐氣不得上下吳茱萸陳皮通之血不得流行蘇木紅花順之當歸愈惡瘡連翹除客熱故爲使

方君臣佐使逆從反正用藥治法具備通造化明藥性者能知也如未見瘢疹之前小兒耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼澀知其必出瘢者急以此藥投之甚者則稀稀者立已已後無二出之患

決明散　治小兒痘疹入眼

決明子　赤芍藥　炙甘草各貳錢伍分

天花粉伍錢

右爲末麝香少許和劑三歲半錢米泔調食

後服

蜜蒙散　治小兒痘疹并諸毒入眼

蜜蒙花貳錢半　青葙子　決明子

車前子各伍分

右爲末羊肝壹片切開作叁片摻藥合作壹片濕紙裹於灰火中煨熟空心食之

蛇皮散　治小兒瘢瘡入眼成翳

蛇皮炙黃　天花粉各等分

右爲末三歲壹錢摻入羊肝内米泔水煮食

之又方蟬蛻爲末羊肝湯調下

蟬蛻散　治小兒痘瘡入眼半年已裏者一月取効

猪懸蹄甲貳兩燒存性爲末　蟬蛻壹兩爲末

羯羊肝焙乾末貳錢半

右上藥三歲壹錢猪肝湯調下食後壹日肆服一年外難治

浮萍散　治豌豆瘡入眼疼痛恐傷目

右以浮萍草陰乾爲末三歲壹錢羊肝壹片盞内杖子刺碎入沸湯半錢絞汁調下食後參兩服立効

瀉青丸見咽痛

退翳散　治目内翳障或瘡疹後餘毒不散

真蛤粉別研　穀精草生研爲末各壹兩

右研勻每服貳錢用猪肝叁指大壹片批開掺藥在上捲定再用麻線扎之濃米泔壹椀煮肝熟爲度取出放冷食後臨睡細嚼却用元煮米泔送下忌一切毒物如齋素只用白柿同煎前藥令乾去藥食白柿孫盈仲云凡痘瘡不可食雞鴨子必生翳膜錢季華之女年數歲瘡疹後兩眼皆生翳只服此藥各退白膜參重瞳子方瞭然也

穀精散　治斑瘡翳膜眼

穀精草　猪蹄退炙　菉豆皮

蟬退各等分

右爲末每服參錢食後米泔調下

神功散　治證同上

蛤粉　穀精草各壹兩　菉豆皮

羌活　蟬退各伍錢

右爲末每服參錢用猪肝壹具入藥末線縫煮汁同服

通神散　治斑瘡入目内生翳障

白菊花　菉豆皮　穀精草各等分

右爲末每服壹錢乾柿壹箇米泔壹盞同煎候水乾喫柿不拘時喫參伍柒次柒日得効遠者不過半月

血方　治痘瘡入眼生翳膜

鱔魚繫其尾倒垂之從項下割破些少取生血點之於翳上白鱔魚尤佳若翳已凝即用南硼砂末以燈心蘸點翳上仍用威靈仙仙靈脾洗曬等分爲末每壹錢米泔水調服

通治目疾諸方

蟬花無比散(和劑)治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻注眼目昏暗瞼生風粟或痛或痒漸生翳膜遮睛視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澀隱痛常服驅風退翳明目

蛇退(微炙壹兩)　蟬退(去頭足翅貳兩)　羌活

當歸(洗焙)　石決明(用鹽同東流水煮壹伏時漉出搗如粉)

川芎(各叁兩)　防風(去叉)　茯苓(去皮)

甘草(炙各陸兩)　赤芍藥(拾叁兩)　蒺藜(炒去刺半斤)

蒼朮(泔浸去皮炒拾伍兩)

右爲末每服叁錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風毒等物

還睛丸(和劑)治男婦風毒上攻眼目赤腫怕日羞明多饒眵淚隱澀難開眶痒赤痛瞼皆紅爛瘀肉侵睛或患暴赤眼睛痛不可忍者併服立効又治偏正頭痛一切頭風頭目眩暈

白朮(生用)　菟絲子(酒浸別研)　青葙子(去土)

防風(去蘆)　甘草(炙)　羌活(去苗)

白蒺藜(炒去尖)　密蒙花　木賊(去節各等分)

爲細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸細嚼白湯下空心食前日叁

七寶散　治風眼除瘀熱

當歸　芍藥　黃連

銅綠(各貳錢細研)　杏仁(柒粒去皮)　白礬

甘草(各壹錢)

右㕮咀以水同放磁盞內於鍋中頓煎至捌分去滓澄清臨臥洗之

撥雲散　治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮障羞明熱淚隱澀難開眶痒赤痛瞼皆紅爛瘀肉侵睛

羌活　防風　柴胡
甘草 炒各壹兩
右爲細末每服貳錢水壹盞半煎至柒分食
後薄荷茶清調服菊花湯調亦可忌醃藏魚
鮓鹽醬爆麵炙煿發風等毒物
蟬殼散　治眼目風腫及生瞖膜等疾
蟬殼　地骨皮　黄連 宣州者去鬚
牡丹皮 去心　白朮　蒼朮 米泔浸去皮
菊花 各壹兩　龍膽艸 半兩　甜瓜子 半升

右爲細末每服壹錢荆芥煎湯調下食後臨
卧各壹服大治時疾後餘毒上攻眼目甚効
忌熱麵炒豆醋醬等
局方蜜蒙花散　治風氣攻注兩眼昏暗眵淚
羞明瞼暴赤腫
羌活　白蒺藜 炒　木賊
密蒙花　石決明 各壹兩　菊花 貳兩
右爲末每服貳錢食後茶清調下
三因羌活散　治風毒上攻眼目昏澁痒羞明瞖膜將生
痛及偏正頭風目小黑花累累者
羌活　川芎　天麻
旋覆花　青皮　南星 炮
藁本 各壹兩
右爲末每服貳錢水煎入薑叁片薄荷柒葉
本事方羊肝丸
兎絲子　車前子　麥門冬
決明子　茯苓　五味子
枸杞子　茺蔚子　苦葶藶

蕤仁　地膚子　澤瀉
防風　黄芩　杏仁 炒
細辛　桂心　青葙子 各壹兩
白羯羊肝 用子肝壹片薄切新瓦上焙乾　熟地黄 壹兩半
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服叁肆拾
丸温湯下日叁
地黄散　治心肝壅熱目赤腫痛赤筋白膜遮
睛散在四邊易治若遮過黑睛多致失明及
治疹痘入目者

生地黃　熟地黃　當歸
大黃各柒錢半　穀精草　蒺藜
木通　黃連　防風
生犀角　木賊　玄參
羌活　蟬蛻　粉草各半兩
右爲末每服半錢煑猪羊肝汁食後調服

補肝散　治二十年失明
右用七月七日收蒺藜子陰乾擣末食後水
服方寸匕

治積年失明方
右以決明子杵爲末食後以粥飲服方寸匕

外治　陽丹　治諸般外障赤脉貫睛怕日羞明
沙澀難開眵弦赤爛星翳覆瞳
黃連　黃蘗各壹兩　大黃
黃芩　防風　龍膽草各伍錢
當歸　連翹　羌活
梔子　白菊花　生地黃
赤芍藥　苦參各叁錢　蒼木

麻黃　川芎　白芷
細辛　千里光　腦荷
荊芥　木賊各壹錢半　一方加雞栢樹
根不拘多少此藥樹生便有小刺葉如石
榴葉根色如黃芩單用亦可熏洗
右藥以井水洗淨剉碎以井水浸於銅器內
春叁夏貳秋肆冬伍日如常將手揶出藥味
攊出藥力熬煎濃淨濾清汁壹碗以飛藥留
濁汁叁碗以淬藥却用熔銅鍋子壹箇裝打

碎甘石壹斤在内新瓦蓋上松炭固濟燒令
透極紅色鉗出少時淬入藥汁內煆淬叁次
就將留下清汁飛細碾令千萬餘下澄清去
濁攊乾再碾令無聲爲度細絹重羅過磁器
收貯聽用
爐甘石壹錢　麝香貳釐　片腦壹分
右爲細末次入片腦碾嫰熟絹羅過磁器收
貯點眼如有翳膜配合陰丹一九二八三七
四六等丹

[illegible]丹　治翳膜遮睛血灌瞳人拳毛努肉爛弦
風眼諸般眼疾大効如神
爐甘石壹兩　銅青壹錢玖分　硇砂陸分貳釐半
沒藥貳分　青鹽叁分柒釐半　乳香叁分柒釐半
熊膽壹分貳釐半　蜜陀僧貳分半
已上捌味用黃連伍錢　龍膽草貳錢半　煎汁濾淨
將前藥和一處入汁碾細嫩曬乾再碾極細
用之
白丁香　海螵蛸　白礬生

輕粉各壹分柒釐半　硼砂貳分　雄黃
牙硝　黃丹　血竭
朱砂各壹分貳釐半　鉛白霜　粉霜
鷹條　膽礬各柒釐半　一方有黃連陸分貳釐半
胡連腦荷細辛藿粉草烏各[illegible]　按已上
陸味並無去翳之功不用更妙恐有礙眼
作痛害眼之物也一方有石蟹貝齒玄明
粉真珠琥珀[illegible]　按已上五味或多或少
皆可增入以有磨翳消膜之功不可決[illegible]

右各另製細末依方秤合和勻碾令無聲至
千萬餘下磁器收貯聽用如有翳膜配合陽
丹一九二八三七四六等丹點眼大效如神
一九丹　陰壹分　陽玖分　硼玖釐　礬生伍釐
二八丹　陰貳分　陽捌分　硼捌釐　礬生肆釐
三七丹　陰叁分　陽柒分　硼柒釐　礬生叁釐
四六丹　陰肆分　陽陸分　硼陸釐　礬生貳釐
陰陽丹　陰伍分　陽伍分　硼伍釐　礬生壹釐
清涼丹　陽壹錢　硼壹分　礬生壹釐

已上六丹俱用麝香壹釐　片腦壹分　研勻點眼
日精丹　治一切火熱赤眼爛弦風等證夫日
者陽也陽主輕清故其丹輕也專治一切眼
目稍輕者用此丹也
黃連壹兩　黃檗壹兩　龍膽草
防風　大黃　赤芍藥
黃芩　當歸　梔子各伍錢
白菊花　腦荷各貳錢　又方可加雞栢
樹根不拘多少為妙

右浸藥水煆淬爐甘石收貯諸法悉同陽丹
爐甘石壹兩 朱砂 硼砂各貳錢
麝香叁分 白礬生壹分
右為極細末每末壹錢加片腦壹分研細羅
過點眼如有翳膜配和月華丹對勻點之
月華丹 治諸般翳膜努肉等證夫月者陰也
陰主重濁故其丹重也專治一切眼目稍重
者用此丹
爐甘石壹兩 朱砂 硼砂各貳錢

白丁香 真珠 珊瑚
琥珀 水晶 碼碯
石蟹 貝齒 硇砂各貳分
乳香 沒藥 輕粉
青鹽 玄明粉 膽礬
海螵蛸 蚺蛇膽 黃丹
山豬膽 白礬各 雄黃
熊膽 牛黃各壹分 麝香叁分
右貳拾柒味各另修製淨秤合和勻碾令千

萬餘下磁器收貯如臨用時每末壹錢加梅
花片腦壹分研勻羅過點眼如翳膜重厚者
加硇砂少許如翳膜薄輕者對和日精丹
光明丹 治一切眼目翳膜努肉爛弦赤眼眊
矂緊澀羞明惡日以下諸方中爐甘石俱製過者
爐甘石玖錢 朱砂 硇砂各壹錢
麝香壹分 片腦壹分
右各另製細末秤合和勻碾令千萬餘下羅
過點眼如翳膜加石蟹真珠各叁分硇砂白

丁香熊膽牛黃琥珀貝齒各壹分研細和勻
點眼要紅加朱砂壹錢
白龍丹 治一切火熱眼及翳膜努肉
爐甘石壹錢 玄明粉伍分 硼砂叁分
片腦壹分 右研細末點眼
爐甘石散 治一切外障目睛傷破爛弦風眼
瘀濕熱平風爛作痛明目去翳退赤除風大
效
爐甘石壹錢 片腦壹分 黃連貳分半

右製甘石貳兩以黃蘗壹兩黃連伍錢煎濃汁濾淨投入甘石內曬乾以汁投曬盡爲度依方秤合和勻研爲細末乳汁和調勻用鴨毛刷爛處　又方以[illegible]根皮即研勻根洗淨砍爛取汁和乳汁調刷爛處大効

紫金錠子　治一切眼疾不分遠年近日諸般翳膜血灌瞳仁努肉攀睛拳毛倒睫積年赤瞎暴發赤腫白睛腫脹沙澀難開眊矂緊澀怕日羞明眵多瞇淚爛弦風痒視物昏花迎

風淚出目中溜火諸般目疾

爐甘石　黃丹各半斤　黃連另研

朱砂各壹兩　當歸　硼砂各半兩

海螵蛸　白丁香　白礬生

硇砂　輕粉　貝齒

眞珠　石蟹　熊膽

乳香　沒藥　麝香各壹錢貳分半

片腦貳錢其片腦要[illegible]去氣味宜臨用時入

右除腦麝外餘各另製爲末秤合和勻入黃連水碾至千萬餘下日乾次入麝香研細羅過又次入片腦再研復羅入後膏搜和作錠子陰乾

黃連壹斤　當歸　生地黃各肆兩

防風　黃蘗　龍膽草各貳兩

蕤仁半兩　訶子捌枚　冬蜜肆兩另熬

鵞梨取汁捌枚　猪胰子肆枚以稻草擦洗去膏膜乾淨無油爲度用布包搗爛入藥

右將黃連等捌味洗淨剉碎以水浸於銅器

內春五夏三秋四冬七濾去滓以滓復添水熬蔘次取盡藥力以密絹綿紙重濾過澄去砂土慢火煎熬槐柳枝各肆拾玖條互換一順攪不住手攪盡枝條如飴糖相類入蜜和勻磁器盛放湯瓶口上重湯蒸頓成膏復濾淨滴入水中沉下成珠可丸爲度待數日出火毒再熔化入末和勻杵搗爲丸錠陰乾金銀箔爲衣每以少許新汲水浸化開鴨毛蘸點眼大眥內又可以熱水泡化洗眼藥水冷

又煖洗日洗伍柒次日點拾餘次大效

熊膽膏錠　治風熱上攻眼目昏花眵多曉淚眊矂緊澀痒極難忍努肉攀睛沙澁難開翳膜覆瞳目眶歲久赤爛俗呼爲赤瞎是也當以稜針刺目眶外以瀉濕熱如倒睫拳毛乃內瞼眼皮緊當拳出內瞼向外以稜針刺出血以瀉伏火使眼皮緩則毛立出翳膜亦退一切目疾悉皆治之

爐甘石（肆兩）　黃丹（叁兩）　黃連（壹兩）

當歸　朱砂　硼砂（各貳錢）

白丁香　海螵蛸　白礬（生）

輕粉（各壹錢）　乳香　沒藥

熊膽　麝香（各伍分）　片腦（壹錢臨時加入）

右除腦麝餘各另製細末秤合和勻入黃連末當歸末水調勻綿絹濾淨去滓入末礪至千萬餘下曬乾入麝香礪極嫩羅過次入片腦礪勻復羅却入後膏成劑

黃連（半斤）　龍膽草　防風

當歸　生地黃（各貳兩）　訶子（貳枚去核研末）

蕤仁（半貳錢）　鵞梨（肆箇取汁）　猪胰子（貳箇同前製入）

冬蜜（貳兩同前製法）

右黃連下玖味洗淨剉碎以井水浸於銅器內或磁器內春伍夏貳秋冬柒日濾去滓以滓復煎叁肆次取[illegible]汁以熟密絹開綿紙在上濾過[illegible]砂[illegible]上慢火煎熬槐柳枝各肆拾玖條長[illegible]尺攪不住手互換攪盡枝條稍如飴糖稠類入蜜和勻磁碗盛放湯瓶口上蒸頓成膏復濾淨滴入水中沉下成

珠可丸爲度待數日出火毒再熔化入末和勻杵爲丸錠陰乾金銀箔爲衣每以少許井水化開鴨毛蘸點眼又以熱湯泡化洗眼

開明膏　治眼目昏花視物不明或生雲翳白膜內外障眼風赤冷淚一切眼疾

黃丹（貳兩）　青鹽（伍錢）　海螵蛸（飛）

朱砂　硼砂（各壹錢半）　訶子（貳枚去核研末）

冬蜜（肆兩熬一大沸去沫取淨者）　槐柳枝（各[illegible]）

右將蜜煉沸濾過磁器盛放湯瓶口上入甘石黃丹訶子蒸熬紫色重湯頓成膏槐柳枝一順攪不住手互換攪令條盡滴水中不散爲度再又濾淨入後膏和劑

黃連（研末貳兩 銼碎細） 槐柳枝（各伍錢）

右入水貳大椀熬至椀濾去滓以淨汁再熬稀稠得所入蜜藥和勻磁器盛頓湯瓶口上重湯成膏放在地上數日出火毒次入前藥末攪勻點眼昔人曾以此藥救人大効

消翳復明膏　治眼目昏花翳膜遮睛內外障眼一切眼疾

黃丹（壹兩） 青鹽（貳錢半） 海螵蛸

真珠（各柒分半） 熊膽 麝香（各貳分）

片腦（伍分臨時加入） 訶子（貳枚去核研末） 槐柳枝（各肆拾玖條）

冬蜜（熬壹沸去白沫濾淨肆兩）

右將蜜和黃丹煉至紫色旋下餘藥熬至滴水沉下成珠爲度除腦麝成膏後入

黃連（貳兩半） 防風 當歸

龍膽草 生地黃（各伍錢） 木賊

白菊花（各貳錢半） 蕤仁（壹錢） 杏仁（伍分）

右如前煎熬成膏入蜜和勻磁碗盛放湯瓶口上蒸頓成膏濾淨入腦麝和勻點眼又以熱湯泡化洗眼

爐甘石膏　治眼目昏花視物不明

爐甘石 代赭石 黃丹（各壹兩）

冬蜜（捌兩） 訶子（貳枚取末） 槐柳枝（各肆拾玖條）

右爲細末入黃連水再磚至千萬餘下却以

蜜煉去白沫入末同熬成膏柳條攪不住手濾淨入後膏子和劑

再以黃連（研末壹兩）入水於銅鍋煎熬成膏濾去滓取淨入前蜜藥磁碗盛放湯瓶口上蒸頓成膏槐柳枝一順攪不住手互換枝條攪盡濾淨出火毒點眼又以熱湯泡化洗眼

夜光膏　治赤眼翳膜昏花餘證同上

黃丹（肆兩） 爐甘石（八兩） 青鹽（陸錢）

鵝梨（拾枚取汁） 冬蜜（壹斤煉）

右將丹石碯研末以青鹽另碾末却將鵝梨汁
汁和匀熬稀稠入甘石黃丹煉紫色次入青
鹽熬匀槐柳枝攪不住手入後膏和劑

黃連（捌兩）　當歸（貳兩）　訶子（肆枚去核研末）

猪胰子（貳箇如前搓洗）

右各洗淨碎剉水浸叁伍宿濾去滓以滓復
煎取盡藥力以熟絹綿紙濾淨澄去沙土慢
火煎熬以槐柳枝各肆拾玖條一順攪不住
手待如飴餹相類濾淨入前蜜藥磁器盛放

湯瓶口上重湯頓成膏候出火毒每以少許
點眼大眥以熱湯泡化洗眼（凡修合眼藥宜臘月妙正月十一月次之餘月不宜）

黃連膏　治目中赤脉如火溜熱炙人餘同上

黃連（捌兩）　片腦（壹錢）

右以黃連去蘆刮去黑皮洗淨剉碎以水於
大碗貯於銅鍋內煎或以磁器內煎用文武
火熬減大半碗濾去查以查復煎濾淨澄清
入薄磁器盛放湯瓶口上重湯蒸頓成膏亦

清再復濾淨待數日出火毒臨時旋加片腦
以壹錢爲率用則酌量加之以少許點眼大
眥內又方加熊膽蚺蛇膽各少許更妙

又方

黃連（捌兩）　杏仁　菊花

梔子　黃芩　黃蘗

龍膽草　防風　當歸

赤芍藥　生地黃（以上各壹兩）

右以水煎濃汁去滓再煎濾淨碗盛放湯瓶

口上重湯蒸頓成膏滴入水中可丸爲度以
陽丹收爲丸臨用加片腦少許研和以井水
化開鴨毛蘸點眼

又方

黃連　雞栢根（各多斤）　地薄荷

田茶菊　嫩柏葉　苦花子

苦參根　地胡椒　七層樓

地芫荽　千里光（各等分）　甘草

右以水煎熬去滓濾淨復煎熬候汁如稀飴餹

冬蜜相停即以碗盛放湯瓶口上重湯烝頓
成膏入陽丹壹兩和勻更入朱砂硼砂各壹
錢片腦麝香各壹分為妙

日精月華光明膏　治翳膜努肉諸般眼疾大
効

爐甘石　黃丹各捌兩　菉豆粉炒黑肆兩
黃連壹兩　當歸　朱砂
硼砂　玄明粉　決明粉各貳錢
輕粉　白礬生　白丁香

海螵蛸　自然銅　硇砂各壹錢
熊膽　乳香　沒藥
鷹條　雄黃　青鹽
膽礬　銅青　牙硝
山猪膽各貳分半　麝香伍分　片腦壹錢
橦腦半錢　又方有貝子煅　貝齒石燕石蟹
水晶真珠瑪瑙琥珀珊瑚各壹錢　若加此玖
味要去菉豆粉不用有豆粉即半真半偽
右各另製細末依方秤合和勻碾至千萬餘

[illegible]絹羅過入後膏子成劑

雞栢根壹斤　黃連半斤　龍膽草
黃蘗　生地黃　苦參各貳兩
大黃　黃芩　梔子
赤芍藥　防風　菊花
玄參　當歸各壹兩　羌活
木賊　蒺藜　連翹
蔓荊子　細辛　川芎
白芷各伍錢　夜明沙　蛇蛻

蟬蛻各貳錢半　又方福建地有後拾壹味草藥
在內用之効速他處無此草藥不用亦効
苦花子　地薄荷　地西瓜
田茶菊　七層樓　千里光
鐵梗子　地胭姜　地胡椒
蛇不見　水楊梅根皮壹兩　以上各生採名[illegible]另煎取[illegible]入前藥同前[illegible]
冬蜜壹斤
右各洗淨剉碎入井水於銅器內浸三宿浸
火煎熬濃汁濾去滓以汁再煎再濾慢火熬

熬槐柳桑枝攪熬如飴餹入蜜和勻更入搗
羊膽雄豬膽各貳枚和勻磁碗頓放湯瓶口
上蒸成膏復濾淨滴沉水中成珠可丸爲度
待數日出火毒再熔化入諸藥末和勻杵爲
丸錠陰乾用金銀箔爲衣每以少許井水化
開鴨毛蘸點眼又以熱湯泡化洗眼大有神
効
碧玉散　治眼睛腫脹紅赤昏暗羞明怕日癮
澀難開疼痛風痒頭重鼻塞腦鼻痠疼翳膜

努肉眵淚稠粘拳毛倒睫一切眼證
躑躅花　腦荷　羌活
川芎　細辛　防風
荊芥　蔓荊子　白芷各壹錢
風化硝　石膏煅　青黛
黃連各叁錢　鵝不食草叁兩
右爲細末吹鼻中壹日吹貳次
乳香散　治內外障眼攀睛瘀肉倒睫拳毛翳
膜遮睛一切目疾

防風　荊芥　川芎　白芷
細辛　藁本　羌活　白菊花
石菖蒲　天麻　蔓荊子　瓜蒂
赤小豆　漢防已　兎絲子　穀精草
自然銅製　鬱金　當歸　石膏煅
乳香　沒藥　雄黃　蛇蛻炒焦
蟬蛻炒焦　穿山甲炒　雞子蛻燒　腦荷各伍分
麝香　片腦各五厘
右爲細末每用少許吹鼻中

吹雲膏　治視物睛困無力隱澀難開睡覺多
眵目中淚下及迎風寒泣羞明怕日常欲閉
目喜在暗室塞其戶牖翳膜遮睛此藥多點
神効
黃連叁錢　蕤仁　升麻各叁分
青皮　連翹　防風各肆分
生地黃壹錢半　細辛壹分　柴胡伍分
當歸身　生甘草各陸分　荊芥穗壹錢取細末汁
右剉除連翹外用淨水貳椀先熬諸藥去半

梔入連翹熬至壹大盞去滓入銀盞内文武
火熬至滴入水成珠加熟蜜少許熬匀點之

金露膏　除昏退翳截赤定疼

蕤仁去皮研　黃丹各壹兩　黃連半兩

蜜壹兩

右先將黃丹炒令紫色入蜜攪匀下長流水肆升以嫩柳枝伍柒莖壹把定攪之次下蕤仁候滚拾數沸又下黃連用柳枝不住手攪熬至升柒捌合取離内傾藥在紙上慢慢滴之勿令塵污如有瘀肉加硇砂末壹錢上火上慢開入前膏子内用

龍木論云患傷寒熱病後切不可點恐損眼也斯言可以為學者云

寶鑑春雪膏　治風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開多眵淚羞明疼痛或生翳膜

黃連肆兩去鬚剉用淨水浸壹宿

南爐甘石拾兩用黃連水煅淬

硇砂壹錢細研水飛

好黃丹壹兩水飛

烏賊骨去粗皮　當歸各叁錢

乳香

白丁香半錢　麝香　輕粉各少許

右各研另貯先用好蜜壹斤肆兩煉去蠟却下甘石末不住手攪次下丹次下諸藥末不住手攪至紫金色不粘手為度搓作挺子每用壹粒新水磨化時時點之忌酒濕麪蕎麥

點眼金絲膏　治男婦日疾遠年近日翳膜遮睛拳毛倒睫眼花爛弦迎風冷淚及赤眼腫痛努肉攀睛

硇砂研　晉礬研　青鹽各壹錢研　乳香好者細研

片腦研各貳錢　當歸洗判淨　黃丹各半兩研　黃連壹兩

右用好蜜肆兩除片腦外和柒味内入青竹竹筒内油單紙裹筒口伍柒重緊繫定入湯瓶中文武火煑壹週時取出劈破新綿濾去藥滓方下片腦和匀磁瓶收貯再用油單紙伍柒重封繫瓶口埋露地内去火毒候半月取出每用粟米大點眼

龍腦膏　治遠年近日翳膜遮障攀睛瘀血連眶赤爛視物昏暗隱澀多淚迎風難開

爐甘石不以多少揀粉紅梅花色佳用甘鍋子盛煆淬火入黃連水淬淬火

黃連不以多少捶碎水浸一宿去滓將煆紅爐甘石淬淬火同黃連水細研飛

過煆澄下去上面水暴乾再

用乳鉢研極細羅過用叁錢

龍膽草不以多少洗淨日乾不見火研末壹錢

桑柴皮燒過壹錢　黃丹羅過壹錢

右同白蜜肆兩同處入在黑磁器內文武火慢熬以竹篦子攪如漆色不粘手為度切勿犯生水仍不用鐵器熬藥藥成依舊以磁器盛頓每用如皂子大新冷水半盞化開先三

一日不用每日洗數次無妨藥盞須用紙蓋不可犯塵灰截赤眼極効

散血膏　治赤臆不能開睛痛熱淚如雨

紫金皮　白芷　大黃

薑黃　南星　大柏皮

赤小豆　寒水石

右為細末生地黃汁調成膏敷眼四圍

又方用生田螺肉生地黃同真黃土研爛貼太陽穴　又方用黃丹蜂蜜調貼太陽穴

又方用南星　地黃　赤小豆

右研爛貼太陽穴

清涼膏

生南星　薄荷葉各半兩　荊芥

百藥煎各叁錢

右為末井水調成膏貼眼角上自然清涼

洗眼方　治昏臆止疼去風

秦皮　杏仁　黃連

甘草　防風　當歸鬚各等分

滑石少許

右為末水壹盞煎至半盞去滓時時帶溫洗

又方

銅綠半斤　爐甘石壹斤　黃連

黃芩　黃檗各叁兩　以上味各

右將前貳味同碾細末羅過將後叁味濃煎調末為丸臨時用將冷水浸開洗之

雜病證治類方第八冊目錄

耳

桂星散 磁石羊腎丸 清神散
磁石酒 魚腦膏 羊腎羹
磁石丸 蓖蠍散 犀角飲子
芍藥散 犀角散 茯神散
犀角飲子 檳榔神芎丸 燒腎散
蓯蓉丸 益腎散 補腎丸
肉蓯蓉丸 桑螵蛸湯 羊腎丸

安腎丸 地黃丸 地黃湯
蠟彈丸 通氣散 復元通氣散
菖蒲散 通神散 追風散
草麻丸 雄黃散 鯽魚膽膏
蠍梢膏 鼠膽丸 雞卵方
通耳法 萆麻子丸 通氣散
勝金透關散 蒲黃膏 龍腦膏
龍齒散 黃芪丸 芎歸飲
柴胡聰耳湯 芷芎散 麝香散
生犀丸 解熱飲子 黍粘子湯
白龍散 杏仁膏 菖蒲挺子
透冰丹 通氣散 蔓荊子散
紅綿散 松花散 白蓮散
麝香散 禹餘糧丸 礬石散
蔥涎膏 菖蒲散 竹蛀散
蝎梢散 立効散 香附散
附子丸 三黃散 二聖散
無憂散 曾青散 黃連散

柴胡梔子散 當歸川芎散 加味地黃丸
立驗散

鼻

麗澤通氣湯 溫肺湯 禦寒湯
溫衛湯 溫衛補血湯 人參湯
辛夷散 增損通聖散 辛夷湯
醍醐散 通關散 防風湯
川芎散 蓽澄茄丸 菖蒲散
通頂散 芎藭散 瓜蒂散

蒺藜汁方 芎藭散 山茱萸丸
赤龍散 通頂散 雄黃散
黃白散 通草散 川椒散
細辛散 本事通草丸 辛夷散
千金細辛膏 塞鼻柱膏 白芷丸
防風湯 蒼耳散 辛夷散
抑金散 南星飲 辛夷丸
川芎丸 羊肺散 細辛散
辛夷膏 輕黃散 二丁散
瓜丁散 地龍散 通草膏
烏犀丸 地黃煎 椿根湯
烏香散 犀角散 桑根白皮散
吹鼻散 人參順氣散 白芷散
沒藥散 白蘚皮湯 葫蘆酒
神效宣腦散 升麻防風散 梔子仁丸
白礬散 硫黃散 凌霄花散
何首烏丸 大風油 冬瓜子散
荊芥散 草麻子膏 鉛紅散

口

龍膽瀉肝湯 胡黃連散 必效散
黃檗散 三補丸 金花丸
黃連升麻湯 綠袍散 蜜檗散
黃連散 蟾酥綿 升麻飲
冰檗丸 加減甘露飲 加減瀉白散
生香膏 地骨皮丸 升麻黃連丸

齒

清胃散 獨活散 茵蔯散
羌活附子湯 羌活散 麻黃散
細辛散 白芷散 蝎梢散
牢牙地黃散 獨活散 當歸龍膽散
益智木律散 草豆蔻散 麝香散
立效散 升麻散 白芷散
神功丸 牢牙散 雄黃定痛膏
透關散 牢牙丸 白牙散
麝香刷牙散 刷牙方 長春牢牙散
沉香散 硃砂散 妙應散

地黃丸　甘露飲　五靈膏
宣牙膏　五倍子散　土蒺藜散
麝香礬雄散　熟銅末散　露蜂房散
川升麻散
脣
濟陰地黃丸　柴胡清肝散　羌活散
瀉黃飲子　五福化毒丹　白燈散
獨活散　升麻飲　生地黃煎
治脣生腫核方　黃蘗散

舌
升麻散　碧雪　龍石散
清熱補氣湯　清熱補血湯　玄參升麻湯
清熱化痰湯　黃蘗湯　馬牙硝丸
牛黃散　玄參散　飛礬散
蠶蟲散　百草霜散　牛黃散
礬石散　甘露飲　栝蔞根散
甘露丸　蘆薈散　玄參散
綠雲散　神龜滋陰丸　通天愈風湯
清心導痰丸　清心牛黃丸
面
升麻加黃連湯　升麻加附子湯　冲和順氣湯
犀角升麻湯　硫黃膏　柏連散
洗面藥方　面油摩風膏　瑩肌如玉散
咽喉
甘桔湯　荊芥湯　半夏桂枝甘草湯
解毒雄黃丸　玉鑰匙　玉屑無憂散
清心利膈湯　碧玉散　防風散

追風散　開關散　七寶散
五香散　瓜蔕散　烏犀膏
備急如聖散　一字散　龍麝聚聖丹
祛毒牛黃丸　咽喉備急丹　增損如聖湯
利膈湯　桔梗湯　發聲散
碧雲散　羅青散　粉香散
乾薑散　玄參散　射干丸
燒鹽散　馬牙硝散　射干散
硼砂散　啓關散　黃芪散

桃紅散　琥珀犀角膏　救命散
牛蒡子丸　硼砂散　射干散
含化龍腦丸　木香散　絡石湯
四味湯　杏仁煎丸

皮膚

桑皮飲　澤膚膏

鬚髮

張天師草還丹　七寶美髯丹　玄精丹
青絲散　擦牙方　擦牙烏鬚方

易便擦牙方　丁砂散　訶子散
製五倍子法　烏鬚易簡方　點白方
黑雲散　滋榮散　三聖膏

腋氣

六物散　治腋氣方

蠱毒

解毒丸二　三因解毒丸　神仙解毒萬病丹
保靈丹　青黛雄黃散　歸魂散
雄朱丸　桔梗散　石刻方
七寶丸　東坡雄黃丸　蜜髓煎
馬兜鈴根湯　冶諸蠱毒方　鐵精丸
獺皮散　地榆散　苦瓠湯
茜根散　雄黃散　麥麪散
黃龍湯　藍根散　粉草飲
解藥毒方　白扁豆飲　薺苨湯
黑鉛酒　葱白湯　五加皮散
牡丹散

蟲

神效剪紅丸　萬應丸　追蟲丸
下蟲丸　化蟲丸　集效丸
秘方萬應丸　取蟲積方　萬靈丸
檳榔湯　麥門冬湯　桑根白皮酒
前胡湯　茱萸根浸酒方　雷丸丸
貫衆散　水銀膏　雚蒲汁方
錫灰丸　聖功散

雜病證治類方第八册

金壇王肯堂輯

耳聾

流氣排風湯　治中風

桂星散

辣桂　川芎　當歸

石菖蒲　細辛　木通

木香　白蒺藜炒去刺　麻黄去節

甘草炙各壹錢　白芷梢　天南星煨裂各壹錢半

水貳鍾葱白貳根紫蘇五葉薑五片煎至壹

鍾食後服一方加全蠍去毒壹錢

磁石羊腎丸　治風虛不爽時有重聽或有風

痺之狀

磁石貳兩火煅醋淬七次用葱子去皮白木通各貳兩入水同煎壹晝夜去葱木通

川椒去目　石棗去核　防風

遠志肉　白朮　茯苓

細辛　兎絲子酒浸　川芎

山藥　木香　鹿茸酒浸壹宿炙

當歸　黄芪　川烏炮各壹兩

石菖蒲壹兩半　肉桂陸錢　熟地黄焙熟貳兩

右爲細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸

藥末搗以煮腎酒打糊和丸如梧子大每服

百拾丸空心温酒鹽湯任下仍服清神散二

藥相間服忌牛肉雞鴨子

清神散　治氣壅頭目不清耳常重聽

甘菊花　白殭蠶炒各壹兩　羌活

荆芥穗　木通　川芎

防風各肆錢　木香壹錢　石菖蒲

甘草各壹錢半

右爲細末每服貳錢食後茶清調飲

磁石浸酒方　治風邪之氣干於腦或入於耳

久而不散經絡痞塞不能宣利使人耳中悾

悾然或作旋運

磁石搗研水淘去赤汁　山茱萸

天雄炮去皮臍各壹兩　木通　防風

薯蕷　菖蒲　遠志去心

芎藭　細辛　蔓荊子
白茯苓・　乾薑炮　肉桂
甘菊花各壹兩・　熟地黄叁兩
右剉細和匀以生絹袋盛用酒貳斗浸柒日
每日任性飲之以瘥爲度
魚腦膏　治風聾年久及耳鳴
生鯉魚腦貳兩　當歸切焙　細辛去苗葉
附子炮去皮臍　白芷　菖蒲各半兩
右除魚腦外爲細末以魚腦置銀器中入藥

在内微火煎候香瀘去滓傾入磁器中候凝
丸如棗核大綿裹塞耳中一方無菖蒲有羊
腎脂同魚腦先熬次下諸藥
羊腎羹
杜仲去麤皮炙黄　黄芪各半兩　磁石五兩搗碎水淘去赤汁綿裹懸煎不得到鐺底　羊腎壹隻去脂膜切　肉蓯蓉壹兩酒浸壹宿去皮炙乾
右以水叁大椀先煮磁石取汁貳大椀下杜
仲等又煎取壹盞半去滓入羊腎粳米壹合

葱白薑椒鹽醋一如作羹法空心服
磁石丸
磁石火煅醋淬柒次・　防風　羌活
黄芪鹽水浸焙　木通去皮　白芍藥
桂心不見火各壹兩　人參半兩
右爲末用羊腎壹對去脂膜搗爛打酒糊爲
丸如梧子大每服五十丸空心温酒鹽湯下
薑蠍散　治耳聾氣塞[illegible]虚等證
右用全蠍四十九個去毒炮濕以糯米半升

於大瓦鋪平將蠍鋪米上焙令米黄爲度去
米不用又切生薑四十九片每片置蠍再焙
薑焦爲度去薑不用將蠍研爲細末二五日
前每日先服黑錫丹二五服臨服藥時令夜
飯半飽服時看其人酒量勿令大醉服已令
熟睡勿得叫醒却令人輕喚如不聽得濃煎
葱白湯壹椀令飲五更耳中聞百十攢笙響
便自此聞聲一方無糯米製銀石器中炒
風熱　犀角飲子　治風熱上壅耳内聾悶[illegible]

掣痛膿血流出
犀角 鎊 木通 石菖蒲
甘菊花 去根 玄參 赤芍藥
赤小豆 炒各貳錢 甘草 炙壹錢
水貳鍾生薑五片煎至壹鍾不拘時服
芍藥散 治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血
流出
赤芍藥 白芍藥 川芎
木鼈子 當歸 大黄
甘草 各壹錢半
水二鍾煎至一鍾食後服
犀角散 治風毒壅熱心胸痰滯兩耳虛聾頭
重目眩
犀角屑 甘菊花 前胡
枳殼 麩炒 石菖蒲 羌活
澤瀉 木通 生地黄 各半兩
麥門冬 去心貳兩 甘草 炙貳錢半
右爲末每服叁錢水煎去滓食後溫服

茯神散 治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急胸
膈痞悶不利
茯神 去木 麥門冬 去心各一兩 羌活
防風 去叉 蔓荊子 薏苡仁
石菖蒲 五味子 黄芪 各半兩
薄荷 甘草 各貳錢半
右爲末每服叁錢生薑叁片水煎去滓食後
溫服
通聖散 見熱門 滚痰丸 見痰飲

解倉飲子 治氣虛熱壅或失饑冒暑風熱上
壅耳內聾閉徹痛膿血流出
赤芍藥 白芍藥 各半兩 當歸
炙甘草 大黄 並 木鼈子 去殼各弍兩
右剉散每服四錢水煎食後臨卧服
氣逆 流氣飲 沉香降氣湯
蘇子降氣湯 俱見氣 不換金正氣散 見中寒
指迷七氣湯 見氣 來復丹 見中暑
養正丹 見氣 龍薈丸 見脇痛

復元通氣散見氣

熱證 檳榔神芎丸

大黃　黃芩各貳兩　牽牛

滑石各肆兩　檳榔貳兩

右為末滴水丸桐子大每服十丸次加十丸白湯下

腎虛 燒腎散 治腎虛耳聾方

磁石壹兩燒赤醋淬七次　附子壹兩炮去皮

巴戟壹兩　川椒壹兩去目及閉口者微炒去汗

右為末每服用猪腎壹枚去筋膜細切葱白韭白各壹分入散藥壹錢鹽花壹字和勻用十重濕紙裹於塘灰火內煨熟空心細嚼酒解薄粥下之十日効

蓯蓉丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉酒浸　山茱萸肉　石龍芮

石菖蒲　兎絲子酒浸蒸焙　羌活

鹿茸酥炙　石斛去根　磁石火煅醋淬水飛

附子炮各壹兩　全蠍去毒柒個　麝香半字續入

右為末蜜丸桐子大每服百丸空心鹽酒鹽湯任下

益腎散 治腎虛耳聾

磁石製　巴戟　川椒開口者各壹兩

石菖蒲　沉香各半兩

右為細末每服貳錢用猪腎壹隻細切和以葱白少鹽并藥濕紙十重裹煨令香熟空心細嚼溫酒送下

補腎丸 治腎虛耳聾

巴戟去心　乾薑炮　芍藥

山茱萸　桂心　遠志去心

細辛　兎絲子酒製　澤瀉

石斛　黃芪　乾地黃

當歸　蛇牀子　牡丹皮

肉蓯蓉酒浸　人參　附子炮

甘草炙已上各貳兩　石菖蒲壹兩　茯苓半兩

防風半壹兩　羊腎貳枚

右爲細末以羊腎研爛細酒煮麪糊丸如桐子大每服五十丸空心鹽酒送下

肉蓯蓉丸　治腎虛耳聾

肉蓯蓉（酒浸焙）　兎絲子（酒浸另研）　山芋
白茯苓（去皮）　人參　官桂（去麁皮）
防風（去叉）　熟地黃　芍藥
黃芪（各半兩）　附子（炮去皮臍）　羌活（去蘆）
澤瀉（各貳錢半）　羊腎（壹對薄切去筋膜炙乾）

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸空心用溫酒送下

桑螵蛸湯　治虛損耳聾

桑螵蛸（炙各拾枚）　當歸　白朮（米泔浸炒）
白茯苓（去皮）　官桂（去麁皮）　附子（炮）
牡荆子　磁石（火煅醋淬）　菖蒲（米泔浸焙）
乾地黃（焙各壹兩）　大黃（剉炒）　細辛（去苗）
川芎　牡丹皮（各半兩）

右㕮咀每服叄錢匕先以水叄盞煮猪腎壹隻取汁壹盞去腎入藥煎至柒分去滓食前溫服

八味丸　治耳聵及虛鳴

右用好全蠍肆拾玖枚炒微黃爲末每服叄錢以溫酒調仍下八味丸百粒空心只叄兩服見効（方見腳氣）

羊腎丸　治腎虛耳聾或勞頓傷氣中風虛損腎氣升而不降或耳中虛鳴

山茱萸　乾薑　川巴戟
芍藥　澤瀉　北細辛

兎絲子（酒浸）　遠志（去心）　桂心
黃耆　石斛　乾地黃
附子　當歸　牡丹皮
蛇牀子　甘草　蓯蓉（酒浸）
人參（各貳兩）　菖蒲（壹兩）　防風（壹兩半）
茯苓（半兩）

右爲末以羊腎壹雙研細以酒煮麪糊丸梧子大食前鹽酒下叄拾丸至伍拾丸立効

安腎丸　治虛弱耳聾

大安腎丸 肆兩 磁石 半兩醋淬 石菖蒲
羌活 各肆兩
右叁件為末混合為丸梧子大每服肆伍拾
丸鹽湯溫酒任下
地黃丸 治勞損耳聾
大熟地黃 洗焙 當歸 川芎
辣桂 菟絲子 酒浸三日蒸乾焙末
大川椒 出汗 故紙 炒 白蒺藜 炒杵去刺
葫蘆巴 炒 杜仲 去絲薑製炒 白芷

石菖蒲 各貳錢半
磁石 火煅醋淬七次研細水飛叁錢叁分半
右件藥為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服
伍拾丸以葱白溫酒空心吞下晚飯前再服
壹服
腎熱 地黃湯 本事
生地黃 壹兩 枳殼 羌活
桑白皮 磁石 搗碎水淘貳拾次去盡赤汁為度貳兩
甘草 防風 黃芩

木通 各半兩
右件藥為麤末每服肆錢水煎去滓日貳叁
服
腎虛 蠟彈丸 治耳虛聾
白茯苓 貳兩 山藥 炒 杏仁 炒壹兩半去皮尖
右三味研為末和勻用黃蠟壹兩鎔和為丸
如彈子大鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼熟
好建茶送下亦効山藥茯苓杏仁皆入於太
陽山藥大補陰氣性杏仁利氣乃補中有通

也少氣嗌乾者門冬人參五味湯嚼下
益氣聰明湯 見前
氣閉 通氣散
茴香 木香 全蝎
玄胡索 陳皮 菖蒲 各壹錢
羌活 殭蠶 川芎
蟬脫 各半錢 穿山甲 甘草 壹錢半
右件藥為細末每服叁錢不拘時候溫酒調
服

復元通氣散　治諸氣澀耳聾腹癰便癰瘡疽

無頭止痛消腫

青皮　陳皮去白各肆兩　甘草叁寸半炙

連翹壹兩

右為末熱酒調服

菖蒲散

石菖蒲壹兩炙節者　蒼术伍兩生用

右剉成塊子置瓶內以米泔浸柒日取出蒼

术只將菖蒲於甑上蒸三兩時取出焙乾搗

為細末每服貳錢糯米飲調服日三次或將

蒸熟者作指頭大塊子食後置口中時時嚼

動嚥津亦可

秘傳降氣湯加石菖蒲治氣壅耳聾大有神効

方見氣門

外治　通神散

全蠍壹枚　地龍　土狗各貳箇

明礬半生半煅　雄黃各半兩　麝香半字

右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉

氣面壁坐一時三日一次

通耳法

磁石用緊者如豆大壹塊　穿山甲燒存性為末壹字

右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中銜

少生鐵覺耳內如風雨聲即愈

追風散

藜蘆　雄黃　川芎

石菖蒲　全蠍　白芷

藿香　鵝不食草　薄荷

苦丁香各等分　麝香少許

右為細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草

加片腦少許

萆麻丸

萆麻子去殼　松脂　黃蠟

杏仁去皮麩炒各半兩　巴豆去殼各貳錢半　乳香

食鹽

右件藥搗如膏捻如棗核樣以黃蠟薄捲之

大針刺兩三眼子兩頭透用塞耳經宿黃水
出愈

透耳筒

椒目　巴豆　菖蒲

松脂各壹錢

右件藥爲末攤令薄捲作筒子塞耳內一日
一易

雄黃散

雄黃　防風　礜石

石菖蒲　烏頭　川椒開口者炒出汗各貳錢字　大棗核拾枚

右爲末以香爐中安艾壹彈子大次着黃柴
末半錢於艾上覆以藥貳錢七着艾上火燃
向耳熏之

又方

壹荳叁猶不出油　麝香少許用[illegible]
煉蜜爲丸麥粒大　綿裹錠子耳中[illegible]

鯽魚膽膏

鯽魚膽壹箇　烏驢脂少許　生油半兩

右和勻內樓葱管中七日滴入耳內

蠍梢膏

蠍梢[illegible]枚　淡豉貳拾壹粒揀入者焙乾

巴豆[illegible]

右先研蠍梢淡豉令細別研巴豆成膏同研
勻捏如小棗核狀用葱管小頭取孔以藥壹
粒在內用薄綿裹定臨卧時置耳中壹宿取
出未通再用以通爲度

鼠膽丸

曾青壹錢　龍腦半錢　凌霄花叁錢

右爲細末每用壹字吹入後用鼠膽滴入隨
用綿子塞之從晚至雞鳴取出

雞卵方

新雞卵壹箇　巴豆壹粒去心膜

右先以雞卵上開壹孔將巴豆納卵中以紙
兩重麪粘貼蓋却與雞抱以其餘卵雛出爲
度取汁滴於耳內日二次

耳聾灸方　用蒼朮壹塊長柒分將壹頭削尖壹頭截平將尖頭揷入耳內平頭上安筋頭大艾炷灸之輕者柒壯重者拾肆壯覺耳中有熱氣者効

又方　用竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之令烊注耳中一方生用以綿裹包入耳中一方用鯉魚膽汁滴入耳中

又方　用蠟紙壹張剪作肆片每壹片於筯上緊捲抽却筯以蠟紙捲子安耳中然之待火

欲至耳急除去當有惡物出在殘紙上日一角用了以蠟塞定

又方　用甘遂半寸綿裹揷兩耳中却將甘草口中嚼

又方　用生菖蒲搗汁滴耳中

通耳丹　治耳聾

安息香　桑白皮　阿魏各壹兩半

硃砂半兩

右用巴荳柒箇草麻仁柒箇大蒜柒箇研入藥末和勻如棗核大每用壹丸綿裹內耳中如覺微痛即出之

又方　用驢生脂和生薑熟搗綿裹塞耳一方有川椒無生薑

又方　用附子以醇醋煮一宿削如棗核以綿裹塞耳中一方治風聾仍灸上星二七壯令氣通耳中即愈

又方　取龜壹枚安於盆中荷葉上養之專看葉上有尿收取滴耳中一方用秦龜雄者置

椀或盤內以鏡照之龜見鏡中影往往淫發而失溺急以物收取用之又一法以紙炷火上熁熱以點其尻亦能失尿

又方　以乾地龍入鹽貯在葱尾內爲水點之一方爲末用綿裹如棗核大塞耳中一方用白頸者安葱葉中麪封頭蒸熟化爲水以滴耳中

草麻子丸　治久聾

草麻子[illegible]　皁角[illegible]取肉

生地龍中者壹條 全蝎貳箇 遠志去心
磁石火煅醋淬七次研細水飛 乳香各貳錢
右為細末以黃蠟熔和為丸塞耳中
又方
天雄貳錢伍分 附子壹枚
右件為細末將雞子開一竅孔取去黃用清和藥
仍入殼中封閉令雞抱之候雞出藥成取出
以綿裹塞耳中取瘥為度
又方通氣散

穿山甲 螻蛄各半兩 麝香壹錢
右為細末以葱涎和劑塞耳或為細末葱管
盛少許放耳中
又方
水銀貳錢半 蚯蚓中者壹條
右就樓葱叢內以壹莖去尖頭入水銀蚯蚓
在內卽繫却頭勿令傾出候蚓化為水滴入
耳中
又方 用大蒜壹瓣壹頭剜壹坑子以巴豆壹
粒去皮慢火炮令極熱入在蒜內以新綿裹
定塞耳中
勝金透關散
川烏頭炮壹箇 細辛各貳錢 膽礬半錢
鼠膽壹具
右為細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細却
入麝香半字用鵝毛管吹入耳中吹時口含
茶清待少時
蒲黃膏 治卒耳聾

細辛 蒲黃各壹分 麵末
杏仁湯浸去皮尖雙仁各叁分
右為末研杏仁如膏和稔如棗核大綿裹塞
耳中日壹易
龍腦膏
龍腦壹錢貳分研 椒目半兩搗末 杏仁貳錢半去皮
右件擣研令勻綿裹棗核大塞耳中日貳易
治暴耳聾 用雞心檳榔壹箇以刀子從臍剜
取壹竅如錢眼大實以麝香坐於所患耳內

從上以艾炷灸之不過二三次効

耳聾 通聖散 見眩暈 四物湯 見虛勞

補中益氣湯 見勞倦 八珍湯 見虛勞

小柴胡湯 見寒熱 地黃丸即六味丸 見虛勞

止元散 見自汗 黑錫丹 見諸逆衝上

安腎丸 見喘[illegible]

龍齒散 治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲不可專服補藥

龍齒 人參 白茯苓

麥門冬 去心 遠志 去心各半兩 丹砂

鐵粉 龍腦 牛黃

麝香 各貳錢半俱另研

右為細末研勻每服半錢匕食後用沸湯調服日二次

黃芪丸

黃芪 壹兩 沙苑蒺藜 炒 羌活 各半兩

黑附子 大者壹枚 羯羊腎 壹對焙乾

右為細末酒糊丸如桐子大每服肆拾丸空心食前煨葱鹽湯下

五苓散 見消癉 青木香丸 見氣

芎歸飲

川芎 當歸 細辛 各半兩

石菖蒲 官桂 白芷 各參錢

每服參錢水貳盞入紫蘇薑棗煎至壹盞去滓不拘時服如虛冷甚者酌量加生附子

柴胡聰耳湯 治耳中乾耵耳鳴致聾

柴胡 參錢 連翹 肆錢 水蛭 半錢炒另研

蝱蟲 參個去翅足研 麝香 少許研 當歸身

人參 炙甘草 各壹錢

右除另研外以水貳盞入薑參片煎至壹盞稍熱下水蛭等末再煎壹貳沸食遠稍熱服

芷芎散 治風入耳虛鳴

白芷 石菖蒲 炒 蒼朮

陳皮 細辛 厚朴 製

半夏 製 辣桂 木通

紫蘇莖葉 炙甘草 各壹分 川芎 [illegible]分

右剉散每服叁錢薑伍片葱白貳根煎食後
臨卧服

麝香散 治耳内虛鳴

麝香半錢 全蝎肆拾箇 薄荷拾肆葉裹麝香全蝎

火上炙乾

右為細末滴水捏作挺子塞耳内極妙

療耳鳴沸鬧

吳茱萸 巴荳去皮炒 乾薑

石菖蒲 磁石 細辛各壹分

右為末用鵝膏和少許以綿裹塞耳中以鹽

伍升布裹蒸熨耳門令暖氣通入耳内冷卽
易之如此數次瘥後常以亂髮捲塞耳中慎
風 一方無磁石

〔耳痛〕生犀丸 治耳中策策疼痛

犀角鎊 牛黃研 南星

白附子炮 乾薑炮 丹砂研

沒藥研 半夏湯洗 龍腦研

乳香研 烏蛇酒浸去皮骨炙 官桂各貳錢半

防風 當歸焙 麝香各半兩研

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服貳拾丸
空心溫酒送下

犀角飲子 見前風熱門

解熱飲子 治氣虛熱壅耳内聾閉徹痛膿血
流出

赤芍藥 白芍藥各半兩 當歸

川芎 炙甘草 大黃蒸

木鼈子去殼各壹兩

右為剉散每服肆錢水壹盞煎至柒分食後

臨卧服

黍粘子湯 東垣 治耳内痛生瘡

桔梗半兩 桃仁[illegible] 柴胡

黃芪[illegible] 連翹 黃芩

黍粘子 當歸梢 生地黃

黃連[illegible] 蒲黃 炙甘草

草龍膽 昆布 蘇木

生甘草[illegible] 紅花少許

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食後忌寒藥
利大便
涼膈散 見發熱
白龍散 治小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於
耳津液結滯則生膿汁亦有因沐浴水入耳內
水濕停積搏於血氣蘊積成熱亦令耳膿汁
出謂之停耳久而不愈則成聾
白礬 枯 黃丹 龍骨 各半兩
麝香 一錢

右研極細先以綿杖子展盡耳內膿水用藥
壹字分摻兩耳日二次勿令風入
杏仁膏 治耳中汁出或痛或膿
右用杏仁炒令赤黑研成膏薄綿裹內耳中
日叁肆度易之或亂髮裹塞之亦妙一方治
耳卒痛或水出用杏仁炒焦爲末葱涎搜和
爲丸以綿裹塞耳亦可又治耳腫兼有膿
菖蒲挺子 治耳中痛
菖蒲 壹兩 附子 炮去皮 臍

右爲細末每用不以多少油調滴耳內效一
法用醋丸如杏仁大綿裹置耳中日三易一
法搗菖蒲自然汁灌耳神効
治耳痛不可忍用磨刀鐵漿滴入耳中即瘉
耳痒 四生散 見中風
透冰丹 治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅
塞心胸不利口舌乾澀風毒下疰腰脚沉重
腫痛生瘡大便多秘小便赤澀及治中風癱
緩一切風疾

川大黃 去皮 山梔子 去皮 蔓荊子 去白皮
白茯苓 去皮 益智子 去皮 葳靈仙 去蘆頭洗焙乾
白芷 各半兩 香墨 燒醋淬研 麝香 研各壹錢
茯神 去木 川烏 二兩用河水浸半月切作片焙乾用鹽炒
天麻 去苗 仙靈脾葉 洗焙
右爲細末煉蜜和如麥飯相似以眞酥塗杵
臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和成劑每服
旋丸如梧子大用薄荷自然汁同溫酒化下
兩丸如卒中風涎潮昏塞煎皂莢白礬湯化下

温化肆九灌之癰緩風每日服叁伍九漸覺
有効常服壹丸踈痰利鬲用温酒下食後服
小兒驚風入膩粉少許薄荷汁化下半丸立
効治瘰癧葱湯下壹丸忌動風毒物

停耳 柴胡聰耳湯 見前耳鳴條

通氣散
郁李仁 去皮研　芍藥　人參 各半兩
大黃　山芋　官桂 去皮各壹兩
檳榔 叁枚　牡丹皮　木香
細辛 去苗　炙甘草 各貳錢半

右爲細末研勻每服壹錢七空心温酒調服

蔓荊子散 治内熱耳出膿汁
蔓荊子　赤芍藥　生地黃
桑白皮　甘菊花　赤茯苓
川升麻　麥門冬 去心　木通
前胡　炙甘草 各壹錢
水貳盞薑叁片紅棗貳枚煎至壹盞食後服

紅綿散
白礬 六錢　膩脂 貳字
右研勻先用綿杖子展去膿及黃水盡用別
綿杖子引藥入耳中令到底摻之即乾

松花散
枯礬 半兩　麻勃　木香
松脂　花臙脂 各貳錢半
右搗羅爲末每用先以綿杖子滓拭後用藥
吹入耳

白蓮散
枯礬　烏賊骨　黃連 去鬚

龍骨 各壹兩
右爲細末以綿裹棗核大塞耳中日三易

麝香散
桑螵蛸 燒存性　麝香 壹字
右爲末研令勻每用半字摻耳如有膿先用
綿杖子撚乾 次生麝香少許再多研勻入耳

禹餘糧丸
禹餘糧 火燒醋淬七次　烏賊魚骨

釜底墨 伏龍肝各貳錢半 生附子壹枚大者炮去皮臍

右件為末以綿裹如皂角子大塞耳日再易之如不瘥者內有蟲也

礬石散 治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不瘥有蟲

右用枯礬研細每以葦筒吹少許入耳中日叁肆度或以綿裹棗核大塞耳一方先以綿拭鹽摻之次入礬末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽末粉其上

食久乃起不過再度未瘥一方不用鹽

又方 用商陸生者洗淨以竹刀削如棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

葱涎膏 治耵聹塞耳聾不可強挑

葱汁叁合 細辛去苗 附子炮去皮各貳錢半

右以細辛附子為末葱汁調令稀灌入耳中

又方

龍骨 枯礬 臙脂

海螵蛸各等分 麝香少許

右為細末先繳耳淨將藥乾摻耳中

菖蒲散

菖蒲焙 狼毒 磁石火煅醋淬

附子炮去皮 枯礬各半兩

右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蛀散

苦竹蛀末 枯白礬各貳錢 乾臙脂伍分

麝香壹錢

右研極細以綿杖子撚之用鵝毛管輕吹壹

字入耳

蠍倍散

全蠍叁錢燒存性 五倍子壹兩炒 枯礬壹錢

麝香少許

右為細末研勻每用少許吹入耳中一方加乾臙脂

立効散

陳橘皮壹片燒黑壹錢研末 麝香少許

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨次上藥

治停耳方

麝香炒半錢 蟬殼半兩洗淨入燒存性

右研極細先用綿展耳內膿令淨吹入藥杜耳門不得動追出惡物即愈

又方

狗膽壹個取汁 枯礬壹錢

右以臘猪脂調和納耳中以綿塞之不經三兩上除根

香附散 用香附去毛研爲末以綿杖送入耳

附子丸 治耳聾出膿疼痛及耵聹塞耳

附子炮去皮臍 菖蒲米泔浸焙 枯白礬

蓖麻仁另研 松脂各壹兩研 乾臙脂半兩

杏仁貳兩去皮尖雙仁炒另研

右爲細末研勻熔黃蠟和撚如棗核大針穿壹孔令透塞耳中日壹換一方治耵聹不用黃蠟只搗成膏綿裹如棗核大塞耳

治耳膿

蜜陀僧壹錢 輕粉伍分 麝香壹字

右爲細末先以綿拭耳內膿却摻藥

三黃散 治耳內流膿

雄黃 硫黃 雌黃各等分

右爲細末以少許吹入耳中

二聖散 治耳內出膿水

羌活 白附子炮各壹兩

右爲細末用猪羊腎各壹隻切開每隻入藥末伍分不得着鹽濕紙裹煨熟五更初溫酒嚼下續喫粥壓之

無憂散 按儒門事親方黃耆木通桑白皮陳皮各壹兩胡椒白朮木香各半兩牽牛頭末肆兩俱爲細末每服三伍錢食後以薑汁調下此所用似是局方中王荊無憂散雄黃丸解毒雄黃丸也二方並見咽喉門

耳內瘡 曾青散

雄黃半柒錢 曾青五錢 黃芩半柒錢

右爲細末研勻每用少許納耳中有膿汁用綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連半兩 枯白礬柒錢半

右爲細末每用少許綿裹納耳中

柴胡梔子散（一名梔子清肝散）　治三焦及足少陽經風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡　梔子炒　牡丹皮各壹錢

茯苓　川芎　芍藥

當歸　牛蒡子炒各柒分　甘草伍分

右水煎服若太陽頭痛加羌活

當歸川芎散　治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利腹脇痞痛

當歸　川芎　柴胡

白朮　芍藥各壹錢　山梔炒壹錢貳分

牡丹皮　茯苓各捌分　蔓荊子

甘草各五分

右水煎服　若肝氣不平寒熱加地骨皮肝氣實加柴胡黃芩氣血虛加參芪歸地脾虛飲食少思加苓朮脾虛胸膈不利加參芪痰滯胸膈不利加朮半肝氣不順胸膈不利或小腹痞滿或時攻痛加青皮肝血不足胸膈不利或小腹痞滿或時作痛加熟地肝血虛寒小腹時痛加肉桂日晡發熱加歸地

加味地黃丸　治肝腎陰虛瘡證或耳內痒痛出水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤濇等證

乾山藥　山茱萸肉　牡丹皮

澤瀉　白茯苓　熟地黃

生地黃　柴胡　五味子各另爲末等分

右將二地黃搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉蜜爲丸如桐子大每服百丸空心白湯下不應用加減八味丸

立驗散　治蚰蜒入耳

川芎　白芷　夜明沙炒

猪牙皂角炙　南星炮各半錢　百部

白丁香　藜蘆各肆錢　草烏半兩

砒霜另研　蓽撥各貳錢　海金沙[illegible]

右爲細末研勻臨時再入用鉛丹調色勻磁器收如蚰蜒入耳取少許以醋一滴調化以細翎蘸藥入耳竅微吹令藥氣行立出藥不得多多即蚰蜒成水不出如蚰蜒先點少醋在痊處摻藥半字許擦令熱即効

鼻

麗澤通氣湯

羌活 獨活 防風

升麻 葛根各貳分 麻黄存節肆分冬月加之

蒼朮叁錢 川椒壹分 白芷

黃芪壹錢 甘草貳分

右作壹服水貳盞生薑叁片棗貳枚葱白叁寸同煎至壹盞去滓稍熱服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐卧行住

溫肺湯

升麻 黃芪 丁香各貳錢

葛根 羌活 甘草炙

防風各壹錢 麻黄肆錢不去節

右麤末分貳服每服水貳大盞葱白貳莖煎至壹盞去滓稍熱食遠服

禦寒湯 治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞欬嗽上喘

黃芪壹錢 人參 升麻

陳皮各五分 甘草炙 款冬花
佛耳草 防風各叁分 黃連
黃蘗 羌活 白芷各貳分
蒼朮柒分
水貳大盞煎至壹大盞去滓稍熱食遠服
温衛湯
黃芪 蒼朮 升麻
知母 羌活 柴胡
當歸身各壹錢 人參 甘草炙

白芷 防風 黃蘗
澤瀉各五分 陳皮 青皮
木香 黃連各叁分
水貳盞煎至壹盞去滓食遠温服晴日服之
温衛補血湯
黃芪壹錢貳分 升麻肆分 柴胡
炙甘草 生甘草 地骨皮
桔梗 人參各叁分 生地黃
白朮 藿香 吳茱萸

黃蘗各壹分 蒼朮 陳皮
王瓜根 牡丹皮各貳分 當歸身貳分半
桃仁叁個 葵花柒朶 丁香壹個
水貳盞煎至壹盞半去滓食前稍熱服
人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通
人參 白茯苓 黃芩
陳皮去白 羌活 麻黃去根節
蜀椒去目并合口者炒出汗各壹錢半
水貳鍾煎至壹鍾食後服

辛夷散 治肺虚爲四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通不聞香臭
辛夷 川芎 木通去節
細辛洗去土 防風去蘆 羌活
藁本 升麻 白芷
甘草炙各等分 蒼耳子减半
右爲細末每服貳錢食後茶清調服
增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利
鼠粘子 桔梗 桑皮

紫苑各壹錢半 荆芥穗貳錢 生甘草柒分
水貳鍾薑叄片煎壹鍾食後服
辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯
唾稠粘
辛夷去毛 川芎 白芷
甘菊花 前胡 石膏
白朮 生地黃 薄荷
赤茯苓去皮 陳皮去白各壹兩 炙甘草貳兩
右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓

食遠温服
醍醐散 治傷風鼻塞聲重
細辛半兩 川芎壹兩 薄荷壹兩半
川烏炮去皮臍 撫芎 白芷
甘草各貳兩
右為細末每服壹錢葱茶或薄荷湯調下
通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流
清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒
原蠶蛾[illegible]焙黃 白附子炮 益智去皮

蒺藜炒去角 薄荷 苦參各半兩
右為細末每服叄錢不拘時温酒調下
防風湯
防風半兩 梔子柒枚 升麻壹兩
石膏研叄兩 麻黃去節柒錢半 官桂去皮半兩
木通壹兩貳錢半
右㕮咀每服叄錢水壹盞煎柒分去滓空心
温服日再
排風散 治鼻塞或生瘜肉

防風 秦艽去苗 吳茱萸湯泡焙
天雄炮去皮臍 山芋各壹兩 羌活半兩
右為細末每服貳錢空心温酒調下
蓽澄茄丸
蓽澄茄半兩 薄荷葉叄錢 荆芥穗貳錢
右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化
一二丸
菖蒲散 治鼻內窒塞不通不得喘息
菖蒲 皂角各等分

右爲細末每用壹錢綿裹塞鼻中仰臥少時

通頂散

胡黃連　滑石各貳錢　瓜蒂伍拾枚

麝香研壹錢　蟾酥少許

右研勻每用少許吹入鼻內即瘥

芎藭散

芎藭　細辛去苗葉貳錢半

木通

右爲細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之

五七日瘥

瓜蒂散

瓜蒂　藜蘆各等分

右爲末每用壹錢綿裹塞鼻中日一易之一

方以狗膽汁和綿裹塞鼻中

蒺藜汁方　治鼻塞多年不聞香臭清水流出不止

右取當道車碾過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰臥使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使人不過再度大嚏必出一兩個瘜肉似赤蛹蟲一方有黃連等分同煎

芎藭散

芎藭　檳榔　肉桂

麻黃去節　防己　木通

細辛　石菖蒲　白芷各壹分

木香　川椒　炙甘草各半分

右㕮咀每服叁錢水貳盞生薑叁片紫蘇葉少許煎至八分去滓食遠溫服

山茱萸丸

山茱萸　大黃剉炒　菊花各壹兩

朴硝叁兩　附子炮去皮臍　獨活各叁錢半

秦艽去苗上壹兩半　蔓荊子去白皮　梔子去皮炒

防風　炙甘草各壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二十丸空心用溫酒送下老人亦宜服妊娠去附子加細辛半分

赤龍散　大抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面

若上焦壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭遂成齆也

龍腦 半錢研　瓜蔕 拾肆枚　黃連 叁大莖

赤小豆 叁拾粒

右為細末研勻每用菉豆許臨卧吹入鼻中水出愈

通頂散

瓜蔕　藜蘆 各壹分　皂角肉 半分

麝香 少許

右為細末每用少許吹入鼻中

雄黃散

雄黃 半錢　瓜蔕 貳枚　綠礬 壹錢

麝香 少許

右為細末每用少許搐鼻中亦治瘜肉

黃白散　治鼻齆瘜肉鼻痔等證

雄黃 半錢　白礬　瓜蔕

細辛 各壹錢

右為細末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搐鼻

通草散　治鼻齆氣息不通不聞香臭并鼻瘜肉

木通　細辛　附子 各等分

右為末蜜和綿裹少許納鼻中

[illegible]川椒散　治鼻流涕

川椒 炒出汗閉口者去　訶子 去核　辣桂

川白薑 生用　川芎　細辛

白朮 各等分

右為細末每用貳錢食後溫酒調下

細辛散　治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸膈不利

細辛 壹兩　附子 炮去皮臍　白朮

訶梨勒 煨去核　蔓荊子　芎藭

桂心 各半兩　枳殼 麩炒　炙甘草 各半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞生薑半分煎至壹分去滓食後溫服

本事通草丸　治鼻塞清涕出腦冷所致

通草　辛夷各半兩　細辛

甘遂　桂心　芎藭

附子各壹兩

右細末蜜丸綿裹納鼻中密封勿令氣泄丸如麻子稍加大後覺少痛効擣薑爲丸即愈

辛夷散　因治鼻塞腦冷清涕不已

細辛　川椒　乾薑

川芎　吳茱萸　辛夷

附子各錢半　皁角屑半兩　桂心壹兩

猪油陸兩

右煎猪脂成膏以苦酒浸前八味取入油煎附子黃色止以綿裹塞鼻中

千金細辛膏　治鼻塞腦冷清涕常流

細辛　川椒　川芎

黑附子炮去皮臍　乾薑　吳茱萸各貳錢半

桂心各叄錢叄分　皁角屑壹錢分半

右用猪脂貳兩煎油先壹宿以米醋浸藥取入猪油內同煎附子色黃爲度以綿醮藥塞鼻中

塞鼻桂膏　治鼻常有清涕

桂心　細辛　乾薑炮

川椒去目并合口者炒出汗各半兩　皁莢貳錢半

右爲細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞鼻中

白芷丸　治鼻流清涕不止

白芷研爲細末以葱白擣爛和爲丸如小荳

大每服貳拾丸茶湯下無時

鼻淵

防風湯　治膽移熱於腦則辛頞鼻淵濁涕不止如湧泉不藏久而不已必成衄血之疾

防風去蘆壹兩半　黃芩　人參

炙甘草　川芎　麥門冬去心各壹兩

右爲細末每服貳錢沸湯點服食後日三

蒼耳散　治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁半兩　蒼耳子炒貳錢半　香白芷壹兩

薄荷葉伍分

右為細末每服貳錢用葱茶清食後調服

辛夷散　治鼻中壅塞涕出不已或氣息不通不聞香臭

辛夷仁　細辛去土　藁本去蘆

升麻　川芎　白芷

木通去節　防風　甘草

右為末每服貳錢食後茶清調服

防風通聖散見眩暈

抑金散　治肺熱鼻塞涕濁

細辛白芷與防風　羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓輩　十般等分剉和同

叁錢薄荷薑煎服　氣息調勻鼻竅通

補腦散缺　黑錫丹見諸氣門上

紫靈丹缺　靈砂丹見暈門

南星飲　治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞腦氣不宣遂流髓涕

上等大白南星切成片用沸湯盪兩次焙乾每服貳錢用棗柒枚甘草少許煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自收仍以大蒜蓽撥末杵作餅用紗襯炙熱貼顖前熨斗火熨透或香附末及蓽撥末入鼻中

辛夷丸　治頭風鼻涕下如白帶者

南星　半夏製各壹兩　蒼朮米泔浸

黄芩酒炒　辛夷　川芎

黄蘗炒焦　滑石　牡蠣煅各半分

右末糊丸薄荷湯下

川芎丸　治腦瀉臭穢

川芎壹兩生用　蒼朮壹兩生用　草烏半兩生去皮

右為細末麪糊和丸如桐子大每服拾丸食後茶清送下服藥後忌熱物一時

治鼻淵腦瀉

右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗湧泉穴

鼻痔　勝濕湯見腹痛　瀉白散見發熱

羊肺散

羊肺壹具　白朮肆兩　從蓉

木通　乾薑　川芎各壹兩

右五味爲細末以水量打稀稠得所灌肺中煮熟焙乾細研爲末食後米飲服貳錢

細辛散　治鼻齆有瘜肉不聞香臭

北細辛　瓜蒂各等分

右爲末綿裹如豆大塞鼻中

消鼻痔方

苦丁香　甘遂各貳錢　青黛

草烏尖　枯白礬各貳分半

右爲細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納入鼻內令至痔肉上每日一次

治鼻中窒塞孔息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥餘縣雖漸通利旋復生長宜用此藥

地膽生研　白雄犬膽壹枚

右先擣地膽爲末納犬膽中以繩繫定三日乃於日出時令病人西首卧中庭以鼻孔向日傍人以故筆粘藥塗入鼻孔中一月一度

至五六日當鼻孔裏近眼痛此是欲落更候三四傅之漸漸嚏之即落取將掐於四通道上柱落後急以綿塞之慎風

治瘜肉方

甘遂　硃砂　雄黃

雌黃　藜蘆　瓜蒂

明礬煅各等分

右爲末蜜調傅鼻

辛夷膏　治鼻生瘜肉窒塞不通有時疼痛

辛夷葉壹兩　細辛　木通

木香　白芷　杏仁湯浸去皮尖各半兩

右用羊髓猪脂貳兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各壹錢爲丸綿裹塞鼻中數日內脫落即愈

輕黃散　治鼻中瘜肉

輕粉　杏仁壹錢湯浸去皮尖

雄黃半兩　麝香少許

右四味用淨乳鉢內先研杏仁如泥後

黃麝香同研極細勻磁合盛定每有患者不拘遠近夜卧用筯點粳米大在鼻中瘜肉上隔一日夜卧點一次半月見効

黃白散 見前

二丁散

苦丁香　丁香　粟米

赤小荳 各末 石膏 少許

右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭或偏頭風皆可吹 一方無粟米石膏

治鼻痔方

明礬 壹兩　蓖麻 去殼　鹽梅 伍箇去核

麝香 少許

右擣為丸綿裹塞鼻內令着瘜肉候化清水出四邊玲瓏其瘜肉自下

瓜丁散

瓜丁 即瓜蔕　細辛 各等分

右為細末綿裹荳許塞鼻中

地龍散

地龍 去土炒貳錢半　猪牙皂角 壹挺

右煆存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在內出清水盡息肉自除

通草膏 治鼻齆有瘜肉不聞香臭

通草　附子 炮　細辛 各等分

右為末煉蜜丸如棗核大綿裹塞鼻內

新增 烏犀丸

烏犀 鎊　羚羊角 鎊　牛黃 研

柴胡 去苗　丹砂 研　天門冬 去心焙

貝母 去心炒　胡黃連　人參 各半兩

麥門冬 去心焙　知母 各柒錢半　黃芩

炙甘草 各貳錢半

右為細末研勻煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空心溫酒送下

甘露飲 見齒　黃連阿膠丸 見衄下

地黃煎 治鼻生瘡痒痛不止

生地黃汁　生薑汁 各壹合　苦參 壹兩剉

酥 叁合　鹽花 貳錢後入

右地黃汁生薑汁浸苦參壹宿以酥和於銅
石器中煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入
盒中每用少許滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其
鹽花至半却下
辛夷膏 治鼻內生瘡疼痛或塞不通兒痛
鼻疳 椿根湯 治疳蝕口鼻
椿根去皮切壹升 蔥白細切半升 豆豉半升
鹽半合 川椒去目并合口者炒出汗壹合
右合和以醋及清泔各叁升煎數拾沸去滓

約壹升分叁服有惡物下即效小兒量大小
加減
烏香散 治鼻疳侵蝕鼻柱
草烏燒灰 麝香研各等分
右研極細以少許貼瘡上
鼻乾無涕 犀角散 治肺熱心神煩悶
犀角屑 木通 升麻
赤茯苓 黃芪 馬牙硝
杏仁去皮尖雙仁麩炒黃各半兩 麥門冬去心壹兩

硃砂研 龍腦研 炙甘草各貳錢伍分
右爲細末每服壹錢食後竹葉湯調下
桑根白皮散 治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無
涕頭疼心悶
桑根白皮 木通 大黃剉炒各貳兩
升麻壹兩 石膏 葛根各叁兩
甘草炙各壹兩
每服叁錢水壹盞煎至陸分食後溫服
吹鼻散

龍腦半錢 馬牙硝壹錢 瓜蒂拾肆枚爲末
右研極細每用壹豆大吹入鼻中
鼻塞 人參順氣散又名通氣祛風湯 治感風頭疼鼻塞
聲重及一應中風者先宜服此藥疏通氣道
然後進以風藥
乾薑半兩 人參 川芎去蘆
炙甘草 乾葛 苦梗去蘆
厚朴去皮薑製 白朮去蘆 陳皮去白
白芷各壹兩 麻黃去節壹兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚薄荷伍柒葉同煎捌分不拘時熱服如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎

白芷散

白芷　杏仁湯泡去皮尖　細辛各壹錢

全蠍去頭焙

右為細末麻油調傅

沒藥散　治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛

沒藥　乾蝎去土炒　南星炮

白附子炮　雄黃研　當歸焙

丹砂研　胡黃連　牛黃研

白芷　麝香研　官桂去皮

丁香　炙甘草各貳錢　烏蛇酒浸去皮炙肉半兩

右為細末研勻每服半錢溫酒調下早晚各壹服

白蘚皮湯　治肺受風面色枯白頰時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛此為虛風

白鮮皮　麥門冬去心　白茯苓去皮

杏仁去皮尖雙仁炒　細辛去苗　白芷各壹兩半

桑白皮　石膏研各貳兩

每服叁錢水壹盞先煮大豆叁合取汁壹盞去豆下藥煎至柒分去滓不拘時服

蓢蘆酒　治鼻塞眼昏疼痛腦悶

右取苗蘆壹兩碎之以醇酒半升浸春三夏一秋五冬七日少少內鼻中一方用童便浸汁

神効宣腦散　取黃水鼻中下

川鬱金　川芎　青黛

薄荷　小黃米各貳分

右為細末每用少許口噙冷水搐鼻中

消風散見頭痛

升麻防風散

升麻　防風　人參各壹兩

蝎尾炒壹兩　雄黃貳錢　牛黃

甘草　硃砂伍分　各貳錢　麝香壹分

殭蠶半兩炒

右剉碎煉蜜丸如櫻桃大硃砂爲衣每服壹丸薄荷湯送下

瀉青丸見頭痛

梔子仁丸　治肺熱鼻發赤瘰

梔子仁不拘多少

右爲細末以黃蠟爲丸如桐子大每服貳拾丸食後茶酒任下

白礬散　治肺風酒皶鼻等疾

白礬生　硫黃生　乳香各等分

右爲末每用手微抓動患處以藥搽之

硫黃散　治酒皶鼻鼻上生黑粉刺

硫黃生　輕粉各壹錢　杏仁貳拾箇去皮

右爲細末唾津調臨卧時塗鼻上早晨洗去

凌霄花散　治酒皶鼻

凌霄花　山梔子各等分

右爲細末每服貳錢食後茶湯調服

何首烏丸　治肺風鼻赤面赤

何首烏半壹兩　防風　黑荳去皮

荆芥　地骨皮先各壹兩　桑白皮

天仙藤　苦參　赤土各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服叁肆拾丸食後茶清下一方有赤木各兩

大風油　治肺風面鼻紫赤

草烏尖[illegible]　大風油[illegible]文　真麝香伍拾文

右以草烏尖爲末入麝研勻次用大風油磁合子盛於火上調勻先以生薑擦患處次用

藥擦之日三二次兼服前何首烏丸即除根本

治赤鼻方

川椒　雄黃　枯礬

舶上硫黃　天仙子　三柰各壹兩

輕粉　麝香[illegible]

右爲細末小油調搽患處

冬瓜子散　治鼻面酒皶如麻荳疼痛黄水出

冬瓜子仁　柏子仁　白茯苓

蒺子（微炒） 枳實（麩炒各壹兩） 梔子仁（貳兩）

右為細末每服貳錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草烏火（去皮） 明礬（十錢） 麝香（壹字）

猪牙皂角（壹錢）

右為細末以大楓油和勻用磁器火上熔開

先以薑擦次以藥擦之日三次

治酒皶鼻

生硫黃（肆錢） 黃連 白礬

乳香（各壹錢半） 輕粉（半錢）

右為細末用唾津調藥擦之日二次

治酒皶鼻并治鼻上贅肉及雀斑等疾亦可點

痣

黃丹（伍文） 硇砂（叁拾文研細） 巴豆（拾粒去殼心膜紙捏去油）

酒餅藥（伍拾文雞子壹）

右同入餅藥鑵子中慢火煎兩三沸取下續

入研細生礦灰叁錢雞子清調勻赤鼻以鵝

毛拭紅處一日一次上藥追出毒物病退即

止次服消風散樺皮散之類五七貼雀斑用

小竹棒挑藥點患處纔覺小腫即洗去不洗

恐藥力太猛

治赤鼻及面上風瘡

大楓油（伍拾文） 草烏（壹箇為末） 輕粉

麝香（各壹伯文）

右先將草烏入油內熬令勻取出少時下輕

粉麝香末攪勻每用少許擦患處令熱每日

搽一方無輕粉用生薑擦患處傅藥

治鼻赤肺風

肺風鼻赤最難醫 我有良方付與伊

但用硫礬為細末 茄汁調塗始見奇

荊芥散 治肺風皶疱

荊芥穗（肆兩） 防風 杏仁（去皮尖）

蒺藜（炒去刺） 白殭蠶（炒） 炙甘草（各壹兩）

右為細末每服貳錢食後茶清調下

萆麻子膏 治酒皶鼻及肺風面赤生瘡

萆麻子（去殼研） 輕粉 瀝青（研）

硫黃研　黃蠟各貳錢　麻油壹兩

右熬成膏以磁器盛之每用少許塗患處

鉛紅散　治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺癮疹俗呼肺風以肺而淺在皮膚也

舶上硫黃　白礬灰各半兩

右爲末入黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液塗之洗漱罷及臨卧再上兼服升麻湯下瀉青丸服之除其本也

三黃丸見發熱

[illegible]小柴胡湯見往來寒熱

龍膽瀉肝湯

柴胡壹錢　黃芩柒分　生甘草

人參　天門冬去心　黃連

草龍膽　山梔　麥門冬

知母各伍分　五味子柒粒

水貳盞煎至壹盞去査溫服食遠忌辛熱物

大効

[illegible]五苓散見消渴　導赤散見發熱

胡黃連散

胡黃連伍分　藿香壹錢　細辛

黃連各叁錢

右爲末每半錢乾摻口內漱吐之

必効散

白礬　大黃各等分

右爲細末臨卧乾貼瀝涎盡溫水漱之

黃蘗散

黃蘗蜜塗炙乾去火毒　白殭蠶直者置新瓦上下以火燒斷絲去火毒

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

回春涼膈散見發熱　甘桔湯見咽喉

三補丸

黃芩　黃連　黃蘗

等分末之水丸每服叁拾丸白湯下

金花丸

黃連　黃蘗　黃芩

梔子　大黃便秘加之

等分末之水丸每服叁拾丸白湯下

黃連升麻湯

升麻壹錢　黃連叁錢

右為細末綿裹含津嚥

綠袍散

黃蘗肆兩　炙甘草貳兩　青黛壹兩

右先取貳味為末入青黛同研勻乾貼

蜜蘗散　黃蘗不計多少蜜炙灰色為細末

摻上臨臥忌酒醋醬犯之則瘡難愈

黃連散

黃連　朴硝　白礬各半兩

薄荷壹兩

右為麤末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭挂兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈

蟾酥綿

蟾酥伍皂角子大　硼砂　龍腦

麝香各壹皂子大

右研極細以滾湯半盞化令勻入絲綿秤半錢蘸藥汁曬乾候藥汁盡將綿寸截每用壹片貼於患處有涎即吐一日三五次易之取瘥

黃連解毒湯見發熱　理中湯見霍亂

降氣湯　養正丹俱見氣

黑錫丹見諸逆衝上

升麻飲　治口內生瘡齒斷肉爛

升麻　玄參　黃連
羚羊角鎊　黃芩　葛根
大黃　麥門冬去心　羌活
防風　甘菊花各半兩　人參
知母　炙甘草各壹錢半
右㕮咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食
後溫服一方無人參有牛蒡子

氷蘗丸
龍腦少許　黃蘗　川乾　硼砂研
薄荷葉各等分

右為細末研勻生蜜和丸如龍眼大每服壹
丸津液化下瘡甚者加腦子研

口臭
加減甘露飲本事　治男子婦人小兒胃客熱
口臭牙宣赤眼口瘡一切瘡疼已散未散皆
可服之明用天甘露飲心肺門藥也
熟地黃　生地黃　天門冬去心
黃芩　枇杷葉去毛　山茵陳
枳殼　金釵石斛各壹兩
甘草　犀角各壹錢
右為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去查食
後臨臥溫服小兒壹服分作兩服更斟酌與
之

加減瀉白散
桑白皮叁錢　地骨皮貳錢　炙甘草壹錢半
知母柒分　黃芩伍分　五味子貳拾壹粒
麥門冬伍分　桔梗[illegible]
右㕮咀水貳盞煎至壹盞去查溫服食遠壹

日貳服忌酒濕麵及辛熱之物

生香膏　治口氣熱臭
右用乾甜瓜子去殼研細蜜少許調成膏食
後含化或傅齒上尤妙一方空心洗漱訖含
化壹丸如棗核大

地骨皮丸　治肺熱口臭口中如膠舌乾發渴
小便多
地骨皮　黃芪　桑白皮
山梔子　馬兜鈴各等分

右爲細末甘草膏和丸如芡實大每服壹丸
食後噙化
升麻黃連丸　治多食肉口臭不欲聞其穢惡
升麻　青皮各半兩　黃連
黃芩酒洗各貳兩　生薑　檀香
甘草生用各貳錢半
右爲細末水浸蒸餅爲丸如彈子大每服壹
貳丸不拘時細嚼白湯送下

清胃散　治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不
可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡
入腦喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其
齒喜冷惡熱
生地黃酒制參分　升麻壹錢　牡丹皮半錢
當歸身參分　揀黃連參分如連不好更加貳分夏倍之
右五味同爲細末水煎至壹半去滓候冷細
呷之

承氣湯見大便不通　調胃承氣湯見發熱
越鞠丸見六鬱　補中益氣湯見勞倦
歸脾湯見健忘　六味丸
還少丹　八味丸俱見虛勞
獨活散　治風毒牙痛或牙齦腫痛
獨活　羌活　川芎
防風各伍分　細辛　荊芥
薄荷　生地黃各貳錢
右每服參伍錢水煎漱嚥

茵蔯散　治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去骨槽風熱

茵蔯　連翹　半夏

荊芥穗　麻黃　升麻

黃芩　牡丹皮　射干

羌活　獨活　大黃煨

薄荷　殭蠶各貳錢半　細辛半兩

牽牛壹兩

右為細末每服叁錢水壹盞先煎湯熟下藥末攪壹攪急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯東垣 治冬月大寒犯腦令人腦齒連痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黃去節　黑附子炮各叁分　羌活

蒼朮各伍分　黃芪壹分　防風

甘草　升麻　白殭蠶炒去絲

黃蘗　白芷各叁分　佛耳草有寒嗽者用之如無不用

右水煎服

消風散見頭痛

羌活散東垣

麻黃去根節　白芷各叁錢　羌活根壹錢半

防風根叁錢　藁本　當歸身各叁分

細辛根　柴胡根　升麻

蒼朮各伍分　羊脛骨灰貳錢半

草荳蔻　桂枝各壹錢

右為細末先用溫水漱口淨後擦之其痛立止

麻黃散東垣

麻黃根不去節　羊脛骨灰　龍膽草酒洗

生地黃各貳錢　羌活壹錢半　防風

藁本　升麻　黃連

草荳蔻各壹錢　當歸身　熟地黃各陸分

細辛根少許

右極細末依前擦之

細辛散東垣 治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黃去節叁錢　桂枝　羊脛骨灰各貳錢半

羌活　草荳蔻各壹錢半　柴胡

升麻　防風　白芷
藁本　蒼朮　當歸身各伍分
細辛叁分
右為細末先漱後擦之神效
白芷散東垣　治大寒犯腦牙齒疼痛
麻黃去節　草豆蔻各壹錢半　黃芪
桂枝各貳錢半　吳茱萸　白芷各肆分
藁本叁分　羌活捌分　當歸身
熟地黃各伍分　升麻壹錢

右為細末先用水漱淨以藥擦之
蝎梢散東垣　治大寒犯腦牙疼
麻黃去節壹錢半　當歸身　柴胡
白芷各貳分　桂枝　升麻
防風　藁本　黃芪各叁分
羌活伍分　羊脛骨灰貳錢半
草豆蔻皮壹錢　蝎梢少許
右為末用法如前
牢牙地黃散東垣　治牙疼及腦寒痛

麻黃　黃連　羊脛骨灰各壹錢
升麻壹錢半　草豆蔻皮壹錢貳分　吳茱萸捌分
益智仁　當歸身各肆分　藁本貳分
防己　生地黃　人參
熟地黃　羌活各叁分　黃芪
白芷各伍分
右為末先漱口淨擦患處
獨活散　治風毒攻蛀齒齗腫痛
羌活　防風　川芎

獨活　石膏　荊芥
升麻　乾葛　生地黃
細辛　白芷　赤芍藥
黃芩　甘草　右薄荷煎服
金沸草散見欬嗽
當歸龍膽散　治寒熱牙疼
升麻　麻黃　生地黃
當歸梢　白芷　草豆蔻
羊脛骨灰　草龍膽　黃連各等分

右爲末擦之

益智木律散 東垣 治寒熱牙疼

草豆蔻 貳錢貳分 益智仁 當歸身

熟地黃 羊脛骨灰 各伍分

木律 貳分 升麻 壹錢半 黃連 肆分

右細末擦之如寒牙疼去木律

草豆蔻散 東垣 治寒多熱少牙齒疼痛

草豆蔻 壹錢貳分 黃連 升麻 各貳錢半

細辛葉 防風 各貳分 熟地黃

羊脛骨灰 各伍分 當歸身 陸分

右爲細末痛處擦之

麝香散 治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動欲落大作疼痛妨食

麝香 少許 升麻 壹錢 黃連

草豆蔻 各壹錢半 熟地黃 麻黃 各壹分

益智仁 貳分半 羊脛骨灰 貳錢 人參

生地黃 當歸 漢防已 [illegible]

右爲細末每用少許擦牙疼處 [illegible]

吐去

立効散 東垣 治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五藏内盛六府陽道微脉微小小便滑數

防風 壹錢 升麻 柒分 炙甘草 叁分

細辛 貳分 草龍膽 肆分 酒洗

水壹盞煎至伍分去滓以匙抄在口中㳂痛處少時立止如多惡熱飲更加草龍膽壹錢

如更惡風作痛加草豆蔻黃連各伍分勿加龍膽隨寒熱多少臨時加減

升麻散 治上片牙疼

細辛 倍 黃蘗 知母

防已 黃連 升麻

白芷 蔓荊子 牛蒡子

薄荷

右末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

白芷散 治下片牙疼

白芷　防風　連翹
石膏煅　荊芥　赤芍藥
升麻倍　薄荷
右件為細末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服
亦可
神功丸東垣
蘭香葉如無藿香代之　當歸身
木香各壹錢　升麻貳錢　生地黃酒洗
生甘草各叁錢　黃連去鬚揀淨酒洗秤
縮砂仁各伍錢
右同為細末湯浸蒸餅為丸如菉荳大每服
壹伯丸或加至貳伯丸止白湯下食遠服兼
治血痢及血崩血下不止血下褐色或紫色
黑色及腸澼下血空心服米湯下其脉洪大
而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞
妄見者
牢牙散東垣治牙齦肉綻有根牙疳腫痛動搖欲
落牙齒不長牙黃口臭

升麻　羌活　羊脛骨灰各貳兩
草龍膽酒洗壹兩伍錢
右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻
臥時貼在牙齦上升麻舊本作肆分今壹兩札
安腎丸見喘　良方於本方內去肉桂茯苓貳味
餘藥等分統旨無肉桂川烏桃仁萆薢白朮
有杜仲兔絲子
八味丸
還少丹並見虛勞
黑錫丹見諸逆衝上
嘉禾散見反胃
牢牙散　治牙無力不能嚼物
升麻叁錢　生地黃　石膏各壹錢
白茯苓　玄參各伍分　羊脛骨灰
梧桐律各叁分　黃連三錢廿分　麝香少許另研
右為細末研勻每用少許臨臥擦牙復以溫
水漱去
秦耳雄黃定痛膏

大蒜貳枚 細辛去苗 盆硝另研各貳錢
雄黃另研壹錢 猪牙皂角肆錠
右爲細末同大蒜壹處搗爲膏丸如梧桐子
大每用壹丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左
耳右邊牙疼放在右耳良久痛止壹丸可治
數人

透關散

蜈蚣頭 蝎稍去毒 草烏尖如麥粒大者
川烏底如錢薄者各柒枚 雄黃如麥大柒粒另研
胡椒柒粒
右細末用紙撚子蘸醋點藥少許於火上炙
乾塞兩耳內閉口少時即効

刷牙 牢牙散 去風冷蛀齲宣露用之甚効

槐枝 柳枝各長肆寸肆拾玖枝
皂角不蛀者柒莖 鹽肆拾文重
右同入磁瓶內黃泥固濟糠火燒壹夜候冷
取出研細用如常法

白牙散

升麻壹錢 羊脛骨灰貳錢 白芷柒分
石膏壹錢半 麝香少許
右爲細末先用温水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香壹分 升麻壹錢 黃連貳錢
白荳蔻 羊脛骨灰 草荳蔻各叁錢半
當歸身 防己[illegible] 人參各叁分
生地黃 熟地黃各貳分 没石子叁枚
五倍子壹箇
右爲細末用如前法

刷牙方

羊脛骨灰壹兩 升麻壹錢 黃連壹錢
右爲末擦之

長春牢牙散 烏髭髮去牙風

川芎 砂仁 香附子
百藥煎 丁香 升麻
五倍子 白茯苓 細辛
青鹽 金絲礬 白蒺藜

檀香　甘松　破故紙各半兩
石膏貳兩　沒石子　訶子去核各玖箇
膽礬叁錢　麝香半錢
右爲細末研勻早晚刷牙次以温水漱口吐
出
沉香散　堅固牙齒榮養髭髮
沉香　訶子皮　青鹽
青黛研各貳錢　白檀　母丁香各壹錢半
當歸　香附子炒去毛　細辛去苗各半兩

荷葉灰　乳香研各壹錢　苦練子破肆片炒半兩
龍腦另研　麝香另研各半錢　酸石榴皮貳兩半
右爲細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了
早晚貳次
硃砂散　揩牙令白淨
硃砂細研　茅香　藿香
丁皮　香附　甘松
白芷　升麻　黃丹各壹兩
石膏肆兩　寒水石捌兩　猪牙皂角
白檀　零陵香各半兩
右爲細末研勻每用揩齒甚佳
妙應散　牢牙疎風理氣烏髭髮
人參　細辛去苗　白茯苓
香附子炒去毛　川芎　白蒺藜炒去角
砂仁各半兩　百藥煎　白芷
石膏煅　龍骨研各壹錢　麝香另研少許
右爲細末早晨臨臥溫水刷漱之
[illegible]桃仁承氣湯見諸血

[illegible]地黃丸
白茯苓去皮　人參　山芋各肆兩
枸杞根叁兩　生地黃伍斤取汁　白蜜壹斤
酥少許
右將前肆味爲末以好酒壹斗煎至叁升去
滓入地黃汁白蜜酥同煎至可丸即丸如小
荳大每服貳拾丸用溫酒送下日叁服漸
加至五服
甘露飲和劑　治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口

氣齒齦腫爛時出膿血目瞼垂重常欲合閉
或即饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥
口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服
之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕
熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿
氣短大便不調小便黃澀或時身熱並皆治
之

枇杷葉(去毛) 乾熟地黃(去土) 天門冬(去心焙)
枳殼(去瓤麸炒) 山茵陳(去梗) 生乾地黃
麥門冬(去心焙) 石斛(去蘆) 炙甘草
黃芩

右等分為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去
滓溫服食後臨臥小兒壹服分兩服仍量歲
數加減與之

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂(去砂) 松脂 黃蠟(各壹兩)
黃丹(貳錢半) 蟾酥(十字)

右於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上([illegible])

候冷剪作片子每夜貼於斷上有津即吐候
嚥不妨此藥臨臥時用壹次於惡硬物底壹
箇牙根兒下粟外貼之亦不甚悶若是牙兒
堅固自然得力不惡硬物也

治牙動搖疼痛

五倍子 白茯苓 細辛(各伍錢)
青鹽(叁錢)

右為細末早晚刷牙久有大效

宣牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

定粉 龍骨(各貳錢半) 麝香(壹字)
黃蠟(壹兩)

右為細末研勻將黃蠟熔化和藥放冷取出
熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙
條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼經宿至次
日早晨取出藥每夜用之如此半月消牙齒
腫悶坐生斷肉治痲蝕去風邪牢牙齒大有
神效

齒 六類方八

五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不効

欲落者

川五倍子　乾地龍去土微炒各半兩

右為細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日內不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒槽中貼藥齒上即牢如故

治牙齒動搖鬚髮赤黃壹服髭黑牙牢

生薑半斤取汁　地黃壹斤洗淨研細取自然汁別留滓

右以不蛀皂角拾莖刮去黑皮弦將前藥汁蘸皂角慢火炙乾再蘸再炙用藥盡為度并

前藥滓同入磁瓶內用火煅存性為末牙齒動搖用藥擦牙斷上如髭黃以鐵器盛藥末叁錢湯調過叁日後將藥汁蘸擦髭髮臨卧時用次早已黑色叁夜叁次用其黑如漆甚妙

治齒根動欲脫落

右用生地黃綿裹著齒上咂之又㕮咀以汁漬齒根日肆伍夜著之并嚥汁拾日大佳如齒挺出嚼之亦可

土蒺藜散　治牙齒疼痛齗腫搖動及打動牙齒

右用土蒺藜去角生用不以多少為麤末每服伍錢以淡漿水半椀煎柒捌沸去滓入鹽末壹捻帶熱時時漱之別無所忌或用根燒灰貼動牙即牢

治牙齒動搖

右用黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木搥研令沙以熟絹羅為末每日早晨如

常揩牙後用溫水漱在盂內以水洗眼能明目烏髭髮及治諸般眼疾

麝香礬雄散　治大人小兒牙齒動搖斷齶宣露骨槽風毒宣蝕潰爛不能下食

麝香　龍骨　膽礬

雄黃

右為細末每用壹字鵝毛蘸藥掃患處又[illegible]叁錢以水柒分煎至伍分熱呷滿口[illegible]去或每日揩牙溫水漱之

熟銅末散　治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末壹兩　當歸　細辛

地骨皮　防風各貳錢半

右為細末研如粉每用塗藥在患處以蠟紙封之日夜貳叁度叁伍日牢定壹月忌嚼硬物

露蜂房散　治牙齒不生及齒風痛

露蜂房炙　荊芥　川椒去目及合口者炒出汗

地骨皮　松節

青鹽　白礬枯各壹兩

右為細末每用半錢綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散　治牙齒不生齒風宣露

川升麻　白附子炮各壹兩

右為細末研勻於捌月內取生地黃肆斤洗去土絞取汁貳大盞即下藥攪令勻放磁器中每用以柳枝綿裹壹頭點藥炙令熱烙齒根下縫中更塗藥少許即驗

唇

濟陰地黃丸　治陰虛火燥唇裂如繭

五味子　熟地黃自製杵膏　麥門冬

當歸　肉蓯蓉　山茱萸去核

乾山藥　枸杞子　甘州菊花

巴戟肉各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服捌拾丸空心食前白湯送下

柴胡清肝散

柴胡　黃芩炒各壹錢　黃連炒

山梔炒各柒分　當歸壹錢　川芎陸分

生地黃壹錢　升麻捌分　牡丹皮壹錢

甘草叁分

右水煎服若脾胃弱去芩連加白朮茯苓

清胃散見牙齒

補中益氣湯見勞倦　歸脾湯見健忘

羌活散

羌活　茯苓　薏苡仁各等分

右每服叁伍錢水煎入竹瀝壹匙服

瀉黃飲子　治風熱在於脾經脣燥裂無色

白芷　升麻　枳殼麩炒

黃芩　防風各壹錢半　半夏湯泡柒次壹錢

石斛壹錢貳分　甘草柒分

水貳鍾薑叁片煎捌分食後服

五福化毒丹　治脣舌腫破生瘡煩渴

玄參焙　桔梗各貳兩　人參半兩

茯苓壹兩半　馬牙硝風化　青黛各壹兩

麝香壹字　甘草柒錢半焙

右為細末研勻煉蜜為丸如皁角子大以金銀箔各肆拾片為衣每服壹貳丸薄荷湯化下如口臭以生地黃汁化下食遠服

白燈散　治緊脣

右纏白布作大燈炷如指安斧刃燃熱令刃汗出拭取傳脣上日叁貳度

獨活散　治脣上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活　升麻　桑寄生

犀角屑　沉香　連翹

漢防巳　大黃炒各半錢　炙甘草半兩

每服叁錢水壹中盞煎至陸分去查不拘時溫服

升麻飲　治脾胃有熱風冷相乘脣腫生核疼痛

升麻　前胡　犀角鎊

薏苡仁　炙甘草各半兩　葛根

龍膽草　青竹皮各貳錢半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至捌分去滓食後服

生地黃煎　治脾熱脣焦枯無潤澤

生地黃汁　生天門冬汁各半斤

生麥門冬去心　萎蕤各貳兩　黃芪

升麻貳兩半　細辛　川芎

白术　甘草生用各壹兩

右細剉綿裹酒浸壹宿以猪脂貳斤煎至滓色焦綿濾去滓內鍋中後下地黃天門冬汁

熬令稠磁器盛每服半匙不拘時含嚥下

治脣生腫核方

松脂　大黃　白斂

赤小荳　胡粉各等分

右爲末以雞子清調傅

黃蘗散　治繭脣

黃蘗壹兩　五倍子貳錢　蜜陀僧

甘草各壹錢

右除黃蘗外餘藥爲末用水調傅於蘗上火

炙叁伍次將蘗切成片子臨睡貼之天明即

愈

舌

小續命湯見中風

升麻散濟生治熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻　赤芍藥　人參

桔梗　乾葛　甘草

右㕮咀薑煎溫服壹方有黃連大黃黃芩玄

參麥門冬

碧雪和劑治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝　青黛　寒水石

石膏煅各水飛研　朴硝　硝石

馬牙硝各等分

甘草煎湯貳升入諸藥再煎用柳枝不住攪

令熔方入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜

研末每用少許以津含化如喉閉以竹管吹

入喉中

本事方虛壅上攻口舌生瘡

草烏壹箇　南星壹箇　生薑壹塊

爲末臨臥醋調作掩子貼手腳心

三黄丸 見發熱
龍石散 三因 治上膈蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛
寒水石 煅叁兩 硃砂 貳錢半另研 龍腦 半字
爲末少許摻患處小兒疹毒攻口用五福化毒丹後用此
清熱補氣湯 治中氣虛熱口舌如無皮狀或發熱作渴
人參 白朮 茯苓
當歸 酒洗 芍藥 炒各壹錢 升麻

五味子 麥門冬 玄參
炙甘草 各伍分
右水煎服如不應加炮薑更不應加附子
清熱補血湯 治口舌生瘡體倦少食日晡益甚或目澀熱痛
當歸 酒洗 川芎 芍藥
熟地 酒洗各壹錢 玄參 柒分 知母
五味子 黄蘗 麥門冬 去心
柴胡 牡丹皮 各伍分

右水煎服如不應用補中益氣湯加五味治之
六味丸 八味丸 俱見虛勞
涼膈散 見發熱
加味歸脾湯 即本方加當歸柴胡山梔丹皮 見健忘
玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰兩項腫痛
玄參 升麻 犀角
赤芍藥 桔梗 貫衆

黄芩 甘草 各等分
右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓不拘時服
清熱化痰湯 治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛
貝母 天花粉 枳實 炒
桔梗 各壹錢 黄芩 黄連 各壹錢貳分
玄參 升麻 各柒分 甘草 伍分
右水煎服

小柴胡湯見往來寒熱　八珍湯見虛勞

舌腫病 金沸草散　世醫用此發散傷寒傷風及加杏仁五味子治欬嗽皆効獨未知用之舌腫牙疼辛未年有人患舌腫滿塞粥藥不入其勢危甚煎此壹劑乘熱以紙籠氣熏之遂愈方見咳嗽

黃蘗湯　治舌腫及重舌

黃蘗　炙甘草各壹兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服

木舌 馬牙硝丸

馬牙硝研末　鉛白霜　太陰玄精石

寒水石　麝香細研　大黃炒各半兩

枯白礬壹錢貳分　炙甘草貳錢半

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含壹丸嚥津

牛黃散　治舌腫强

牛黃研　漢防己各柒錢半　犀角屑貳錢半

羚羊角屑　人參　桂心

牛蒡子炒　生地黃　炙甘草各半兩

右為細末研勻每服叁錢水壹中盞煎至陸分不拘時連滓溫服

玄參散

玄參　升麻　大黃

犀角屑各叁錢半　甘草壹兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞煎至伍分去滓不拘時溫服

飛礬散

白礬飛　百草霜各等分

右研細末捻糟茄自然汁調若口噤挑灌之妙

䘌蟲散

䘌蟲炙伍枚　鹽半兩

右研細末以水貳盞煎拾沸去滓熱含吐去以瘥為度

百草霜散　治舌腫起如猪胞方忽然腫……

廼塞悶殺人

右用釜下墨末以醋調厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決去血汁更傅之尤佳一方釜下墨和鹽等分瀝清水塗腫處令徧表裏良久即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調塗下黑鹽成膏傅舌上立愈

重舌 烏犀膏 見咽喉

牛黃散 治重舌

牛黃研 人參 大黃炒

麝香研 炙甘草各半兩 丹砂研

當歸切焙各貳錢半 白茯苓去皮各壹錢半

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至壹錢

舌強 礬石散 治風濕寒舌強不能語

枯礬 桂心各等分

右為末每服壹錢安舌下

舌瘡 甘露飲 治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉 石斛 黃芩

麥門冬去心 生地黃 炙甘草各等分

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎捌分去滓不拘時溫服

括蔞根散 治風熱口中乾燥舌裂生瘡

括蔞根 胡黃連 黃芩各壹錢半

白殭蠶炒 白鮮皮 大黃生用各半兩

牛黃研 滑石研各貳錢半

右為細末研勻每服貳錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸 解藥毒退風熱治口舌乾燥

寒水石貳斤燒令赤攤於地上一宿出火毒 馬牙硝參兩細研

鉛霜細研 龍腦細研 甘草炙末各壹錢半

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

蘆薈散 治口舌生瘡

蘆薈 青黛研 蟾酥

羊蹄花各半兩 白礬煅研 麝香研

牛黃研各壹錢壹分 乾蝸牛研炙枚 瓜蒂貳拾个

丁香 細辛去苗 丹砂研各貳錢半
馬牙硝研柒錢半 熊膽研壹錢
右爲細末研勻先以頭髮褁指於温水内蘸揩之輭帛拭却臙脂水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈看病大小以意加減用之

玄參散 治口舌生瘡連齒齗爛痛
玄參 升麻 獨活
麥門冬去心 黄芩 黄蘗

大黄 梔子仁 前胡
犀角 炙甘草各等分
右爲末每服伍錢水壹盞煎伍分不拘時温服

綠雲散 治舌上生瘡
銅綠 鉛白霜各等分
右同研極細每用少許摻舌上
玉鑰丹見諸逆衝上 理中湯見霍亂

舌縱 神龜滋陰丸 治足痿

龜板炙肆兩 知母酒炒 黄蘗炒各貳兩
瑣陽酒洗 枸杞子 五味子各壹兩
乾薑炮半兩
右爲末滴水丸如桐子大每服柒拾丸空心鹽湯下

通天愈風湯
白朮壹錢半 桔梗壹錢 人參
南星湯泡 貝母去心各 威靈仙
連翹 防風去蘆 甘草

荊芥穗各伍分 栝蔞仁伍粒 生薑叁片
水壹鍾半煎柒分去査入荊瀝[illegible]薑汁三少半鐘時服吞下清心導痰丸伍拾粒日壹服

清心導痰丸
白附子壹兩 南星薑製 半夏各薑汁製貳兩
黄連柒錢半 天花粉壹兩 白殭蠶炒去絲嘴半兩
川烏炮去皮臍貳錢 鬱金柒錢半 天麻
羌活各半兩

右爲末薑汁糊爲丸如桐子大每服伍拾丸
用通天愈風湯吞下

清心牛黃丸

膽星壹兩　牛黃貳錢　黃連壹兩
當歸身　甘草　辰砂各半兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服伍拾丸
臨卧時唾津嚥下

面

升麻加黃連湯

升麻　葛根各壹錢　白芷柒分
甘草炙伍分　白芍藥伍分　酒黃連肆分
生犀末叁分　川芎叁分　荊芥穗叁分
薄荷叁分

右剉如麻豆大用水半盞先浸川芎荊芥薄
荷外都作壹服水貳盞煎至壹盞入先浸叁
味煎至柒分去查食後温服忌酒濕麪五辛

升麻加附子湯

升麻　葛根　白芷
黃芪各柒分　甘草炙伍分　黑附子炮柒分
人參　草豆蔻各伍分　益智仁叁分

右剉如麻豆大都作壹服水叁盞連鬚白葱
頭貳莖同煎至壹盞去查温服食前

茯苓桂枝五味子甘草湯見喘

調胃承氣湯見發熱　附子理中丸

巴戟丸俱見惡寒

沖和順氣湯

升麻壹錢 葛根壹錢半 甘草肆分

芍藥叁分 白芷壹錢 黃芪捌分

防風壹錢 人參柒分 蒼朮叁分

右件㕮咀都作壹服水貳盞薑叁片棗貳枚同煎至壹盞去查溫服

犀角升麻湯 治風熱頭面腫痛或咽喉不利時毒等證

犀角鎊末錢 升麻伍錢 防風

羌活各伍錢半 白芷 黃芩

白附子各貳錢半 甘草壹錢伍分

右每服柒錢水煎

治面上肺風瘡

右用無灰酒於沙碗鉢內濃磨鹿角尖傳之兼服治腎臟風黃耆丸即愈見耳痒

硫黃膏 治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺百藥不効者惟此藥可治妙不可言每臨卧時洗面令淨以少許如面油用之近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤亦消風刺粉刺一夕見効

生硫黃 香白芷 括蔞根

膩粉各半錢 芫青柒箇去翅足 全蠍壹箇

蟬退伍箇洗去泥

右為末麻油黃蠟約度如合面油多少熬熔取下離火入諸藥在內如法塗之一方加雄黃蛇牀子各少許

柏連散 治面上有熱毒惡瘡

胡粉炒 大柏炙 黃連

右等分為末面脂調傳豬脂亦可

洗面藥方治面有䵟點或生瘡及粉刺之類并去皮膚瘙痒垢膩潤澤肌膚

皂角叁斤去皮弦子另搗 糯米壹升貳合

菉荳捌合揀淨另搗 楮實子伍兩 三柰子

縮砂半兩連皮 白芨貳兩肥者 甘松柒錢

升麻半兩 白丁香收須細研半兩

右柒味同為細末記和菉荳糯米粉及皂角

末壹處攪勻用之効

面油摩風膏

麻黄貳分　升麻根貳錢去皮　羌活去皮壹兩

防風貳錢　當歸身壹錢　白芨壹錢

白檀伍分

右以綿裹定煎藥於銀石器中用油伍兩同熬得所澄清去查以黄蠟壹兩再煎熬爲度

瑩肌如玉散

白丁香壹兩　香白芷壹錢　升麻半兩

白芨壹兩　麻黄去節貳錢　白牽牛壹兩

當歸梢半兩　白附子半錢　白蒺藜壹兩

楮實子肆錢　白茯苓伍錢　連翹壹錢半

白斂壹兩　小椒壹兩

右爲細末每用半錢多少洗之

咽喉

甘桔湯和劑治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有礙

苦桔梗壹兩　炙甘草貳兩

每服伍錢水壹盞煎柒分食後温服

荆芥湯治因咳咽腫痛語聲不出嚥之痛甚

荆芥半兩　桔梗貳兩　甘草壹兩

右剉散每服肆錢水壹盞生薑叁片煎陸分去查温服

甘露飲見前

半夏桂枝甘草湯活人治暴寒中人咽痛

半夏　桂枝　甘草各貳錢半

水貳盞生薑伍片煎至捌分去滓旋旋呷之

解毒雄黄丸和劑治纏喉風及急喉痺卒然倒仆牙關緊急不省人事

雄黄研飛　鬱金各壹兩　巴豆去皮出油

右爲細末醋煮麪糊爲丸如菉豆大熱茶清下柒丸吐出頑涎立甦未吐再服如牙

心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙斡開口
灌之下咽無有不活如小兒驚熱痰涎壅塞
或貳丸叁丸量大小加減一法用雄黃丸叁
粒醋磨化灌之尤妙其痰立出即瘥

小續命湯 見中風

玉鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風

焰硝 壹兩半　硼砂 半兩　腦子 壹字
白殭蠶 貳錢伍分

右為末以竹管吹半錢入喉中立愈

玉屑無憂散 和劑 治纏喉風咽喉疼痛語聲不出
嚥物有礙或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癥
小兒奶癖或悮吞骨屑哽塞不下

玄參 去蘆　貫衆 去蘆　滑石 研
砂仁　黃連 去鬚　甘草 炙
茯苓　山豆根　荊芥穗 各半兩
寒水石 煆　硼砂 各叁錢

右為細末每服壹錢乾摻舌上以清水嚥下
此藥除叁尸去捌邪辟瘟療渴

清心利膈湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風　荊芥　薄荷
桔梗　黃芩　黃連 各壹錢半
山梔　連翹　玄參
大黃　朴硝　牛蒡子 炒研
甘草 各柒分

水貳鍾煎至壹鍾食遠服

碧玉散 寶鑑 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水
漿不下或喉痺重舌木舌腫脹皆可服

青黛　盆硝　蒲黃
甘草 各等分

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細
嚥下若作丸用砂糖為丸每兩作伍拾丸每
服壹丸噙化嚥下

防風散 治咽喉疼痛虛者用少實者用多

防風 去蘆壹兩　羌活　殭蠶 炒
白藥子 [illegible]　硼砂　荊芥
黃藥子　大黃 [illegible]

細辛　川芎　紅内消
山荳根　鬱金　甘草各半兩
牙硝叁錢　薄荷半斤
右為細末研薄荷汁同蜜少許調每服壹匙
不拘時服
退風散　治咽喉腫痛
黃丹　朴硝　猪牙皂角煅
砂仁殼燒灰各半兩
右為細末每用少許以鵝毛蘸藥入口中傅

舌上下及腫處然後以温水漱如咽喉間
毒已破瘡口痛者用猪腦髓蒸熟淡薑醋蘸
喫下立効
開關散寶鑑　治喉風氣息不通
白殭蠶炒去絲嘴　枯白礬各等分
右為細末每服叁錢生薑蜜水調下細細服
之
七寶散　治喉閉及纏喉風
殭蠶直者拾箇　硼砂　雄黃

全蝎拾箇頭尾全者去毒　明礬
猪牙皂角壹挺去皮弦各壹錢　膽礬半錢
右為細末每用壹字吹入喉中即愈
千緡湯見痰飲　四物湯見虛勞
五香散　治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜
服之
木香　沉香　雞舌香
熏陸香各壹兩　麝香叁分
右為細末研勻每服貳錢水壹盞煎伍分不

拘時服
瓜蒂散　治纏喉風咽中如束氣不通
右用甜瓜蒂不限多少細研為末壯年壹字
拾伍歲已上及年老者服半字早晨用井花
水調下壹時頃含砂糖壹塊良久涎如水出
年深者涎盡有壹塊如涎布水上如鑑涎盡
食粥壹兩日如吐多困甚即嚥麝香湯壹盞
麝香須細研以温水調下此藥不大吐逆只
吐涎水右瓜蒂須採自然落者用如未可

檳榔葉裹於東牆有風處挂令吹乾用
烏犀膏 必用 治咽喉腫痛及一切結喉爛喉遁尸
纏喉痺喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證
皁莢 兩條子捶碎用水叁升浸壹時久援汁去查入瓦器內熬成膏
好酒 壹合　焰硝　百草霜 研壹錢同皁角
膏攪勻冷調　人參 壹錢為末　硼砂
白霜梅 研入膏中各少許並
右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡
頑涎為度却嚼甘草貳寸嚥汁吞津若木舌
先以麤布蘸水揩舌冷次用生薑片擦之然

後用藥
備急如聖散 寶鑑 治時氣纏喉風漸入咽喉閉塞
水穀不下牙關緊急不省人事
雄黃 細研　藜蘆 厚者去皮用仁　白礬 飛
猪牙皁角 去皮弦
右等分為細末每用壹豆大鼻內嗃之立効
壹字散 必用 治喉閉氣塞不通飲食不下
雄黃 另研　白礬 生研　藜蘆 各壹錢

猪牙皁角 壹錢　蝎梢 柒枚
右為末每用壹字吹入鼻中卽時吐出頑涎
愈
王粉丸 見痛
咽痛 三黃丸 見發熱
龍腦聚聖丹 寶鑑下同 治心脾客熱毒氣攻衝咽
喉赤腫疼痛或成喉痺或結硬不消愈而復
發經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡飲食難
嚥並宜服之

南硼砂 研　川芎 各壹兩　生地黃
犀角屑　羚羊角屑　琥珀 研
玄參　桔梗　升麻
鉛白霜 研　連翹 各伍錢　赤茯苓
馬牙硝　腦子 研　人參
麝香 各叁錢　硃砂 飛　牛黃 各研貳錢
右為細末煉蜜為丸每兩作拾丸用金箔伍
拾片為衣每服壹丸薄荷湯或新汲水化下
或細嚼或噙化津液嚥下皆可食後臨臥服

祛毒牛黃丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本强硬滿口生瘡涎潮喘急飲食難進胸膈不利

牛黃研叁錢半 人參 琥珀研

犀角取細末 桔梗 生地黃瓦木者佳

硼砂各半兩 雄黃壹兩水飛 玄參

升麻各叁錢 蛤粉水飛肆兩 寒水石煅貳兩

硃砂研柒錢 鉛白霜 腦子各壹錢

右為細末煉蜜丸如彈子大金箔為衣磁器內收每服壹丸薄荷湯化下或新汲水化服亦得食後日進貳叁服噙化亦得

咽喉備急丹

青黛 芒硝 白殭蠶各壹兩

甘草肆兩

右為細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中蔭肆拾玖日多時為妙

增損如聖湯寶鑑 治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛

桔梗貳兩 炙甘草壹兩半 枳殻湯浸去穰貳錢半

防風半兩

右為細末每服叁錢水壹大盞煎至柒分去查入酥如棗許攪勻食後溫服

利膈湯本事 治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉 荊芥 防風

桔梗 人參 牛蒡子隔紙炒

甘草各壹兩

右為細末每服壹錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加殭蠶壹兩

桔梗湯東垣 治咽腫微覺痛聲破季冬合之

麻黃伍分去節 桔梗壹錢 黃芩叁錢

甘草壹錢 白殭蠶叁錢 馬屁勃壹兩

桂枝少許 當歸身叁分

水貳盞煎去查稍熱服食後徐徐呷之

金沸草散 辰砂化痰丸俱見咳嗽

發聲散寶鑑 治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜用寒涼藥過泄之此妨悶明熱也

栝蔞壹箇 白殭蠶微炒半兩 桔梗新白者柒錢半炒

甘草炒貳錢

右為末每用少許乾摻咽喉中若大腫痛左右有紅或只壹壁紅紫長大而水米不下用此藥壹錢朴硝壹錢匕和勻乾摻喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥壹錢匕白礬半錢細研如粉和勻乾摻之

碧雲散

白礬明淨壹錢　巴荳肆粒去殼

右以白礬為末瓦上化開入巴荳在礬內候

礬乾為度細研分作肆服每壹字以竹管吹入咽中涎出為効又方用青礬

雞蘇丸見吐血　辰砂五苓散見消癉

聖惠羅青散 備竹 治單雙乳蛾

蒲黃伍錢　羅青　盆硝研各叁錢

甘草貳錢

右為細末每服壹錢冷蜜水調細細嚥之添不下雞翎蘸藥喉內掃之立効

粉香散　見乳蛾部開

白礬叁錢　巴豆叁粒去皮油　輕粉

麝香各少許

右於鐵器上熬礬令沸入巴豆在礬內候枯去巴豆不用將礬研末入粉麝吹喉中

乾薑散 三因 治懸癰熱卒暴腫大

乾薑　半夏湯洗去滑等分

右為細末以少許著舌上嚥津

玄參散 本事 治懸癰痛不下食

玄參壹兩　升麻　射干

大黃各半兩　甘草貳錢半

右為細末用水煎至柒分放溫時時含嚥良驗

射干丸 治懸癰腫痛咽喉不利

射干　炙甘草

杏仁湯洗去皮尖及雙仁麩炒微黃各半兩　川升麻

川大黃微炒　木鼈子各貳錢半

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含壹丸嚥津

燒鹽散　治喉中懸癰垂長咽中妨悶

燒鹽　枯礬研細各等分和勻以筯頭點之即消

馬牙硝散　治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣上衝

馬牙硝細研每服壹錢綿裹含嚥津以通爲度

射干散　治懸癰腫痛咽喉不利胸中煩熱

射干　天竺黃研　馬牙硝研各壹兩

犀角屑　玄參　川升麻

白礬　白藥　黃藥

炙甘草各半兩

右爲細末研勻煉蜜和擣叁貳百杵丸如小彈子大不拘時以綿裹壹丸含嚥津

硼砂散　治懸癰腫痛

硼砂研　馬牙硝　滑石

寒水石各貳錢　片腦研半錢　白礬[illegible]

右爲細末每用半錢不拘時新汲水[illegible]

啓關散　治風熱客搏上焦懸癰腫痛

惡實炒　甘草生用各壹兩

右爲細末每服貳錢七水壹盞煎陸分旋含之良久嚥下

咽喉生瘡

黃芪散　治咽喉生瘡疼痛

黃芪　檳榔　紫菀洗去土

牛蒡子　梔子仁　赤茯苓

甘草生用各半兩　麥門冬去心　玄參各壹兩

川升麻　黃芩各叁錢

右剉碎每服壹錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

桃紅散　治喉中生瘡腫赤紫色咽嗌痛嚥物有妨

金箔拾片　銀箔拾片　鉛白霜少許

寒水石貳兩　大陰玄精石貳兩貳味搗碎入壹盒子內火煆令通赤取出埋地土內出火毒研細

丹砂研　甘草炙爲末各壹兩　馬牙硝研

右爲細末研勻每服壹字甘草水調下或以

稀糯米粥丸如豌豆大含化嚥津

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌

真琥珀研 犀角屑生用 人參去蘆各壹錢

酸棗仁去皮研 茯神去皮木 辰砂研各貳錢

片腦壹字研

右為細末研勻煉蜜和為膏以磁器收貯候其疾作每服壹彈子大以麥門冬去心濃煎湯化下壹日連進伍服

救命散 治脾胃熱毒上攻咽喉有瘡并纏喉風

膩粉叁錢匕 五倍子貳錢半 大黃錢炒

白殭蠶直者炒 黃連 生甘草各半兩

右為細末每服壹字大人以竹筒吸之小兒以竹筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用男孩兒妳汁調藥壹字以雞翎探之嘔者生不嘔者死

牛蒡子丸 治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛

牛蒡子壹兩微炒 川升麻 黃藥子

乾浮萍草 玄參 甘草生用各半兩

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含壹丸嚥津

硼砂散 治心脾風熱所發咽喉生瘡腫痛或子舌脹或木舌重舌腫悶塞水漿不下

硼砂研叁兩 薄荷葉 蒲黃各壹兩

寒水石燒過研貳兩半 貫衆

玄參 青黛研 白茯苓去皮

縮砂仁 滑石研 荊芥穗

山豆根 甘草生用各半兩

右為細末研勻每服半錢不拘時用新汲水調下或諸舌脹摻在舌上嚥津

咽中如核 半夏厚朴湯 即四七湯見氣門

射干散 治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛嚥物不下

射干 桔梗 川升麻

犀角屑各叁錢 木香 木通剉各半兩

紫蘇子炒 訶黎勒去核 檳榔

枳殼去穰麩炒 赤茯苓 炙甘草各壹兩
右㕮細每服叁錢水壹盞煎至捌分去滓不
拘時温服
含化龍腦丸 治咽喉中有物如彈丸日數深
遠津液難嚥作渴疼痛即須深針腫結處散
盡毒氣
龍腦研 麝香研各貳錢半 川升麻
馬牙硝 鍾乳粉 黄芪各壹兩
川大黄微炒 炙甘草各半兩 生地黄伍兩取汁和藥

右為細末研勻以地黄汁更入煉蜜和丸如
彈子大不拘時以綿裹壹丸含化嚥津以咽
喉通利為度
木香散 治咽喉中如有物噎塞吞不能入吐
不能出
木香半兩 紫雪 射干
羚羊角屑 犀角屑 檳榔各壹兩
玄參 桑根白皮 川升麻各壹兩半
右㕮碎每服叁錢水壹盞煎至陸分去

拘時温服
絡石湯 治咽喉中如有物噎塞
絡石即石薜荔 紫菀去苗土 升麻
射干各壹錢半 木通 赤茯苓去黑皮
桔梗炒各壹兩
右㕮碎每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去
滓食後温服如要通利及湯成加芒硝末壹
錢七攪勻服之
四味湯 治咽喉中如有物嚥吐不利

半夏以生薑汁浸壹宿湯洗切 厚朴刮去粗皮以生薑汁炙黄
陳橘皮以湯浸去白各壹兩 赤茯苓刮去黑皮貳兩
右㕮碎每服叁錢七水壹盞入生薑壹棗大
拍碎煎至陸分去查食遠温服
杏仁煎丸 治咽喉食即噎塞如有物不下
杏仁湯浸去皮尖及雙仁炒半兩 官桂去粗皮
枇杷葉拭去毛炙 人參各壹兩
右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服壹丸含
化嚥津以瘥為度

皮膚

桑皮飲　治皮膚痛不可以手按

桑白皮貳錢　乾葛　柴胡

枯黃芩　玄參各壹錢　地骨皮

天門冬　麥門冬各壹錢半　甘草

木通各肆分

右水貳盞薑叁片葱二寸煎捌分食遠服取微汗

潤膚膏　治皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓　真酥油各等分

右貳味合煉壹處以淨磁器貯之每日空心用叁匙熱酒調服蜜湯亦可久服滋陰養血止嗽榮筋

大黃䗪蟲丸見虛勞

葦莖湯　當於瘍科求之

鬚髮

張天師草還丹海藏　此上少陰下厥陰藥也

地骨皮　生地黃　菟絲子酒浸炒黃

牛膝　遠志去心　石菖蒲各等分

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸空心溫酒下鹽湯亦可偏合忌女人雞犬見

七寶美髯丹　補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白各壹斤[illegible]以竹刀刮去皮米泔水浸一宿切作大片用黑豆[illegible]甑中壹層　川牛膝捌兩

排鋪首烏壹層再鋪豆壹層重重相間豆上鋪膝壹層又以豆壹層重重相間豆上鋪之以豆熟爲度取去豆曬乾次日如前用生豆再蒸如法蒸九次曬乾次去豆用

破故紙半斤以水洗淨用黑芝麻同炒無聲爲度去芝麻

白茯苓半斤用人乳拌浸透曬乾蒸過

赤茯苓半斤用黑牛乳浸透曬乾蒸過

菟絲子半斤酒浸壹宿洗去砂土曬乾蒸叁次曬叁次

當歸身半斤淨身去頭尾酒洗過

枸杞子半斤去蒂枯者

右末之煉蜜丸如龍眼大每日空心嚼貳叁丸溫酒下或米湯白湯鹽湯皆可製不犯鐵器

主精升　北方黑色入通于腎開竅於貳陰藏
精於腎其味鹹其類水其病在骨此藥主之
血餘自己髮及父子壹本者及少壯男女
髮揀去黃白色者用灰湯洗二三次再以
大皂角肆兩搥碎煮水洗淨務期無油氣
為佳將髮扯碎曬乾每淨髮壹斤用川椒
肆兩揀去梗核於大鍋內髮壹層椒壹層
和勻以中鍋蓋之鹽泥固濟勿令泄氣桑
柴慢火煅叁炷香退火待冷取出約重肆

兩有餘於無風處研為細末
何首烏用黑豆玖蒸玖曬揀去皮取淨末壹斤　破故紙炒取淨末肆兩
黑脂麻玖蒸玖曬淨取細末肆兩　熟地黃同上製肆兩
生地黃揀肥大者酒浸洗淨曬乾肆兩　女貞實肆兩
桑椹取淨汁熬膏肆兩　胡桃肉研膏貳兩
旱蓮草取淨汁熬膏肆兩
膠棗肉蒸熟貳兩　枸杞子人乳浸百日曬乾
右以藥末入諸膏和勻加煉蜜壹斤成劑
石臼內舂千餘下如梧子大每服[illegible]

心用何首烏釀酒每溫貳叁杯送下日叁
青絲散烏鬚補虛牢牙黑髭鬚
香白芷　白茯苓各伍錢　母丁香
細辛　當歸　川芎
甘草　甘松各叁錢　升麻
旱蓮草　地骨皮　生地黃
熟地黃　青鹽　破故紙各貳錢
寒水石生鍛壹錢　香附米壹兩生薑汁浸壹宿炒
何首烏壹兩　麝香伍分　高茶末

為末庚日為始背東面西擦牙早不見日夜
不見燈刷畢嚥藥餘津潤髭壹月頓黑忌食蘿蔔
擦牙方
陸月陸日取槐枝刀剉碎如黃豆粗用壹斗
著東流水壹桶煮至伍分撈去槐枝又煎至
叁分用食鹽叁斤入鍋炒乾取出研細用黑
鉛壹斤鍋煅成灰與前鹽羅成末再入鍋炒
如磚色每日擦牙取漱口水通著打肆將并
髮令自乾日久去頭風固齒去酒刺[illegible]

擦牙烏鬚方

猪牙皂角 未錢炒 白茯苓 去皮

破故紙 熟地黃 酒浸焙 五倍子 製

青鹽 細辛 去根土各叁錢 桑椹子 晒乾伍錢

右為細末每清晨擦牙用水漱口洗鬚鬢不可將漱水入盆內恐傷眼目

易便擦牙方

用五倍子大者壹百箇 入食鹽壹斤鋪在鍋內大火燒過存性為末 每日擦之

髭髮 門 類六八 百五

丁砂散 染髭 掠髭髮

大訶子 壹箇 母丁香 拾伍箇 百藥煎 壹錢

針砂 少許醋炒 高茶末

右為細末用水壹大椀熬數沸不去滓收於淨磁器內每夜臨卧溫漿洗淨髭髮用藥水掠之次早再用溫漿水淨洗百日其髭髮自黑藥用更浸壹新釘尤妙

訶子散 染髭

訶子 兩箇大核 没食子 百藥煎 [illegible]

[illegible]針砂[illegible]

右將藥細入針砂打糊先壹夜將針砂糊抹在頭上用荷葉包到天明溫漿水洗淨次夜却將前藥末碎末調入針砂糊內用生薑壹塊搗碎再加些少輕粉壹處調勻抹在頭上仍用荷葉包到天明用溫漿水加清油數點在內洗淨其髮黑且光

製五倍子法

揀大五倍子去蛀屑 作碎粒分麤細為貳

髭髮 門 類六八 百六

先將麤片於瓦器中內用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑煙起取出不住手炒將冷又上火炒昏黃煙起又取開炒再上火炒青黃煙閉出即住火先以真青布壹大片浸濕將五倍子傾在布上捏成壹團用脚踏成餅上用濕泥壹撮蓋宿壹夜色如烏鵲羽為妙磁器盛之勿令泄氣

又烏鬚方

製五倍子 壹錢 膽礬 白礬 各柒錢

鹽壹分 [illegible] 榆皮麪貳分
右俱研細末茶清調如稀糊隔湯頓稠黄昏
乘熱刷上待有壹箇更次洗去
又方
金鈴壹錢 青錠粉柒分 海沙壹分
樟腦半分
右和勻茶滷調搽髭髮[illegible]香壹炷完即洗
去以油潤之
點白方

每日拔去白鬚[illegible]香點丁香末和薑汁
在根孔内則再生[illegible]鬚
又方
銀礦 當歸各叁錢 白礬生
飛麪 眞粉各壹分 朱砂壹分半
右用清水調拔去白鬚點如前
浸油
銀礦[illegible] 當歸叁兩 核桃油[illegible]
右末浸磁礶内[illegible]日後搽

烏雲散
五倍子炒 百藥煎 生胡桃皮
青石榴皮 訶子肉 青木瓜皮
青柿子皮 何首烏 猪牙皁角炒黑
青礬 細辛 水銀各等分
右以水銀入石榴皮内月餘再以榴皮曬乾
同諸藥研末煉蜜丸如小錢大常於木炭灰
内培養勿得離灰如要[illegible]髮時先用皁角
水洗淨次用熱酒調[illegible]好熱醋亦可

滋榮散[illegible]長養髭髮[illegible]宜
生薑焙乾 人參各壹兩
右爲細末每用生薑壹塊切片蘸藥末於髮
落處搽之貳日壹次
三聖膏[illegible]治髭髮脫落能令再生
黒附子 蔓荊子 柏子仁各半兩
右爲末烏雞脂和勻搗研乾置瓦盆内封閉
百日取出塗脫處叁伍日即生

腋氣

六物散 治漏腋腋下手掌足心陰下股裏常
如汗濕汚衣
乾枸杞根 乾薔薇根 甘草各貳兩
胡粉 商陸根 滑石各壹兩
右爲末以苦酒少許和塗當微汗出易衣更
塗之不過叄著便愈或壹歲復發又塗之

治陰汗騷臭兩腋下臭不可與人同行
白礬 蜜陀僧 黃丹各貳錢半
麝香伍分
右於乳鉢內研如飛塵以醋於手心內調藥
末搽腋下經兩時辰許却以香白芷煎湯洗
之壹日用壹次

治腋臭神効
蜜陀僧肆兩 白礬枯過貳兩 輕粉叄錢
右爲細末頻擦兩腋下擦至半月見効半年
全愈

又方
蜜陀僧壹兩 白礬壹錢 硇砂
麝香各少許
右爲細末先用皂角煎湯洗後傅上

又方
用白礬燒過不以多少臨睡時以紙襯卓上
伸手托壁柱上以東之指一撮下十分熱痛
兩腋揩徧先於日中將所著上截衣服用灰
汁淨洗又泡去衣袖中臭氣皆無氣息如新
衣方可著若洗氣息不斷枉用其藥大緊藥

無不驗多是衣服再作氣故不能斷根一方
用燒好礬石末絹袋盛常以粉腋下不過十
度一方唾調塗之

治腋氣方
右用熱蒸餅壹枚擘作兩片摻蜜陀僧細末
壹錢許急挾在腋下畧睡少時候冷棄之如
壹腋有病只用一半葉元方平生苦此疾求
紹興間得此方用壹次遂絕根本

又方

撏去腋下毛以甘遂半兩為末用猪肉兩片薄批開將甘遂摻肉上午後貼放兩腋下候明日五更濃煎甘草半兩為湯壹碗服之良久瀉出穢物即痊

又方　治腋氣先用刀削去腋毛淨用白定粉水調搽傅患處至過陸柒日夜後次日早看腋下有壹黑點如針孔大用筆點定即用艾炷灸柒枚灸過攻心中痛當用後藥下之

青木香　檳榔　丁香

檀香　麝香　大黃

右煎服以下為度

蠱毒

解毒丸　治男子婦人及小兒一切積熱不解停留作毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴伏暑困悶霍亂不寧或山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏困不省人事虛煩發躁赤目口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常服補真益氣化毒除風神效不可細述

滑石　黃芩　貫衆

茯苓　山梔子　乾薑

草龍膽　大豆　青黛

甘草　薄荷　寒水石　各壹兩

益智仁　砂仁　大黃

山豆根　生地黃　桔梗

百藥煎　紫河車即蚤休　菉豆粉

馬屁勃　板藍根　黃藥子　各半兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服壹丸細

汲水化下細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦
人血暈不省生薑薄荷水磨下壹丸
又解毒丸　解世間不測一切毒
山豆根　山茨菰　菉豆粉各叁兩
板藍根　土馬椶　黄藥子
紫河車　續隨子仁　木通
盆硝　藿香　五味子
薄荷　貫衆　寒水石
白殭蠶　乾葛　雄黄

百藥煎各貳兩　茜草　大黄
朱砂各壹兩　麝香一兩　甘草臘月竹筒盛置糞清內候日開取陰乾爲末
右爲細末蒸餅和丸如彈子大以螺青叁兩
和勻留壹半爲衣每服半丸用生薑蜜水化
下
因解毒丸　治誤食毒草并百物毒救人於
必死
板藍根肆兩乾者淨洗　貫衆壹兩剉去土

青黛研　甘草生用各壹兩
右爲末煉蜜丸如桐子大以青黛另爲衣如
稍覺精神恍忽即是誤中諸毒急取拾伍丸
爛嚼用新水送下即解或用水浸蒸餅爲丸
尤佳常服叁伍丸大解暑熱
神仙解毒萬病丹一名玉樞丹一名紫金錠　治一切藥毒菰
子毒鼠莽毒惡菌蕈金石毒喫疫死牛馬肉
毒河豚毒時行瘟疫山嵐瘴瘧忽喉閉纏喉
風犯病黄腫赤眼瘡癤衝冒寒暑熱毒上攻

或自縊溺水打撲傷損癰疽發背未破魚臍
瘡腫湯火所傷百蟲鼠犬蛇傷男子婦人或
中顛邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之凡人居家
或出入不可無此藥眞濟世衞家之寶如毒
藥嶺南最多若通宦嶺表纔覺意思不快便
服之即安二廣山谷間有草曰胡蔓草又名
斷腸草若人以急水吞之急死緩水吞之緩
死又取毒蛇殺之以草覆上以水灑之數日
菌生其上取爲末酒調以毒人始亦無患再

俟行即毒發立死其俗淫婦人多自配合
與人情分相好多不肯逐北人回陝以藥
置食中北人還即戒之曰子某年來若從其
言即復以藥解之若過期不往必死矣名曰
定年藥北人屆彼亦宜誌之若覺中毒四大
不調即便服之或於雞豚魚羊鵝鴨等肉下
藥復食此物即觸發其毒急服此藥一粒或
吐或利隨服隨瘥昔有一女子久患勞瘵病
為屍蟲所噬磨一粒服之一時久吐下小蟲

千餘條一大者正為兩段後只服蘇合香丸
一半月遂復如常至牛馬六畜中毒亦以此救
之無不效

山茨菰 [illegible]

川文蛤 [illegible] 搥破洗

千金子 [illegible]

麝香 細研

紅芽大戟 杭州紫大戟為上江南土大戟次之去蘆根洗極淨焙乾 北方綿大戟色白者大峻利反能傷人弱人服有吐血者慎之

右各研為細末和勻以糯米粥為劑每料分
作肆拾粒於端午重陽七夕合如欲急用辰
日亦得於木臼中杵數百下不得令婦人孝
子不具足人雞犬之類見之切宜秘惜不可
廣傳輕之無効 如癰疽發背未破之時用
冷水磨塗痛處并磨服良久覺痒立消 陰
陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈壅滯邪毒

未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷
壹葉同研下 急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼
氣並用暖無灰酒下 自縊落水死心頭暖
者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下
蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處 諸般
瘧疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯磨下
小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷壹葉同
磨下 牙關緊急磨塗壹丸分作叁服量大
小與之 牙痛酒磨塗及含藥少許吞下

湯火傷東流水磨塗傷處　打撲傷損[illegible]
節無灰酒下　年深日近頭疼太陽穴[illegible]
入薄荷葉磨紙花貼太陽穴上　諸般[illegible]疾
口眼喎斜眼目攣眩言語蹇澁卒中風口噤
牙關緊急筋脉攣縮骨節風瘫手脚疼痛行
步艱辛一應風氣疼痛[illegible]用酒磨下有孕婦
人不可服[illegible]
保靈丹　治蠱毒諸疳一切[illegible]毒神効
朱砂[illegible]　大山[illegible]　[illegible]雄黃
黃丹　麝香　黃蘗子
續隨子（生用不去各貳錢半）　川巴豆（肥者取肉不去油貳錢半）
斑蝥（貳錢半去頭足）　糯米（半生半炒）
赤蜈蚣（貳條各全者炙）
右各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修
合不令雞犬婦人見用糯米稀糊丸如龍眼
核大陰乾磁合收每服一丸好茶清吞下不得
[illegible]破須臾病人自覺心頭如拽斷皮條聲[illegible]
次蠱下或自口出或大便出[illegible]是[illegible]

則成龍或蛇蝘諸雜帶命之物藥丸凝血並
下以水洗淨收可救終人如中毒口噤即挑
開下藥或蛇蝎兩汗諸毒以好醋磨傅患處
立解服藥已效如知毒害之家不必研究若
訴之其毒再發不救瘥後更忌酒肉毒食壹
月惟輭飯可也或急用但擇吉日精潔修合
青黛雄黃散　凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纔
作即服此令毒氣不聚
好青黛　雄黃（各等分）
右研細新汲水調下貳錢
歸魂散　凡初中蠱在膈上者當用此藥吐之
白礬　建茶（各壹兩）
右貳味為細末每服伍大錢新汲水調下頓
服一時久當吐毒出此藥入口其味甘甜並
不覺苦味者是也
雄朱丸　治蠱毒從酒食中著者端午日合
麝香（貳錢半別研）　雄黃　朱砂（俱另研水飛過）
赤脚蜈蚣（微炙去足）　續隨子（各壹兩）

右爲細末入雄黄朱砂麝香研勻以糯米煮
粥和丸如芡實大每服壹丸熱酒呑下毒當
與藥俱下

桔梗散

桔梗去蘆不以多少擇味苦者剉碎微炒

右爲細末每服叁錢米飲調服不拘時候此
藥不吐不利加之易爲衣買多服有益如服
吐利藥後日進兩叁服使毒氣日漸消散不
致再發動也

石刻方　治蠱毒無論年代遠近但煮壹鴨卵
插銀釵於内并噙之約壹食頃取視釵卵俱
黒即中毒也

五倍子貳兩　硫黄末壹錢　丁香
木香　麝香　輕粉各少許
糯米貳拾粒　甘草叁寸半生半炙

右用水拾分於瓶内煎柒分候藥面生皺皮
爲熟絹濾去滓通口服病人平正仰卧令頭
高覺腹中有物衝心者叁次即不得動若吐
以盆桶盛之如鱢魚之類乃是惡物吐罷飲
茶壹盞瀉亦無妨旋煮白粥補忌生冷油膩
鮓醬拾日後服解毒丸叁伍丸經旬平復

七寶丸　治蠱毒

敗鼓皮　蠶退紙各燒存性　刺蝟皮
五倍子　續隨子　朱砂研
雄黄研各等分

右爲細末糯米稀糊和丸如梧桐子大每服
柒丸空心用熱水送下

東坡雄黄丸　治蠱毒及蟲蛇畜獸毒

雄黄　明礬生用各等分

右於端午日合研細熔黄蠟和丸如梧桐子
大每服柒丸念藥王菩薩藥上菩薩柒徧白
湯送下

蜜髓煎　治中蠱毒令人腹内堅痛面目青黄
病變無常

蜜壹椀　猪骨髓伍兩研

右同煎令熟分作拾服日叁服即瘥

馬兜鈴根湯　治五種蠱毒及草蠱術在西京處及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者用馬兜鈴根壹兩細剉以水壹盞煎至柒分去滓空心頓服當時吐出蠱未吐再服以快為度一方以苗為末溫水調服一方用根搗末水服方寸匕

治諸蠱毒方

右用鱧魚乾末空心服之叁伍度瘥一方燒炙令香食之尤佳其魚有五色紋者良

鐵精丸　治食中有蠱毒腹内堅痛面目青黃瘦瘁淋露骨立病變無常

鐵精（乃服鐵爐中如塵紫色輕者為佳不拘多少）

右為細末以生雞肝搗和丸如梧桐子大曝乾每服伍丸柒丸溫酒下

治中蠱毒

右用山豆根不以多少密遣人和水研已禁聲服少許不止再服

槲皮散　治蠱毒下血如爛肉片心腹㽲痛如有物齧若不即治食人五藏乃死

槲木（北陰白皮）　桃根白皮（各肆兩並細剉）

蝟皮灰　亂髮灰（各壹兩）　火麻子汁（伍升）

右先以水伍盞煮槲皮桃根皮取濃汁貳盞和麻子汁每服煖汁壹盞調蝟皮灰髮灰貳錢匕令患人少食旦服須臾用水壹盞以雞翎引吐於水中如牛涎諸蠱並出

治中蠱毒下血如肝

萆麻子（壹粒去皮）　朴硝（壹錢）

右細研作壹服新汲水調下連作貳叁服効

地榆散　治蠱毒下血或腹痛或不痛百治不効煩瀉不止

臭榆根（東引根白皮富炙焙乾）　地榆（各半兩）

右為細末每服壹錢熱米飲調下

苦瓠湯　治蠱毒吐血或下血如爛肝

右用苦瓠壹枚切以水貳大盞煎取壹盞去滓空心分溫貳服吐下蠱即愈范汪方云苦瓠毒當臨時量用之肘後方云用苦酒壹升

煮令消飲之神驗一名苦葫蘆

療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未毀或鼻破待死者

右以桔梗搗屑以酒服方寸匕日叁服不能下藥者以物拗口開灌之心中當煩須臾自定服柒日止當猪肝臛以補之神良

茜根散 治蠱注下血如雞肝體熱心腹中煩悶

茜根 川升麻 犀角屑

地榆剉 黄芩 黄連炒各壹兩

右為散每服肆錢以水壹中盞煎陸分去滓不拘時溫服

雄黄散 治中蠱毒吐血

雄黄貳錢伍分研 伏龍肝半兩研 盤蝥去足翅糯米炒拾肆枚去糯米 獺肝如棗大炙

右為細末每服貳錢匕空心以酪漿調下或吐蝦蟆及蛇蟲等出是効

叅麯散 治中蠱吐血

右用小麥麯貳合分爲叁服以冷水調下半日服盡當下蠱即瘥

黄龍湯 治因食中毒

右將竈底當釜直下掘取赤土爲細末以冷水調隨多少服之或以犀角水磨取汁飲亦治食六畜肉中毒大効

解一切食毒及飲酒不知中何毒卒急無藥可解

薺苨 甘草生用各貳兩

右細剉以水伍盞同煎取貳盞停冷去滓分叁服一方解一切藥毒加蜜少許同煎服之

食躁或躁方用豉煮濃汁飲之

解麪毒方

右以蘿蔔啖之麥麪太熱蘿蔔能解其性

治中豆腐毒方

右用生蘿蔔煎湯如非時無蘿蔔用子煎湯亦可有人好食豆腐因中其毒醫治不効偶更醫醫至中途適見做豆腐之家夫婦相爭

圖問云今早做豆腐妻誤將蘿蔔湯置腐鍋
中今豆腐不成蓋豆腐畏蘿蔔也醫得其說
至病家凡用湯使俱以蘿蔔煎湯或調或嚥
病者遂愈

解瓠子毒及一切菌毒
右用芫花生者爲末每服壹錢新汲水下以
利爲好

中蕈毒方
忍冬草生啖之即金銀花也一名老翁鬚又

名鴛鴦草 掘地作坑以新汲水投坑中攪
之乘渾濁取出以絹濾過用磁器盛每服時
調轉飲壹盞至叁盞當効 人糞汁飲壹升
大豆濃煮汁飲之 服諸吐利藥並解
取糞汁法截淡竹去青皮浸滲其中取筩中
汁是也 食楓樹菌而笑不止亦治以前方
蕈毒吐瀉不止者用細茶芽研細以新汲井水
服神効 治蕈毒欲死方用石首魚頭或鯗
頭亦妙白水煮汁灌之即愈 治中蕈毒用
笆竹不入泥者數節煎湯飲之立効 荷葉
殺蕈毒
誤食芋煩毒欲死亦治以前方其芋根山東人
名魁芋人種芋叁年不收亦成野芋並殺人
蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣欲
絕或吐下白沫身體痺冷急治之用肉桂煎
汁飲之 或食蒜或食地漿 或濃煮豆豉
汁飲之並解
鉤吻與芹菜相似誤食殺人解之用薺苨捌兩

水陸升煮取貳升分温貳服鉤吻生池傍無
他異其莖有毛以此別之
菜中有水莨菪葉員而光有毒誤食之令人狂
亂狀如中風或吐血治之用甘草煮汁服之
解
春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之爲病發
時手青腹滿痛不可忍名蛟龍病治之用錫
糖貳叁升日兩度服之吐出如蜥蜴叁伍枚
瘥

食苦瓠中毒治之用黍穰煮汁服之解
飲食中毒煩滿治之用苦參叁兩苦酒壹升半煮半沸三上三下服之吐食出卽瘥或以水煮亦得、犀角湯亦解
貪食食多不消心腹堅滿痛治之用鹽壹升水叁升煮令鹽消分叁服當吐出食便瘥
治鬱肉漏脯中毒
燒犬屎酒服方寸七或服人乳汁或飲韮汁二三升亦良　鬱肉密器蓋之隔宿者是也

漏脯茅屋漏下沾著者是也
治黍米中藏肝脯食之中毒方
大豆濃汁飲數升卽解亦治貍肉漏脯等毒
治食生肉中毒方
掘地深叁尺取其下土叁升以水伍升煮數沸澄濤汁飲壹升卽愈
治自死六畜肉中毒方用黃蘗擣屑服方寸七
治食自死鳥獸肝中毒方
右取故頭巾垢壹錢七熱湯中烊服之亦治

卒心痛以沸湯取汁飲之頭巾卽縛髻帛也
又方飲豉汁數升良
治食六畜肝中毒方　凡物肝藏不可輕啖自死者尤毒
右用豆豉以水浸絞取汁旋服之
治食馬肝牛肉毒方
右以人乳汁合豉濃汁服之神効
治馬肝毒中人未死方
雄鼠屎二七粒末之水和服日再服屎尖者是又

人垢取方寸七服之佳
治馬肉中毒欲死方
香豉貳兩杏仁叁兩相和蒸一食頃熟杵服日再服又方煮蘆根汁飲之良
治噉蛇牛肉食之欲死方　飲乳汁壹升立愈
以泔洗頭飲壹升愈　牛膝細切以水壹斗煮取壹升飲之卽解　辨噉蛇牛肉毛髮向後順者是也
鳥獸有中毒箭死者其肉毒

用大荳煮汁及藍汁服之卽解

治河豚毒方

五倍子　白礬

右等分爲細末水調服之

治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無藥以淸油多灌之使毒物盡吐出爲愈

食魚後中毒物煩亂用陳皮濃煎汁服之卽解

食鱸鯸魚中毒用蘆根煮汁服之卽解

食蟹中毒用紫蘇煮汁飲叁升紫蘇子擣飲之亦良　冬瓜汁飲貳升喫冬瓜亦可

蠱毒　四類方八　五四九

食果中毒用猪骨燒過末之服方寸匕亦治馬肝漏脯等毒

誤飲蛇交水毒方　陳齋郎湖州安吉人因涉春渴掬澗水兩口嚥數日覺心腹微痛日久疼甚服藥醫診之云心脾受毒今心脈損甚齋荅云去年涉春渴飲澗水得此病醫云喫却蛇在澗邊遺下不淨在澗水内蛇已成形在腹中食其心而痛也遂以水服調雄黃𮪍之乘下赤蛇數條皆能走

誤吞蜈蚣用生雞血令病人喫須臾以淸油灌口中其蜈蚣滚在血中吐出繼以雄黃細研水調服愈

治中諸藥毒

生甘草　黑荳　淡竹葉各等分

右㕮咀用水壹椀濃煎連服

藍根散　解藥毒

藍根剉壹握　蘆根剉壹握　菉荳研貳錢半

蠱毒　八類方八　五十

瀫脚研壹合

右先將貳根以水壹椀煎至柒分去滓次入後貳味和勻分叁服或壹貳服利下惡物不用再服

粉草飲　凡中藥毒卽令食生黑豆數粒食之聞腥者卽非中毒也若是吐逆躁煩服藥須極冷卽解也

甘草壹兩生用　白礬半兩生　延胡索壹兩

右剉細每服半錢水壹盞煎至陸分去滓

令細研啣之

解一切藥毒草毒六畜肉中毒方

右用白扁豆生曬乾爲細末新汲水調下貳叁錢七

解藥毒方　王仲禮嗜酒壯歲時瘡疥發於鼻延於顙心甚惡之服藥不効僧法滿使服何首烏丸當用貳斤適坟僕識草藥乃掘得之其法忌鐵器但於砂鉢中藉黑豆蒸熟既成香味可人念所蒸水必能去風澄以頮面初覺極熱漸加不仁至晚大腫眉目耳鼻渾然無別望之者莫不驚畏王之母高氏曰凡人感風癩非一日積吾兒遇毒何至於是吾聞

山豆根　赤小豆　黑蛤粉

生薑汁

右急命僕擣捩薑汁以上叁味爲末調傳之中夜腫消到曉如初蓋先採何首烏擇焉不精爲狼毒雜其中以致此疾也

解藥過劑毒　服附子酒多而覺頭重如[illegible]

裂血流急求黑豆菉豆各數合嚼之及濃煎黑豆菉豆湯併飲　服鼠莽多悶亂不省者灌濃煎甘草同生薑自然汁頻飲之又方以螺青細研新汲水調下

白扁豆飲出聖惠一名巴解砒毒等

右用白扁豆不以多少爲細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆壹枚去殼不去油別研爲細末取一半入藥内以砂糖壹大塊水化開添成壹大盞飲之毒隨利去後却服五苓散之類

解鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服

菉豆子解砒毒及巴豆毒用藍根砂糖貳味擂和新汲水服之更入薄荷汁尤妙

解兆毒方　其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面色青黑四肢逆冷命在須臾

用菉豆半升擂去滓以新汲水調通口服

用乾藍花貳錢分貳服以井花水

又方治悶絶心頭溫者新汲水調

又甘草湯方　用甘草一兩□□一□飲之即愈

解砒毒方

右以豆豉煎濃汁飲之亦治服藥過劑心內煩悶

解砒毒用早禾稈燒灰新汲水淋汁濾過冷服壹碗毒從利下即安又方用井花水調豆粉或菉豆擂水汁皆可

解硫毒

漢椒肆拾粒　黑豆肆拾粒　甘草節貳寸碎之

烏梅貳箇

水壹盞煎至柒分溫服

解鼠莽草毒用枯過明礬同上等好茶末少許新汲水調服人有用之累効又用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先以鼠莽苗葉以豆汁澆其根從此敗爛不復生矣　又用枯蓮房殼帶梗陰乾㕮咀煎水貳叁碗灌之如無用荷葉中心蒂或用藕節煎湯壹碗溫冷灌之毒即散

解巴豆毒方　其證口乾兩臉赤五心熱利不止諸藥不効者

右用芭蕉根葉研取自然汁服利止而安

治藥中用巴豆下利不止

乾薑炮　黃連去鬚各等分

右爲細末每服貳錢水調下如人行五里再服　又煮菉豆湯冷服之瘥

薺苨湯　療石毒卒發者慄慄如寒或飲食或不飲食若服紫石英發毒者亦熱悶昏昏喜卧起止無氣力或寒皆是藏府氣不和以此治之

薺苨肆兩　茯苓　黃芩

芍藥各貳兩　蔓菁子壹升　藍子

人參　炙甘草各壹兩

以水壹斗先煮蔓菁子取捌升去滓內餘藥煎取叁升去滓分叁服日叁若虛弱人加人參壹兩若上氣加茯苓薺苨各壹兩甚良

治銀毒方

黃連去毛 甘草生剉各壹兩
右剉碎以水叁盞煎取貳盞去滓時時飲之
良
治丹砂毒方
用鹽半兩以冷水攪勻令澄旋旋服之
治石鍾乳毒方
右用紫石英爲細末每服壹錢七溫水調下
連叁服
黑鉛酒 治中金石藥毒

黑鉛壹斤以乾鍋溶作汁投酒壹升如此拾
數廻候酒至半升去鉛頓服之効一方以井
水磨下解砒毒
解丹毒方 以地漿服之甚効
治一切藥毒蠱毒金石毒
並用石蟹以熟水磨服
治五石毒 用薺苨汁生服良
治丹石毒 以蚌肉食之良
解漆毒方 一州牧以生漆塗囟兩眼囟已

適有村叟憐而語之曰汝急尋蟹搗碎濾汁
滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言訪
得一小蟹用之目睛好畧無損
治中蠱毒
右用生蒼耳柒箇白礬 兩皂角子 許嚼
塗咬處須男子嚼之餘藥傅腫處
治溪毒中毒
右以知母連根葉搗作末服之亦可服水搗
取汁飲貳升夏月出行多取此屑自隨欲入

水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦
可和水作湯浴之甚佳
葱白湯 治中水毒溪毒如傷寒狀
葱白壹握切 豉半升 葛根貳兩
升麻叁錢半
右剉如豆大每服肆錢匕水貳盞煎至壹盞
去滓不拘時溫服移時再服
五加皮散 治中水毒溪毒如傷寒狀
右用五加皮研爲細末每服壹錢匕酒壹盞

調下日貳夜壹粥飲調亦得一方以五加皮爲根燒研爲末水調服

牡丹散　治中水毒溪毒下部蟲蝕生瘡

牡丹皮爲細末每服貳錢七酒壹盞調下日叁服。

蟲

神効剪紅丸　專取一切蟲積神効無比凡人百病皆因飲酒過度食傷生冷致使脾胃不和心腹脹滿嘔惡咽酸常吐清水面色痿黃不進飲食山嵐瘴氣水腫蠱脹齁船欬嗽痰涎壅滯酒積食積氣積氣塊翻胃噎膈嘔逆惡心腸風痔漏臟毒酒痢累積積熱上攻頭目下生瘡癬婦人血氣寒熱往來肌體羸弱月經不調赤白帶下[illegible]鬼胎產後諸疾小

兒五疳蟲積誤吞銅錢誤食惡毒等物並宜服之每服五更雞鳴時用冷茶清吞下更用馬桶盛糞於野地看之庶見藥功易辨或蟲或積或如爛魚凍或作五色等積若壹次未見蟲積更看第貳叁次下來此即是病根有積消積有氣消氣有蟲取蟲有塊消塊若病根去其病自消若病淺即壹服見効若源深更須再壹服能宣導四時蘊積春宣積滯不生瘡毒夏宣暑濕不生熱痢秋宣痰飲不生

瘴瘧冬宜風寒不生瘟疫此藥溫和不動元陽眞氣亦無反惡小兒半服孕婦休服其效如神

壹上末　檳榔生研細取淨末壹斤以貳兩爲母餘拾肆兩上第壹次以壹等羅篩過取齊曬乾

貳上末　商陸卽樟柳根白者可用赤者殺人金毛狗脊貫衆各肆兩已上叁味和壹處研極細末上第貳次以貳等羅篩過取齊曬乾又方不用貫衆則蟲出來猶未死也

叁上末　三稜醋煮莪朮醋煮各捌兩青木香西木香各肆兩雷丸醋煮貳兩半南木香貳兩已上陸味和壹處研極細末上第叁次以叁等羅篩過取齊

肆上末　大黃剉碎酒浸曬乾研細取淨末壹斤上第肆次以肆等羅篩取齊曬乾

伍上末　黑牽牛半生半炒研細取頭末壹斤上第伍次以伍等羅篩過取齊曬乾又方有枳殼壹斤爲母有藿香肆兩和入諸香

右作五處另研極細末要作五次上末却用茵蔯半斤大皁角壹斤煎汁濾淨法水爲丸如菉豆大曬乾後用丁香末壹兩或加蘆薈末壹兩亦妙以前淨汁煎壹滚灑入丸藥旋搖令光瑩爲度再以阿膠貳兩生以前汁熬熔灑入丸藥旋搖光瑩曬乾壯人每服五錢弱人每服肆錢五更以茶清吞下小兒減半

萬應丸　取蟲積神効

黑牽牛取頭末　大黃　檳榔各捌兩
雷丸醋煮　南木香各壹兩　沉香伍錢

右將黑牽牛大黃檳榔和壹處爲末以大皁角苦楝皮各肆兩煎汁法水爲丸如菉豆大後以雷丸木香沉香和壹處研末爲衣每服叁肆拾丸五更用砂糖水送下或作末服亦可

追蟲丸 取一切蟲積
黑牽牛(取頭末) 檳榔(各捌兩) 雷丸(醋炙)
南木香(各貳兩)
右爲末茵蔯貳兩大皁角苦楝皮各壹兩煎濃汁法水爲丸如菉豆大大人每服肆錢小兒叁錢或貳錢或壹錢半量人虛實五更用砂糖水吞下待追去惡毒蟲積貳叁次方以粥補之

下蟲丸 追蟲取積

苦楝皮(去外麁皮用根皮爲上樹皮次之)
右末麪糊丸如彈子大如欲服藥宜戒午飯晡時預食油煎雞卵餅壹貳箇待上牀時滚白湯化下壹丸至五更取下異蟲爲効

化蟲丸 治諸蟲
鶴虱(去土) 檳榔 苦楝根
胡粉(炒各壹兩) 白礬(枯貳錢半)
右爲末米糊爲丸如桐子大壹歲服伍丸量人大小加減丸數温漿水入生麻油叁肆點打勻送下清米湯亦可不拘時其蟲細小者皆化爲水大者自下

集効丸 治因藏府虛弱或多食甘肥致蛔蟲動作心腹絞痛發則腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫是蛔咬宜服此藥若積年不瘥服之亦愈又治下部有蟲生痔痒痛
木香 鶴虱(炒) 檳榔
訶子(麪裹煨去核) 蕪荑(炒) 附子(煨去皮臍)

乾薑(各柒錢半) 大黃(壹兩半) 烏梅(拾肆箇去核)
右爲末煉蜜丸如桐子大每服叁肆拾丸食前用陳皮湯下婦人淡醋湯送下

秘方萬應丸 治大人小兒腹内有蟲及積氣塊痛小兒疳病
三稜(醋炒) 莪朮(醋炒各伍錢) 檳榔(壹兩)
陳皮(去白炒) 橘紅(各伍錢) 蕪荑(貳錢半)
雷丸(伍錢) 鶴虱(炒各錢) 乾漆(炒煙盡伍錢)
木香([illegible]) 良薑([illegible]) 砂仁([illegible])

史君子取肉 麥蘗麪炒各伍錢 胡黃連炒
炙甘草各叁錢 神麯炒黃色伍錢
右爲細末醋打米糊丸如菉豆大每服叁伍
拾丸空心淡薑湯送下
取蟲積方
檳榔 牽牛各半斤 雷丸壹兩半
苦楝皮去粗皮 大黃肆兩 皁角半斤
三稜 蓬朮各貳兩另搗同醋煮
木香隨意加入
右爲細末煎皁角膏子煮糊和丸如黍米大
每服貳錢四更時分冷茶送下小兒壹錢下
蟲以白粥補之
萬靈丸 取積追蟲
黑牽牛壹斤取頭末拾兩生用 大腹子壹斤扁者取末
柴兩半用好火炙足焙乾 蓬朮貳兩炮 京三稜炮
雷丸炮 廣木香各伍兩爆
右爲細末研勻用好紫色皁角半斤去皮弦
切碎用水兩大盞浸壹宿冬月浸兩宿滂去
麤滓銅磁器內熬數沸白沫出爲度放冷和
藥必須揉擣爲丸如梧桐子大每服肆錢重
五更時砂糖水送下溫冷不妨至天明利三
五行看取下是何蟲積以溫白粥補之忌食
生冷魚腥硬物孕婦勿服
檳榔湯 治三蟲幷寸白蟲
右用檳榔叁枚以灰火煨過麤擣篩用水叁
盞煎至壹盞半去滓分叁服空心日午近夜
各壹服其蟲當下或和葱白鹽豉同煮飲之
亦佳一方治寸白蟲用檳榔貳柒枚剉碎以
水貳升半煮皮取壹升半去滓內末頻服暖
臥蟲出或不盡更服取瘥止宿勿食旦服之
麥門冬湯 治肺勞熱生蟲其形如蠶令人欬
逆氣喘或謂憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈此皆
從勞氣所生名曰膏肓病針灸不至
麥門冬去心壹兩 乾薑炮 蜀椒去目并合口者微炒
各壹兩 黃芪剉 百部焙
白朮 人參 桂去皺皮各壹兩貳錢半

遠志去心　附子炮去皮臍　細辛去苗葉
炙甘草各壹兩半　杏仁去雙仁皮尖麩炒令黃半兩
右為細末煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻
熟丸如酸棗大含化稍稍嚥津一方有檳榔
一方無白朮
桑根白皮酒　治肺勞熱生蟲在肺為病
桑根白皮取東引者剉壹升　吳茱萸根皮取東引者淨剉去土五兩
狼牙去連苗處淨剉去土叁兩
右細剉用酒柒升煮至貳升去滓分作叁服

每日空心壹服一方無狼牙
前胡湯　治脾勞有白蟲長壹寸在脾為病令
人好嘔胸中欬欬即嘔而不出
前胡去蘆　白朮剉　細辛去苗葉
赤茯苓　枳殼去瓤麩炒　常山剉
松蘿　旋覆花各壹兩半　龍膽去苗
杏仁去雙仁皮尖麩炒各壹兩
右剉碎每服半兩水盞入竹葉拾片洗淨
細切同煎至七分去滓空心服吐之即瘥

腹中熱滿加芒硝半錢梔子仁壹兩黃芩壹
兩半苦參壹兩一方用枳實無枳殼
茱萸根浸酒方　治脾勞熱有白蟲在脾中為
病令人好嘔
吳茱萸根取東引者大者壹尺剉　麻子貳升淨揀
陳皮去白炒貳兩
右先搗碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用
酒壹斗浸壹宿慢火上微煎取去滓分作五
服每空心溫服蟲出下凡合藥時忌言合殺

蟲藥一方以朮煎服
雷丸丸　治心臟勞熱傷心有長蟲名曰蠱長
壹尺貫心為病
雷丸炮火過壹兩　橘皮湯浸去白焙　桃仁去雙仁皮尖麩炒各壹兩半
貫眾大者去鬚半兩　白蕪荑炒
青葙子炒　乾漆炒煙出各壹兩　狼牙去連苗處淨剉去土
亂髮如雞子大燒灰研
右為細末研勻煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵
令勻熟丸如梧桐子大每服拾伍丸空心溫

温酒送下至晚再服米飲亦得一方不用塗
酥一方有雞糞呉茱萸根皮

貫衆散　治腎勞熱四肢腫急有蟯蟲如菜中
蟲生於腎中

貫衆大者叁枚去鬚　乾漆炒令煙絶貳兩　呉茱萸水洗焙乾炒壹兩半　槐白皮剉乾者　白蕪荑炒各壹兩　胡粉炒黄色研壹兩　杏仁去皮尖雙仁炒半兩

右爲細末研勻每服貳錢空心井花水調下
日晚再服

水銀膏　治蟯蟲咬人下部痒

右水銀壹兩用蒸棗膏和丸如人指大綿裹
臨卧内下部中壹宿内藥時常留綿帯子在
外一方云水銀損腸宜慎之

蠶蛹汁方　治蟯蟲

右取繰絲蠶蛹兩合爛研生布絞取汁空心
頓飲之非繰絲時須依時收取蠶蛹曝爲細
末用時以意斟酌多少和粥飲服之

錫灰丸　取寸白諸蟲

錫灰壹兩　雞心檳榔　貫衆各半兩　木香貳錢半　輕粉　黄丹各貳錢

右爲細末酒醋煮麪糊爲丸如荔枝大每服
壹丸米泔浸輭日午先喫飯了至黄昏不饑
飽時喫肉脯壹片引蟲少刻温酒嚼下至天
明蟲出又喫韭菜亦治寸白蟲

治寸白蟲令化爲水

狗脊　貫衆　白蕪荑　酸石榴根剉各壹兩

右剉碎每服半兩以漿水壹大盞煎至五分
去滓肆更初温服先於晩間不得喫夜飯

治寸白蟲爲水瀉出永除方

榧子　檳榔　蕪荑各等分

右爲細末每服貳錢温酒調服先喫燒牛肉
脯後服藥

聖功散　治寸白蟲不拘久近神効

南木香　檳榔各等分

右爲細末每服叁錢濃米飲調下黎明空心

先熟嚼炙猪肉之屬只嚥汁吐去滓便服藥
辰巳間蟲下其疾永除

治寸白蟲方

右用榧子肆拾玖枚去皮以月上旬平旦空心服柒枚柒日服盡蟲消成水永瘥又云食實柒枚柒日滿蟲化為水一方以百枚只燃啖之食盡佳不能者但啖伍拾枚亦得經宿蟲消自下一方并治三尸蟲

方

用黑鉛灰錫灰炒肆錢壹服先喫猪肉脯少許二將來卻用砂糖濃水半盞調灰五更服蟲盡下白粥將息一日良久宣和中每覺心中多嘈雜意謂飲作又疑是蟲漫依良方所說服踰日下蟲貳條壹長貳尺五寸頭扁闊尾尖銳每寸作壹節斑斑如錦紋壹條皆寸斷矣

治濕䘌方

青黛貳兩　黃連　黃蘗

丁香各壹兩　麝香貳分

右為細末以車脂和如棗大內下部日一二度

治蟲蝕下部肛盡腸穿者

右取長股蝦蟆青背者壹枚雞骨壹分燒為灰合和吹下部令深入累用効

傷寒證治準繩自序

夫有生必有死萬物之常也然死不死於老而死於病者萬物皆然而人爲甚故聖人憫之而醫藥興醫藥興而天下之人又不死於病而死於醫藥矣智者憤其然因曰病而不藥得中醫豈不信哉或曰此但爲傷寒言之也雖然微獨傷寒特傷寒爲甚爾善醫莫不宗本黃岐今其書具在然有論而無方方法之備自張仲景始仲景雖獨以傷寒著然二千年以來其間以醫名世爲後學所師承者未有不從仲景之書悟入而能徑窺黃岐之壼奧者也故黃岐猶羲文也仲景其孔子乎易水師弟則濂洛諸賢金華師弟則關閩諸大儒也擬人者不倫於此矣王好古曰傷寒之法可以治雜病雜病法不可以治傷寒豈誠然哉傷寒法出於仲景故可以治雜病而爲雜病法者多未嘗夢見仲景者也故不可以治傷寒也然則傷寒論可弗讀乎而世之醫有終身目不識者獨執陶氏六書以爲枕中鴻寶爾奚考陶氏之書不過剽南陽唾餘尚未望見易水門牆而輒詆傷寒論爲非全書聾瞽來學蓋仲景之罪人也而世方宗之夭枉可勝道哉余少而讀仲景書今老矣尚未窺其堂室平生手一編丹鉛殆徧紙敗墨渝海虞嚴道徹見而愛之欲壽諸梓而余不之許非靳之蓋愼之也丁酉戊戌間因嘉善高生請始輯雜病準繩而不及傷寒非後之蓋難之也今歲秋同年姜仲文知余所輯雜病外尚有傷寒婦嬰瘍科爲準繩者四遣使來就鈔而不知余奪於幽憂宂病未屬草也因感之而先成傷寒書入秩始於八月朔而告完於重九或曰以數十萬言成於四旬不太草草乎曰余之醖釀于丹府而漁獵于書林蓋三十餘年矣不可謂草草也傷寒一病爾而數十萬言不太繁乎曰吾猶病其畧也何也是書之設爲因證檢書而求治法者設也故分證而不詳則慮其誤也詳則多互見而複出而又安得不繁後之註仲景書續仲景法者或見其大全或窺其一斑皆可以爲後學指南其擇而載之而又安得不繁且夫人讀一書解一語苟迷其理有礙於胸中以問知者則唯恐其不吾告與告之不詳余固駑下然學醫之資差不在人後以余所自苦不能究者與天下後世共究之將讀之恐其易盡而顧患繁乎哉丹陽賀知忍中秘心乎濟物而勇於爲義願爲余流通書未成已鳩工庀具矣余之遄成以此因叙于篇首時萬曆三十二年歲次甲辰重九日念西居士王肯堂宇泰甫書

傷寒證治準繩凡例

一纂傷寒書者衆矣知尊仲景書而遺後賢續法者好古之過也類證諸書是也惟俗眼之便而雅俗雜陳淄澠莫辨使世不知孰為仲景者俗工之謬也瑣言藴要諸書是也惟婁氏綱目列六經正病於前而次合病併病汗吐下後諸壞病于後又次之以四時感異氣而變者與婦嬰終焉而每條之中備列仲景法然後以後賢續法附之既該括百家又不相淆雜義例之善無出其右此書篇目大抵因之

一王叔和編次張仲景傷寒論立三陽三陰篇其立三陽篇之例凡仲景曰太陽病者入太陽篇曰陽明病者入陽明篇曰少陽病者入少陽篇其立三陰篇亦依三陽之例各如太陰少陰厥陰之名入其篇也其或仲景不稱三陽三陰之名但曰傷寒其病用其方主之而難分其篇者則病屬陽證發熱結胸痞氣蓄血衄血之類皆混入太陽篇病屬陰證厥逆下利嘔吐之類皆混入厥陰篇也惟燥屎及屎鞕不大便大便難等證雖不稱名獨入陽明篇者由此證類屬陽明胃實非太陽厥陰可入故獨入陽明也所以然者由太陽為三陽之首凡陽明少陽之病皆自太陽傳來故諸陽證不稱名者皆入其篇厥陰為三陰之尾凡太陰少陰之病皆至厥陰傳極故諸陰證不稱名者皆入其篇後人不悟是理遂皆謂太陽篇諸證不稱名者亦屬太陽而亂太陽病之眞厥陰篇諸證不稱名者亦屬厥陰而亂厥陰病之眞為大失仲景之法也今於各證分經處尚多仍叔和之舊學者嘗以意神而明之

一仲景立法凡曰太陽病者皆謂脈浮頭項强痛惡寒也凡曰陽明病者皆謂胃家實也凡曰少陽病者皆謂口苦咽乾目眩也凡曰太陰病者皆謂腹滿時痛吐利也凡曰少陰病者皆謂脈微細但欲寐也凡曰厥陰病者皆謂氣上撞心痛吐蚘也候如少陰病不一一逐條曰脈微細但欲寐而總用少陰病三字括之者省文也故各條或曰少陰病反發熱脈沉用麻黄附子細辛湯者謂脈沉細但欲寐而又反發熱者用其方也或曰少陰病得之二三日以上心煩不卧用黄連阿膠湯者謂得脈微細但欲寐二三日後變心煩不卧者用其方也後人不悟是理遂皆不察少陰病三字所括脈微細但欲寐之證但見發熱脈沉便用麻黄附子細辛湯見心煩不卧便用黄連阿膠

湯尤爲大失仲景之法也

一解釋仲景書者惟成無已最爲詳明雖隨文順釋自相矛盾者時或有之亦白璧微瑕固無損於連城也後此趙嗣真張兼善之流皆有發明並可爲成氏忠臣張公耳孫故多采掇使學者一覽洞然而一得之愚亦時附焉其文義淺近不必訓釋者則一切省之內一字趙者嗣真也張者兼善也黄者仲理也活者朱肱活人書也龐者安時也許者叔微學士也本者許之本事方也韓者祗和也孫者兆也潔者潔古張元素也雲者潔古之子雲岐子也垣者李東垣而丹者朱丹溪也海者王海藏也王者履也羅者天益也戴者元禮也婁者全善也吳者綬也陶者華也其不系姓字者自篇首辨證數語之外皆仲景論文也

一仲景諸方動以觔計而又有稱升合枚者古今度量衡輕重長短不同難以遵用局方綱目又一切裁損每服五錢則失之太小陶氏吳氏書盡變古方以便時用則其失更遠矣今書方藥分兩一切仍仲景之舊增損出入又當視病情時令神而明之一切古方皆當如是施用不獨仲景書也知此則又何以輕變古法爲哉陳無擇以錢譜推測度量衡法頗協時宜今引其說于此用古方者宜詳攷焉　凡度者分寸尺丈引本以一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引觀今之尺數等不同如周尺長八寸京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸樂尺長一尺二寸五分並以小尺爲率小尺旣自三微起却自可準唐武德年鑄開元錢徑八分當十二錢半得一尺排錢比之十一箇已及一尺又不知唐用何尺顧漢唐龠量並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑據博古君子必有說矣　凡量者龠合升斗斛本以黃鍾龠容十二銖合龠爲合重二十四銖今以錢準則六銖錢四箇比開元錢三箇重升斗斛皆壘而成數漢唐同用至趙宋紹興升容千二百銖則古文六銖錢二百箇開元錢二百二十箇以紹興一升得漢五升其餘私用不足計也　凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鍾龠所容重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石每兩則古文六銖錢四箇開元錢三箇至趙宋廣科以開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩爲今一兩以古三升爲今一升諸藥類例尤爲難辨且如半夏一升準五兩不知用何升何兩此修合制

度之要務不可不知漢銅錢質如周錢文曰半兩重如其文孝文五年錢益多而輕乃更鑄四銖其文曰半兩雜以鉛鐵錫非殽雜僞巧則不得贏而奸或盜磨錢質取鎔有司言錢輕重請郡國鑄五銖錢周郭有質令不得磨取鎔則知漢以二半兩錢爲兩重十銖明矣漢書唐例以二十四銖爲一兩抑未知修史人改作唐例亦不可知觀錢譜漢無六銖錢至唐方有今以五銖錢十六箇正得開元錢十箇重又以六銖錢十二箇正得開元錢九箇重則知開元錢每箇以重八銖唐武德四年鑄開元通寳徑八分重二銖四絫積十錢爲兩似難考據明食貨若必有說焉　按藥書漢方湯液大劑三十餘兩小劑十有餘兩用水六升或七升多煎取二升三升並分三服若以古龠量水七升煎今之三十兩末淹得過况散末藥只服方寸刀圭匕圓子如梧桐子大極至三十粒湯液豈得如此懸絶又如風引湯一劑計五十五兩每兩只用三指撮水三升煮三沸去滓溫服一升觀其煮製每只三指撮未應料齊如此之多此又可疑也今以臆説漢方當用半兩錢二枚爲一兩且以术附湯方較若用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二箇半重若分三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十六銖得開元錢四十二箇重每服計今之十四錢重大略可知若以開元錢準得一百單五箇重分三服每服計三十五錢重此猶是小劑况有大劑多件兩數之多者未易槩舉留心此道幸少詳焉　吴綬曰凡方稱銖者二十四銖爲兩一兩分爲四分六銖爲一分計二錢五分也稱字者一錢有四字一字計二分五釐也世有古今時有冬春地有南北藥有良獷人有強弱不可執一且如大陷胸湯用大黄六兩今用六錢足矣若人壯病大者宜之人弱

病小者又當減半或只用三四之一可也芒硝一升今用二三錢足矣甘遂二兩只可用一分或半分而已若無活法通變而膠柱鼓瑟未有不至于殺人者慎之慎之

一內經云風雨寒暑不得虚邪不能獨傷人至于丹溪又云傷寒屬内傷者十居八九當以補元氣爲主由是言之後人治傷寒者既皆識仲景之法不盡又不知其病本於内傷虚勞而思補養但用汗下致殀者其殺人何異刀劍與言至此切骨痛心今雖以後賢補養之法附載于篇而書不盡言言不盡意尤望臨

病之工重人命而懼陰證熟玩此書無疑于心而後下手用藥即不能然寧過於謹護元氣無孟浪汗下而後庶幾乎少失也

一屠鶚四時治要云凡欲知陰別陽須當觀脈論形視喘息聽音聲而治病所苦按尺寸觀權衡而知病所生然後知其虛實得其本末更精加審察徐徐取之如仲景活人書下證俱備當行大承氣必先以小承氣試之合用大柴胡必先以小柴胡試之及陰證曉然合用四逆湯必先以理中湯真武湯之屬試之此皆大賢得重敵之要學者其可不審乎按湯劑丸散生靈之司命也死生壽夭傷寒之瞬息也豈以試爲言哉盖與其躁暴而多虞寧若重敵而無失雖峰張鋭者宋之神醫也療一傷寒脉察色皆爲熱極煮承氣湯欲飲復疑至于再三如有掣其肘者始持藥以待病者忽發戰悸覆緜衾四五重始稍定有汗如洗明日脱然使其藥入口則人已斃矣由是觀之則屠氏之探試雖非仲景本旨得非麤工之龜鑑歟

入門辨證訣

發熱外感內傷辨

凡病鮮有不發熱者而內傷外感其大關鍵也人迎脉大於氣口爲外感氣口脉大於人迎爲內傷外感則寒熱齊作而無間內傷則寒熱間作而不齊外感惡寒雖近烈火不能除內傷惡寒得就溫暖而必解外感惡風乃不禁一切風寒內傷惡風唯惡夫些少賊風外感證顯在鼻故鼻氣不利而壅盛有力內傷證顯在口故口不知味而腹中不和外感則邪氣有餘故發言壯厲先輕而後重內傷則元氣不足故出言懶怯先重而後輕外感頭痛常常而痛內傷頭痛時止時作外感手背熱手心不熱內傷手心熱手背不熱東垣辨法大要如此有內傷而無外感有外感而無內傷以此辨之判然矣若夫內傷外感兼病而相合者則其脉證並見而難辨尤宜細心求之若顯內證多者則是內傷重而外感輕宜以補養爲先若是外證多者則是外感重而內傷輕宜以發散和解爲急此又東垣未言之意也

傷寒類傷寒辨

冬溫 溫病 寒疫 熱病 溫毒 風溫 霍亂 痓 痰飲 虛煩 脚氣 內癰 蓄血

世傳以痰飲脚氣虛煩四證爲似傷寒王叔和又以痓

濕暍霍亂等證似傷寒者編入傷寒論中然以形證較之非止此數者而已其內傷勞倦之似傷寒者已前見今以冬温等病與傷寒辨析差別臚列于左

自霜降以後天令寒冱感之而病者傷寒也脉浮緊無汗為傷寒　脉浮緩有汗為傷風

霜降已後當寒而不寒乃更温煖因而衣被單薄以致感寒而病者冬温也[illegible]

春時天道和煖有人壯熱口渴而不惡寒者温病也以辛温汗之則壞矣[illegible]

三月以後八月以前天道或有暴寒感之而病者時行寒疫也

夏至以後時令炎熱有人壯熱煩渴而不惡寒者熱病也熱病與中暑相似但熱病脉盛中暑脉虛

夏月有病頭痛譫語自汗身不甚熱兩脛逆冷四肢沉重胸腹滿者濕温也其人常傷于濕因而中暑濕熱相搏故發此病不可發汗

頭痛身熱自汗與傷寒同而脉尺寸俱浮身重默默但欲眠鼻息鼾語言難出四肢不收者風温也不可發汗

病嘔吐而利頭痛身痛惡寒發熱或吐利止而發熱者霍亂也

身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭面搖卒口噤背反張者痓也　惡寒無汗為剛痓惡風有汗為柔痓　仰面而卧開目為陽合面而卧閉目為陰　脉浮緊數為陽脉沉細濇為陰　口中燥渴為陽口中和為陰　陽痓易治陰痓難治

頭疼發熱與傷寒同而身不痛右手氣口脉緊盛右關短滑左手反平和者傷食也必兼中脘痞悶噫氣作酸或惡聞食臭或欲吐不吐或吐之不盡等證亦有停食而又感寒者則左右手人迎氣口俱大

煩熱與傷寒相似而脉不浮緊頭不疼身不痛不惡寒或煩時頭亦痛煩止而痛止者虛煩也

憎寒發熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息與傷寒相似而頭不痛項不強亦有時而頭痛但作止無常其脉緊而不大者痰也痰在上焦則寸口脉沉滑或沉伏痰在中焦則右手關脉滑大有氣鬱則沉而滑夾食則短而滑凡脉弦滑者有痰飲偏弦者主飲沉而弦者有懸飲內痛凡左右關大或關上脉浮而大或目下如灰烟熏者皆痰之候也

發熱憎寒頭疼肢節痛嘔惡與傷寒相似而病起自脚脚膝腫痛兩脛或腫滿或枯細大便堅者脚氣也

傷寒論云諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也此言内癰也素問云肝滿腎滿肺滿皆實卽為腫王注云滿謂脉氣滿實腫謂癰腫大抵口中欬卽胸中隱痛心胸甲錯振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者肺癰也小腹重而强按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脉滑而數者腸癰也胃脘隱隱而痛手不可近胃脉沉細人迎逆而盛者胃脘癰也内傷外感以人迎氣口別之故内傷之脉人迎平而胃脘癰之脉人迎反盛未有不誤以為傷寒者宜辨之蚤也京口錢氏室女患腸癰發熱庸醫作傷寒治之禁絕飲食旬餘而斃垂斃之日下膿數升方知是癰欲救已無及矣嗚呼仲景之書豈可以弗讀哉

發熱如傷寒而其人有所從高墜下顛撲損傷或盛怒叫呼無何而病小便自利口不甚渴按心下或脇下或臍腹間有痛處或至手不可近者畜血也勞逸飢飽七情房室所傷皆能瘀血不止一途友人繆仲淳每服滋補丸藥多至數兩忽發熱不已投涼解之藥有加無損冥困之極殆將不支余用畜血法治之方烹煎次仲淳嚊其氣曰一何香也飲已而熱退明日下黑糞斗許而安然傷寒自有畜血證當於本科求之此言雖證畜血之類傷寒者耳

傷寒證治準繩目錄

序

凡例

入門辨證訣

發熱外感內傷辨

傷寒類傷寒辨　冬溫　溫病　寒疫　熱病　暑暍　風溫　霍亂　痓
傳染　春溫　寒疫　時氣　瘟疫　晝二

○帙之一

傷寒總例　四時傷寒不同　傳變　汗下大法　可汗　不可汗　可下　不可下　可吐　不可吐　愈解　死證　陰陽　表裏　傷寒雜病　類證雜論　察色要略

○帙之二

太陽病

桂枝湯　麻黃湯　大青龍湯

溫粉方　桂枝葛根湯　葛根湯

桂枝麻黃各半湯　桂枝二越婢一湯

麻黃附子細辛湯　柴胡加桂枝湯

發熱

調胃承氣湯　白虎湯

黃芪湯　川芎湯　神术湯

白术湯　又方　九味羌活湯

和解散　十味芎蘇散　養胃湯

五積散　人參敗毒散　參蘇飲

加味香蘇散　十神湯　藿香正氣散

大白术湯　通聖散　涼膈散

天水散　三一承氣湯　雙解散

清解散　半夏橘皮湯

黃芪建中加當歸湯　黃芪湯

調中丸　理中丸　調脉湯

葛根柴胡湯　人參桔梗湯　薄荷湯

防風湯　香芎湯　六物麻黃湯

七物柴胡湯　發表湯　人參湯

前胡湯　石膏湯　解肌湯

芍藥湯　知母湯

惡寒

四逆加人參湯　芍藥甘草附子湯

惡風

桂枝去芍藥湯

頭痛

連鬚葱白湯　葛根葱白湯　獨活湯

石膏川芎湯

項強
桂枝去桂加茯苓白朮湯
體痛
黄芪建中湯　桂枝加芍藥人參新加湯
桂枝附子湯　甘艸附子湯　杏仁湯
麻黄復煎湯
帙之三
陽明病
胃實不大便
蜜煎導法　猪膽汁方　麻仁丸

不得卧
黄連阿膠湯　酸棗仁湯　千金流水湯
加味温膽湯　酸棗湯　梔子烏梅湯
黄連解毒湯
自汗
防風白朮牡蠣散
潮熱
大承氣湯　小承氣湯　柴胡加芒硝湯
譫語
狂亂

鵲石散　防風黄連湯
循衣摸牀
渴
五苓散　白虎加人參湯
文蛤散　人參湯
嘔
葛根半夏湯　赤茯苓湯　葛根湯
少陽病
口苦咽乾
眩

往來寒熱
小柴胡湯　大柴胡湯　柴胡桂枝乾薑湯
脇滿痛
十棗湯
胸滿
胸痛
耳聾
陽毒
升麻鼈甲湯　陽毒升麻湯　陽毒梔子湯
大黄湯　葛根散　黑奴丸

丹砂丸　青黛一物湯　玄參升麻湯
帙之四
三陰總論
太陰病
桂枝加芍藥湯　桂枝加大黃湯
腹滿
厚朴生薑人參甘草半夏湯　桔梗半夏湯
腹痛
小建中湯　黃連湯
黃

梔子蘗皮湯　麻黃連軺赤小豆湯
茵蔯蒿湯　五苓茵蔯散　橘皮湯
茵蔯大黃湯　茅根湯　五苓加茵蔯湯
瓜蒂散
少陰病
麻黃附子甘草湯　附子湯
四逆散
但欲寐嗜臥
口燥咽乾
咽痛

半夏散及湯　甘草湯　桔梗湯
苦酒湯　半夏桂枝甘草湯
吐
吳茱萸湯　乾薑黃芩黃連人參湯
大橘皮湯
吐利
理中湯　四逆加猪膽汁湯
下利
黃芩湯　黃芩加半夏生薑湯
葛根黃芩黃連湯　四逆湯

赤石脂禹餘糧湯　猪膚湯
桃花湯　眞武湯　通脉四逆湯
白通湯　白通加猪膽汁湯
白頭翁湯　麻黃升麻湯　三黃熟艾湯
薤白湯　赤石脂丸　地榆散
黃連阿膠湯　燥腸丸　七宣丸
枳實芍藥甘草湯
厥陰病
桂枝去桂加茯苓白朮湯
氣上衝心

瓜蒂散　桂枝加桂湯　李根湯
飢不欲食
吐蚘蟲
烏梅圓　理中安蚘散
厥
甘草乾薑湯　茯苓甘草湯　當歸四逆湯
五味子湯
少腹滿
囊縮
正陽散　回陽丹

陰毒
陰毒甘草湯　正元散　退陰散
五勝散　白术散　正陽丹
退陰散　還陽散　附子回陽散
返陰丹　火焰散　葱熨法
代灸塗臍膏　廻生神膏　破陰丹
霹靂散
帙之五
合病併病汗下吐後等病
合併病

發汗後不解
下後不解
汗吐下後不解
喘
桂枝加厚朴杏仁湯
麻黄杏仁甘草石膏湯
蘇沈九寶湯　加減瀉白散
短氣
身重
防己黄芪湯

面赤
壞病
是齋獨參湯　羊肉湯　鼈甲散
振戰慄
茯苓桂枝白术甘草湯　加味人參養榮湯
加味温膽湯
筋惕肉瞤
叉手冒心
驚悸
茯苓丸　犀角湯　麥門冬茯苓飲子

驚
柴胡加龍骨牡蠣湯
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
悸
炙甘草湯　桂枝甘草湯　茯苓桂枝甘草大棗湯
藏結與結胸痞氣大同小異
結胸
大陷胸湯　小陷胸湯　白散
大陷胸丸　枳實理中丸　增損理中丸
穿結散　海蛤散　治結胸灸法

痞
半夏瀉心湯　生薑瀉心湯　甘草瀉心湯
大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯
桂枝人參湯　旋覆代赭石湯　桔梗枳殼湯
心下滿
心痛心下痛
煩
梔子豉湯　梔子甘草豉湯　梔子生薑豉湯
梔子厚朴湯　梔子乾薑湯
煩躁

乾薑附子湯　茯苓四逆湯　桂枝甘草龍骨牡蠣湯
巳寒丸
懊憹
欬
小青龍湯　補肺散　阿膠散
桔梗湯　人參石膏湯　射干湯
直視
鬱冒
不能言
鼻鼾鼻鳴

帙之六
小便不利
小便自利
遺溺
噫氣
如聖加枳實湯
如聖加人參藿香杏仁湯
噦 即咳逆
橘皮乾薑湯　羌活附子散　半夏生薑湯　匀氣散
陰毒吃逆方　肉豆蔻湯　良薑湯

扁鵲丁香散　吃逆急救方　又方

瘧狀

桂枝二麻黃一湯

舌胎

薄荷蜜　透頂清神散　雙解加解毒湯

動氣

防葵散　枳殼散　前胡散　茯苓散

漱水不欲嚥

衄

犀角地黃湯　茅花湯　滑石丸

吐血

麻黃人參芍藥湯

便膿血

畜血

抵當湯　抵當丸　桃核承氣湯

生地黃湯

腹中雷鳴

踡

四肢拘急

牛蒡根散

瘈瘲

風濕相搏

奔豚

腫

身癢　牡蠣澤瀉散

陰中

下重

身熱惡寒身寒惡熱

表熱裏寒表寒裏熱

熱多寒少寒多熱少

發斑

升麻葛根湯　加味羌活散　加味小柴胡湯

消毒犀角散　解毒防風湯　犀角玄參湯

大青四物湯　犀角大青湯　當歸丸

黑膏　葛根橘皮湯　漏蘆連翹湯

猪膽雞子湯　黃連一物湯　五物木香湯

孫兆山梔散　豌豆瘡塗方　犀角大青湯

黃連解毒湯　加減三黃石膏湯

調中湯　大建中湯　人參三白湯

狐惑

治䘌桃仁湯　黄連犀角湯　雄黄丸
雄黄鋭散
百合病
百合知母湯　百合代赭石湯
百合雞子湯　百合地黄湯
治百合病一月不觧變成渴者百合洗方
栝蔞牡蠣散　百合滑石散　百合散
兩感
大羌活湯
帙之七

勞復食復
枳實梔子豉湯　補脾湯
麥門冬湯　牛乳飲　燒鼈甲散
雄鼠屎湯　七味葱白湯　千金方
補中益氣湯　竹皮湯　千金赤衣散
瘥後諸病
牡蠣澤瀉散　竹葉石膏湯　茯神散
龍齒丸　温膽湯　加味温膽湯
柴胡湯　鼈甲散
治傷寒後虚羸汗出不止方
治大病差後多虚汗方　紫菀散
牡蠣散　羚羊角丸　二瀝湯
人參湯　訶黎勒丸　黄連丸
訶黎勒飲　燥腸丸　傷寒後腰痛方
杜仲酒　梔子烏梅湯　千金治豌豆瘡方
連翹敗毒散　消毒救苦散　内托消毒散
當歸六黄湯　加味黄芪建中湯
滋陰補腎丸　加味補陰丸　硃砂安神丸
加味枳术丸　六君子湯　養脾湯
健脾散

陰陽易
燒裩散　青竹茹湯　妙香丸
百一蚯蚓方　豭鼠屎湯　當歸白术湯
韭根散　乾薑散　二灰散
傷寒四時不同
冬為傷寒
春為温病
升麻解肌湯　升麻葛根湯　柴胡升麻湯
三黄石膏湯
夏為暑

桂枝石膏湯　梔子升麻湯　蒼朮石膏湯
桔梗散
秋為瘧
一歲長幼相似為疫
宜補宜散宜降方　柴胡石膏湯
老君神明散　聖散子　崔文行解散
藜蘆散　鷄子湯　雄黃丸
螢火丸　治時疫不相傳染方
人中黃方　神効沃雪湯
多眠多汗脉浮為風温

萎蕤湯　又方　知母乾葛湯
防已湯　括蔞根湯　葛根龍膽湯
一身盡痛為濕
麻黃杏仁薏苡仁甘草湯　麻黃加朮湯
痓
婦人傷寒
桂枝加芍藥湯　麻黃加生地黃湯
乾薑柴胡湯　小柴胡加地黃湯
小柴胡加牡丹皮湯
小柴胡加芒硝大黃湯

桂枝加附子紅花湯　甘草芍藥湯
黃芪解肌湯　表虛六合湯　表實六合湯
風濕六合湯　升麻六合湯　柴胡六合湯
大黃六合湯　人參六合湯　厚朴六合湯
梔子六合湯　石膏六合湯　茯苓六合湯
琥珀六合湯　膠艾六合湯　附子六合湯
四物大黃湯　安胎方　桂枝芍藥當歸湯
芍藥湯　阿膠散　白朮散
葱白湯　紫蘇散　芎蘇散
護胎方　梔子大青湯　竹葉湯

玉露散
小兒傷寒
大青膏　雄黃膏　惺惺散
人參羌活散　七寶散　麻黃黃芩湯
升麻黃芩湯　大黃丸　薄荷散
枳殼半夏湯　藿香正氣散
小建中去桂加黃芪人參地黃湯
帙之八
脉法　藥性
目録畢

傷寒證治準繩帙之一

金壇王肯堂輯　門人南昌張綍校

總例（四時傷寒不同　傳變　上下大法　可汗　不可汗　可下　不可下　可吐　不可吐　愈解　死證　陰陽　表裏）

四時傷寒不同　陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也　冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳　其傷於四時之氣皆能為病（即不即時行之氣）　以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也　中而即病者名曰傷寒不即病寒毒藏于肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也（內經曰先夏至日為溫病後夏至日為暑病溫暑之病本傷於寒而得之故大醫均謂之傷寒也）　是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸寒所致非時行之氣也（古人云夏月發熱惡寒頭疼身重肢節疼痛其[illegible]者是也冬傷於寒[illegible]暑氣不發為熱病）　凡時行者春時應煖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也（[illegible]相似傷寒其氣之異）　夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之

四時八節二十四氣七十二候決病法

立春正月節斗指艮　雨水正月中指寅

驚蟄二月節指甲　春分二月中指卯

清明三月節指乙　穀雨三月中指辰

立夏四月節指巽　小滿四月中指巳

芒種五月節指丙　夏至五月中指午

小暑六月節指丁　大暑六月中指未

立秋七月節指坤　處暑七月中指申

白露八月節指庚　秋分八月中指酉

寒露九月節指辛　霜降九月中指戌

立冬十月節指乾　小雪十月中指亥

大雪十一月節指壬　冬至十一月中指子

小寒十二月節指癸　大寒十二月中指丑

（二十四氣節有十二中氣有十二五日為一候氣亦同合有七十二候決病生死此須洞解之也）

九月霜降後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以氷雪解而為雨水故也至二月驚蟄節後氣漸和煖向夏大熱至秋便涼（此為四時正氣）　從霜降以後至春分以前凡有觸冒氷雪體中寒即病者謂之傷寒也九月十月寒氣尚微為病則輕十一月十二月寒冽已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也（此為四時正氣中而即病者也）　其冬有非節之煖者名曰冬溫冬溫之毒與傷

寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重爲治不同證如後章

從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱爲病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變爲溫病

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病

熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣也 然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也

但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳是以彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後一陽氣下一陰氣上也斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也陰陽交易人變病焉此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也小人觸冒必嬰暴疹須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取之是以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必病瘧秋傷於濕冬必欬嗽冬傷於寒春必病溫此必然之道可不審明之 傷寒之病逐日淺深以施方治 經曰未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已 今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨時消息制方無不效也

今採仲景舊論錄其證候診脉聲色對病眞方有神驗者擬防世急也 仲景之書逮今千年而顯用於世者王叔和之力也 又土地溫涼高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟者臨病之工宜須兩審也

人患[illegible]熱治之
[illegible]地氣
[illegible]又一
[illegible]寒暖
[illegible]中寒之寒也
[illegible]其氣溫寒理殊

王夫傷於寒有即病者焉有不即病者焉即病者發於所感之時不即病者過時而發於春夏也即病謂之傷寒不即病謂之溫與暑夫傷寒溫暑其類雖殊其所受之原則不殊也由其原之不殊故一以傷寒而爲稱由其類之殊故施治不得以相混以所稱而混其治宜乎貽禍後人以歸咎於仲景之法而委廢

其大半也吁可謂溺井怨伯益失火怨燧人矣夫法也方也仲景專爲即病之傷寒設不兼爲不即病之溫暑設也後人能知仲景之書本爲即病者設不爲不即病者設則尚恨其法散落所存不多而莫能禦夫蠱工妄治之萬變果可憚煩而或廢之乎今人雖以治傷寒法治溫暑亦不過借用耳非仲景立法之本意也雖然豈特可借以治溫暑而已凡雜病之治莫不可借也今人因傷寒治法可借以治溫暑遂謂其法通爲傷寒溫暑設吁此非識流而昧源者歟請以證之夫仲景之書三陰經寒證居熱證什之七八

彼不即病之溫暑但一於熱耳何由而爲寒哉夫惟後人以仲景書通爲傷寒溫暑者設遂致諸溫劑皆疑焉而不敢用韓祇和雖覺桂枝湯之難用但謂今昔之世不同然未悟仲景書本爲即病之傷寒設也且其著微旨一書又純以溫暑作傷寒立論而即病之傷寒反不言及又以夏至前胸膈滿悶嘔逆氣塞腸鳴腹痛身體拘急手足逆冷等證視爲溫暑謂與仲景三陰寒證脈理同而證不同遂別立溫中法以治夫仲景所叙三陰寒證乃是冬時即病之傷寒故有此證今欲以仲景所叙三陰寒證求對於春夏溫暑

之病不亦惛乎以余觀之其胸膈滿悶嘔逆氣塞等證若非内傷冷物則不正暴寒所中或過服寒藥所變或内外俱傷於寒之病也且祇和但曰寒而當溫然未嘗求其所以爲寒之故能求其故則知溫暑本無寒證矣朱奉議作活人書累數萬言於仲景傷寒論多有發明其傷寒即入陰經爲寒證者諸家不識而奉議識之但惜其亦不知仲景專爲即病者立法故其書中每每以傷寒溫暑混雜議論竟無所别况又視傷寒論爲全書遂將次傳陰經熱證與即入陰經寒證牽合爲一立說且謂大抵傷寒陽明證宜下

少陰證宜溫而於所識卽入陰經之見又未免自相悖矣夫陽明證之宜下者固爲邪熱入胃其少陰證果是傷寒傳經熱邪亦可溫乎況溫病暑病之少陰尤不可溫也自奉議此說行而天下後世蒙害者不無矣迨夫成無已作傷寒論註又作明理論其表章名義纖悉不遺可謂善羽翼仲景者然卽入陰經之寒證又不及朱奉議能識况卽病立法之本旨乎宜其莫能知也惟其莫知故於三陰諸寒證止隨文解義而已未嘗明其何由不爲熱而爲寒也至於劉守眞出亦以溫暑作傷寒立論而遺卽病之傷寒其所

處辛凉解散之劑固爲昧者有中風傷寒錯治之失而立蓋亦不無桂枝麻黃雖用之惑也旣惑於此則無由悟夫仲景立桂枝麻黃湯之有所主用桂枝麻黃湯之有其時矣故其原病式有曰夏熱用麻黃桂枝之類熱藥發表須加寒藥不然則熱甚發黃或斑出矣（此說出於龐安常而朱奉議亦祖述之）殊不知仲景立麻黃湯桂枝湯本不欲用於夏熱之時也苟悟夫桂枝麻黃湯本非治溫暑之劑則羣疑氷泮矣何也夫寒之初客於表也閉腠理鬱陽氣而爲熱故非辛溫之藥不能開腠理以泄其熱此麻黃湯之所由立也至於風邪

傷表雖反疎腠理而不能閉其邪旣客表則表之正氣受傷而不能流通故亦發熱也必以辛甘溫之藥發其邪則邪去而腠理自密矣此桂枝湯之所由立也其所以不加寒藥者蓋由風寒在表又當天令寒冷之時而無所避故也後人不知仲景立法之意故有惑於麻黃桂枝之熱有犯於春夏之司氣而不敢用於是有須加寒藥之論夫欲加寒藥於麻黃桂枝湯之中此乃不悟其所以然故如此耳若仲景爲溫暑立方必不如此必別有法但惜其遺佚不傳致使後人有多岐之患若知仲景傷寒論專爲卽病傷寒

作則知麻黃桂枝所以宜用之故除傳經熱證之外其直傷陰經與太陽不鬱熱卽傳陰經諸寒證皆有所歸著而不復疑爲寒藥誤下而生矣若乃春夏有惡風惡寒純類傷寒之證蓋春夏暴中風寒之新病非冬時受傷過時而發者不然則或是溫暑將發而復感於風寒或因感風寒而動乎久鬱之熱遂發爲溫暑也仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病觀此則知溫病不當惡寒而當渴其惡寒而不渴者非溫病矣仲景雖不言暑病然暑病與溫病同但復過一時而加重於溫病耳其不惡寒而渴則無異也

春夏雖有惡風惡寒表證其桂枝麻黄二湯終難輕用勿泥於發表不遠熱之語也於是用辛凉解散庶爲得宜苟不慎而輕用之誠不能免夫狂躁斑黄衄血之變而亦無功也雖或者行桂枝麻黄於春夏而効乃是因其辛甘發散之力偶中於萬一斷不可視爲常道而守之今人以敗毒散參蘇飲通解散百解散之類不問四時中風傷寒一例施之雖非至正之道較之不慎而輕用麻黄桂枝於春夏以致變者則反庶幾然敗毒散等若用於春夏亦止可治暴中風寒之證而已其冬時受傷過時而發之温病暑病則

不宜用也用則非徒無益亦反害之矣若夫仲景於三陰經每用温藥正由病之所必須與用之有其時耳若槩以三陰寒證視爲雜病而外之得無負於仲景濟人利物之至仁而誤後世乎自近代先覺不示傷寒温暑異治之端緒但一以寒凉爲主而諸温熱之劑悉在所略致使後之學者視仲景書欲仗焉而不敢以終决欲棄焉則猶以爲立法之祖而莫能外甚則待爲文具又甚則束之高閣而謂其法宜於昔而不宜於今由治亂動靜之殊治靜屬水亂動屬火故其温熱之藥不可用於今屬火之時也噫斯言也

其果然耶否耶但能明乎仲景本爲卽病者設法則桂枝麻黄自有所用諸温熱之劑皆不可略矣若謂仲景法不獨爲卽病者設則凡時行及寒疫温瘧風温等病亦通以傷寒六經病諸方治之乎傷寒例曰冬温之毒與傷寒大異爲治不同又曰寒疫與温及暑病相似但治有殊耳是則温暑及時行寒疫温瘧風温等仲景必别有治法今不見者亡之也觀其所謂爲治不同所謂温瘧風温温毒温疫脉之變證方治如説豈非亡其法乎决不可以傷寒六經病諸方通治也叔和搜采仲景舊論之散落者以成書功莫

大矣但惜其既以自已之説混於仲景所言之中又以雜脉雜病紛紜並載於卷首故使玉石不分主客相亂若先備仲景之言而欲附已説明書其名則不致惑於後人而累仲景矣余嘗欲編類其書以傷寒例居前而六經病次之相類病又次之差後病又次之診察治法治禁治誤病解未解等又次之其雜脉雜病與傷寒有所關者采以附焉其與傷寒無相關者皆删去如此庶幾法度純一而玉石有分主客不亂矣然有志未暇姑叙此以俟他日

傷寒温病熱病説有病因有病名有病形辨其因正

其名察其形三者俱當始可以言治矣且如傷寒此以病因而爲病名者也溫病熱病此以天時與病形而爲病名者也由三者皆起於感寒或者通以傷寒稱之夫通稱傷寒者原其因之同耳至於用藥則不可一例而施也何也夫傷寒盖感於霜降後春分前然不卽發鬱熱而發於春夏者也傷寒卽發於天令寒冷之時而寒邪在表閉其腠理故非辛甘溫之劑不足以散之此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也溫病熱病後發於天令暄熱之時怫熱自內而達於外鬱其腠理無寒在表故非辛凉或苦寒或酸苦之

劑不足以解之此仲景桂枝麻黃等湯獨治外者之所以不可用而後人所處水解散大黃湯千金湯防風通聖散之類兼治內外者之所以可用也夫卽病之傷寒有惡風惡寒之證者風寒在表而表氣受傷故也後發之溫病熱病有惡風惡寒之證者重有風寒新中而表氣亦受傷故也若無新中之風寒則無惡風惡寒之證故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病溫病如此則知熱病亦如此是則不渴而惡寒者非溫熱病矣然或有不因新中風寒亦見惡風惡寒之證者盖病人表氣本虛熱達於表又重傷

表氣故不禁風寒非傷風惡風傷寒惡寒也但衞虛則惡風榮虛則惡寒耳且溫病熱病亦有先見表證而後傳裏者盖怫熱自內達外熱鬱腠理不得外泄遂復還裏而成可攻之證非如傷寒從表而始也或者不悟此理乃於春夏溫病熱病而求浮緊之脉不亦踈乎殊不知緊爲寒脉有寒邪則見之無寒邪則不見也其溫病熱病或見緊脉者乃重感不正之暴寒與內傷過度之冷食也豈其本然哉又或者不識脉形但見弦便呼爲緊斷爲寒而妄治盖脉之盛而有力者每每兼弦豈可錯認爲緊而斷爲寒夫溫病

熱病之脉多在肌肉之分而不甚浮且右手反盛於左手者誠由怫熱在內故也其或左手盛或浮者必有重感之風寒否則非溫病熱病自是暴感風寒之病耳凡溫病熱病若無重感表證雖間見而裏病爲多故少有不渴者斯時也法當治裏熱爲主而解表兼之亦有治裏而表自解者余每見世人治溫熱病雖誤攻其裏亦無大害誤發其表變不可言此足以明其熱之自內達外矣其間有誤攻裏而致大害者乃春夏暴寒所中之疫證邪純在表未入於裏故也不可與溫病熱病同論夫惟世以溫病熱病混稱傷

寒故每執寒字以求浮緊之脈以用溫熱之藥若此者因名亂實而戕人之生名其可不正乎又方書多言四時傷寒故以春夏之溫病熱病與秋冬之傷寒一類視之而無所別夫秋冬之傷寒真傷寒也春夏之傷寒寒疫也與溫病熱病自是兩途豈可同治乎此弊之來非一日矣雖然傷寒與溫病熱病其攻裏之法若果是以寒除熱固不必求異其發表之法斷不可不異也況傷寒之直傷陰經與太陽雖傷不及鬱熱即傳陰經為寒證而當溫者又與溫病熱病大不同其可妄治乎或者知一不知二故謂仲景發表藥今不可用而攻裏之藥乃可用嗚呼其可用不可用之理果何在哉若能辨其因正其名察其形治法其有不當者乎彼時行不正之氣所作及重感異氣而變者則又當觀其何時何氣參酌傷寒溫熱病之法損益而治之尤不可例以仲景即病傷寒藥通治也

傳變凡傷於寒則為病熱熱雖甚不死[illegible]若兩感於寒而病者必死[illegible]尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脈上連風府故頭項痛腰脊強[illegible]尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥[illegible]尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾[illegible]○高文莊本作脈從巔入絡耳

此三經皆受病未入於府者可汗而已[illegible]尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾[illegible]尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴[illegible]

五六日[illegible]發人傷于[illegible]口燥舌乾而渴[illegible]三日[illegible]少陰者[illegible]發下陽[illegible]三日太陽[illegible]證者宜攻少陰[illegible]陽邪發熱[illegible]尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮[illegible]此三經皆受病已入於府可下而已[illegible]

若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讝語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行府藏不通而死矣[illegible]

故云不知人三日其[illegible]乃盡故死矣[illegible]六經俱病榮衛之氣不得行[illegible]上下至[illegible]

傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脉數急者為傳也[illegible]

傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也[illegible]

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也[illegible]

問曰傷寒三日脉浮數而微病人身溫和者何也答曰此為欲解也以夜半脉浮而解者濈然汗出也脉浮而解者必能食也脉不浮而解者必大汗出也

三日少陽脉小欲已也[illegible]

其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病

囊縮少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也　太陽
病頭痛至七日已上自癒者行其經盡故也若欲再傳
經者針足陽明使不傳則癒
六七日脉至皆大煩而口噤不言躁擾者必欲解也
傷寒六七日無大熱其人躁煩此為陽去入陰故也
若過十三日已上不間尺寸陷者大危
若更感異氣變為他病者當依舊壞證而治之　若脉
陰陽俱盛重感於寒者變為溫瘧尺寸俱盛先熱後寒
散　陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變為風溫
陽脉洪
數陰脉實大者遇溫熱變為溫毒為病最重也
陽脉濡弱陰脉弦緊者更遇溫氣變為溫疫以冬傷
於寒發為溫病脉之變證方治如說見後條
藏傷寒先犯太陽以次而傳此特言其槩耳然其中
變證不一有發於陽即少陰受之者有夾食傷寒食
動脾脾太陰之經一得病即腹滿痛者亦有不循經
而入如初得病便犯陽明之類不皆始於太陽也亦
有首尾止在一經不傳他經亦有止傳一二經而止
若不必盡傳諸經也至如病之蹄越不可泥於次序

當隨證施治所以傷寒得外證為多仲景云日數雖
多有表證者猶宜汗日數雖少有裏證者即宜下
海陽中之陰水太陽是也為三陽之首能循經傳亦能
越經傳　陽中之陽土陽明是也陽明為中州之主主
納而不出如太陽傳至此名曰循經傳也　陽中之陽
木少陽是也上傳陽明下傳太陰如太陽傳至此為越
經傳　陰中之陰土太陰是也上傳少陽為順下傳少
陰為逆如傳少陰為上下傳也如太陽傳太陰為誤下
傳也　陰中之陽火少陰是也上傳太陰為順下傳厥
陰為逆如太陽至此乃表傳裏也　陰中之陰木厥陰
是也上傳少陰為實再傳太陰為自安
海太陽者巨陽也為諸陽之首膀胱經病若渴者自入
于本也名曰傳本　太陽傳陽明胃土者名曰循經傳
為發汗不盡利小便餘邪不盡透入于裏也　太陽傳
少陽膽木者名曰越經傳也為元受病脉浮自汗宜用
麻黃湯而不用故也　太陽傳太陰脾土者名曰誤下
傳為元受病脉緩有汗當用桂枝而反下之所致也當
病腹痛四肢沉重　太陽傳少陰腎水名曰表傳裏為
邪為當下而反不攻不發所以傳裡也　太陽傳厥陰
肝木者為陰不至於首惟厥陰與督脉上行太陽相接

名循經得度傳
矣夫傷寒六經為病陰陽虛實或冷或熱者無非客邪之所為也內經言人傷於寒則為病熱者言常而不言變也仲景謂或寒或熱而不一者備常與變而弗遺也蓋陽邪傳者常也陰邪傳者變也且夫陽邪以日數次第而傳者一二日太陽二三日陽明三四日少陽四五日太陰五六日少陰六七日厥陰也七日經盡當汗出而解七日不解為之再經二七日不解為之過經過經不解則為壞病華佗云傷寒一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日在腹六日入胃乃傳裏也其治例

曰在皮膚者汗之在肌肉者和之在胸者吐之在腹入裏者下之也傷寒賦曰一二日可發表而散三四日可和解而痊五六日便實方可議下若表裏類同也殊不知此皆大約之法言常而不言變也蓋寒之傷人初無定規或中於陰或中於陽也經云一二日發熱脈沉者少陰病也又一二日口中和背惡寒者少陰病也此皆直中陰經之寒非常而為變也活人書曰凡寒邪自背而入或中太陽或中少陰自面而入或中陽明之類亦不專主於太陽也又曰寒邪首尾只在一經而不傳者有之有間傳一二經者有傳過一經而不再傳者亦

有足經寃熱而傳入手經者有誤服藥而致傳變者多矣故經曰一日太陽受之脈靜者為不傳也若脈數急躁煩欲吐者傳也又曰二三日陽明少陽病不見者為不傳又曰太陽病脈浮緊身疼痛發熱七八日不解此表證仍在當發其汗又少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯此皆不以日數而言也守真曰諸數二三日便以大承氣下之蓋聖人書不盡言言不盡意說其大槩而已蓋太陽為諸經之首傳變居多且熱邪乘虛之經則傳也若經實則不受邪而不傳也且夫太陽水傳陽明土乃妻傳夫謂之微邪陽明土傳少

陽木亦曰妻傳夫乃微邪也少陽木傳太陰土乃夫傳妻謂之賊邪太陰土傳少陰水亦曰夫傳妻乃賊邪也少陰水傳厥陰木母傳子謂之虛邪太陽水間傳少陽木乃母傳子亦曰虛邪也太陽水越經而傳太陰土謂之微邪又曰誤下傳也太陽水傳少陰水此乃陰陽雙傳即兩感也太陽水傳厥陰木乃母傳子謂之虛邪又曰首尾傳也夫傷寒傳至厥陰肝經為尾蓋厥者盡也正氣將復而邪氣將解水升火降寒熱作而大汗解也若正氣不復邪無從解陰氣勝極則四肢厥冷舌卷耳聾囊縮不知人而死矣趙氏曰大抵邪在陽經則易治

傳入陰經則危殆蓋陽微而陰盛正虛而邪實也況誤下内陷汗虛別經則壞異傾危可立而待凡治傷寒之要須讀仲景之書求其立法之意不然則疑信相雜未免通此而礙彼也熟讀詳玩其例自見則治法不差矣若不得其例而執論尊方膠柱鼓瑟謬誤其可免哉許氏有曰讀仲景書用仲景法未嘗守仲景方可謂得古人心矣學者可不於片言隻字玩索其意與幸相與勉之

陶氏曰傷寒傳足不傳手經者俗醫之謬論也夫人之氣自平旦會于膻中朝行手太陰肺以次分布諸經所以一脈愆和則百脈皆病彼云傳足不傳手者何

所據乎蓋傷寒者乃冬時感寒即病之名也在時則足太陽少陰正司其令觸冒之者則二經受病其次則少陽厥陰繼冬而司春令而亦受傷何也蓋風木之令起於大寒節正當十二月中至春分後方行溫令故風寒亦能傷之足陽明太陰中土也與冬時無預而亦傷之何也紫陽朱子曰土無定位無成名無專氣寄旺于四季能終始萬物則四時寒熱溫涼之氣皆能傷之也況表邪傳裏必歸於脾胃而成燥糞用承氣湯以除去之胃氣和矣手之六經上於夏秋故不傷之足之六經蓋受傷之方分境界也若言傷足不傷手則可以為傳足不傳手則不可也況風寒之中人先入榮衛晝夜循環無所不至豈間斷於手經哉發明曰傷寒受病之由皆出熱論一篇而已何獨傳足而不傳手何也蓋傷寒病冬月得之足太陽膀胱為首次至足厥陰肝經為尾此病惟傷北方及東方與戊土上有足陽明胃濕之專位兼丑上有足太陰脾土之專位蓋足之六經皆在東北之方經云冬傷于寒即發者為傷寒春發為溫病夏發為溫疫為病最重此之謂也仲景云無奇經則無傷寒緣奇經皆附足六經不附手經是以寒邪只傷足經也長夏為大熱病者夏火既旺火之方與秋之分皆手經

居之水方與春之分皆足經不足及夏火旺客邪助于手經則不足者愈不足矣故所用之藥皆泄有餘而非足經藥何者泄有餘則不足者補矣此傷寒先言足經而不言手經也大意如此至于傳手經者亦有之矣

此事難知曰傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嚥終日不與則不思六脈細數而不洪大心下不痞腹中不滿大小便如常或傳十日已來形貌如醉人醫見神昏不已多用承氣湯下之誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何經而來答曰本太陽經傷風風

為陽邪陽邪傷衛陰血自燥熱蓄膀胱壬病逆傳于丙丙丁兄妹由是傳心心火自上迫而熏肺所以神昏也謂肺為清虛之藏內有火邪致令神昏宜梔子黃芩黃連湯若脉在丙者導赤散脉在心者瀉心湯若悞用凉膈散乃氣中之血藥也如左手寸脉沉滑有力者則可用之或用犀角地黃湯近于是也本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中熱藥若脉浮沉俱有力者是丙丁中俱有熱也可以導赤瀉心各半服之則宜矣此證膀胱傳丙足傳手經也下傳上也丙傳丁也表傳裏也壬傳丁者坎傳離也越經傳也

又謂府傳藏也活人云傷寒傳足不傳手此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳一二經不可拘以始太陽終厥陰也但憑脉與外證治之此活法也與食則噦者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也熱邪既不在胃誤與承氣湯下之其死也必矣　按傷寒本只傳足經已上又例傳手經之義可謂發病機之秘矣蓋只是邪蘊日久因足經實手經虛故冤熱耳有因汗下差悞而傳有因七情或勞倦等而致者有之大抵傳手經必有所因所以古人有救逆復脉等法豈但切中病情實啓後人之義例耳

汗下大法　凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有温覆而當不消散者不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣　夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里吉凶

之機應若影響豈容易哉況桂枝下咽陽盛即斃承氣入胃陰盛以亡死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源為治乃誤使病者殞沒自謂其分至今冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟　凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷用意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習之榮而莫見此傾危之

則惜明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉
凡發汗溫暖湯藥其方雖言日三服若病劇不解當促
其間可半日中盡三服若與病相阻卽便有所覺病重
者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在故當復
作本湯服之至有不肯汗出服三劑乃解若汗不出者
死病也　服桂枝湯大汗出脈洪大者復與桂枝湯如
前法　發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗 [illegible]　凡服
[illegible]
湯藥發汗中病卽止不必盡劑吐下亦如之
許記一鄕人傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒醫者用

巴豆下之頃得溏利宛然如舊予觀之陽明結熱在
裏非大柴胡承氣不可巴豆止去積不能蕩滌邪熱
蘊毒亟進大柴胡等三服得汗而解嘗謂仲景一百
一十三方爲丸者有五理中陷胸抵當烏梅麻仁是
以理中陷胸抵當皆大如彈子煮化而服與湯散無
異至於麻仁治脾約烏梅治濕䘌皆用小丸以達下
部其他逐邪毒破堅癖導瘀血潤燥糞之類皆憑湯
劑未聞用巴豆小丸藥以下邪氣也旣下而病不除
不免重以大黃芒硝下之安能無損也哉
凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈

[illegible]

[illegible]　太陽病三日已發汗若吐若下
若溫針仍不解者此爲壞證桂枝不中與也觀其脈證
知犯何逆隨證治之
活未滿三日可汗而已滿三日者可泄而已此大略
言之耳凡病人有虛有實邪氣傳受遲速不同豈可
拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈浮者猶
宜發汗日數雖少若有裏證而脈沉者卽宜下之正
應隨脈治之又況六氣之邪乘虛之經皆自背得之
則入太陽或入少陰自面感之則入陽明之類不必
皆始於太陽也兼寒邪有首尾止在一經或間傳一

二經不可以一理推但視脈與外證治之此活法也
假令有人脈浮頭項強痛發熱而惡寒每日如此不
以日數多少正是太陽經受之其餘經皆倣此大抵
傷寒惟憑脈與外證以汗下之若過日多脈尚大浮
數按之不足者尚責太陽也可發汗而愈若按之實
者汗之必死須下之而愈也若始病脈沉細數外證
或腹滿咽乾或口燥舌乾而渴爲熱正責屬裏可下
之而愈若無此證表熱脈沉誤下者必死須用麻黃
附子甘草麻黃細辛附子湯少發汗以治之此皆仲
景之確論也

夫傷寒要緊處在分表裏而為汗下有病人自汗自下者有醫用藥汗之下之者中間節目頗多汗藥宜早下藥宜遲此亦大綱之論耳且如失血家不可發汗淋家不可發汗如此等類豈宜遽用表劑當徐徐解散苟或不當汗而強汗則津液耗竭變生百病因茲夭傷豈可一以汗藥宜早為說陽明汗出而多宜急下少陰下利而渴宜急下厥陰舌卷囊縮宜急下如此等證當用速利之劑苟或當下而不下則熱毒轉深遂致失下不可救療豈可一以下藥宜遲為說

凡傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當

緩三陰表當緩裏當急又曰脉浮當汗脉沉當下脉浮汗急而下緩謂三陽表也脉沉下急而汗緩謂三陰裏也麻黃湯謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有漬形以為汗謂汗之緩裡之表也又云在皮者汗而發之謂汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令附子麻黃細辛湯是少陰證始得發熱脉沉裏和無汗故漬形為汗今麻黃湯是太陽證頭項痛腰脊強脉浮無汗裏和是也在皮者汗而發之可也經曰治主以緩治客以急此之謂也

假令得肝脉其外證善潔面青善怒其三部脉俱弦而浮惡寒裡和清便自調麻黃湯內加羌活防風各三錢謂肝主風是膽經受病也大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也　假令得心脉其外證面赤口乾善笑其尺寸脉俱浮而洪惡寒裡和清便自調麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂心主熱是小腸受病也　假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味尺寸脉俱浮而緩裡和惡寒麻黃湯內加白术防風各三錢謂脾主濕是胃經受病也　假令得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其尺寸脉俱浮而澀裏和惡

寒麻黃湯內加桂枝生薑各三錢謂肺主燥是大腸受病也　假令得腎脉其外證面黑善恐欠尺寸脉俱沉而裏和惡寒麻黃湯內加附子生薑各三錢謂腎主寒是膀胱受病也

已上五證皆表之表也謂在皮者急汗而發之皆府受病也表之裏者下之當緩謂隨藏表證外顯尺寸脉俱浮而復有裏證謂發熱飲水便利赤色或洩下赤水其脉浮按之內實或痛麻黃湯方去麻黃杏仁隨藏元加藥同煎分作五服每下一證初一服加大黃五分如邪未盡又加大黃一錢未盡再加大黃一

錢半直候邪盡則止此先緩而後急是表之裏宜下
之當緩也
假令得肝脉其内證滿悶淋澀便難轉筋其尺寸脉
俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黄附子細辛湯内
加羌活防風各三錢　假令得心脉其内證煩心心
痛掌中熱而噦其尺寸脉俱沉裏和惡寒心經受病
於前湯内加黄芩石膏各三錢　假令得脾脉其内
證腹滿脹食不消怠惰嗜卧其尺寸脉俱沉裏和惡
寒脾經受病加白术防已各三錢　假令得肺脉其
内證喘欬洒淅寒熱其尺寸脉俱沉裏和惡寒肺經

受病加生薑桂枝各三錢　假令得腎脉其内證泄
瀉下重足脛寒而逆其尺寸脉俱沉裏和惡寒此腎
經受病加薑附各三錢
已上五證裏之表也宜清形以爲汗皆藏受病也裏
之裏者下之當急謂隨藏内證已顯尺寸脉俱沉而
復有表證謂小便赤大便秘澁或瀉下赤水或瀉或
欬不能飲食不惡風寒發熱引飲其脉俱沉按之内
實而痛此謂裏實宜速下之麻黄附子細辛湯内去
麻黄隨藏元加藥同煮分作三服每下一證初一服
加大黄三錢邪盡即止如邪未盡第二服加大黄二

錢又未盡第三服加大黄一錢此先急而後緩是表
之裏也宜速下之
可汗大法春夏宜汗　凡發汗欲令手足俱周時出似
漐漐然一時間許益佳不可令如水流離若病不解當
重發汗汗多者必亡陽陽虚不得重發汗也　凡服湯
發汗中病便止不必盡劑也　凡云可發汗無湯者丸
散亦可用要以汗出爲解然不如湯隨證良驗
太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解　脉浮而數者
可發汗　陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可
發汗　夫病脉浮大問病者但言便鞕耳設利者爲大

逆鞕爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解　傷寒其
脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉浮
解之當汗出愈　病人煩熱汗出即解又如瘧狀日晡
所發熱者屬陽明也脉浮虚者當發汗　病常自汗出
者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧
和故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈
病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不
和也先其時發汗則愈　太陽病不解熱結膀胱其人
如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解其
外　太陰病脉浮者可發汗　傷寒不大便六七日頭

病有熱者與承氣湯其小便清者一云大 知不在裏續
在表也當須發汗若頭痛者必衄 下利腹脹滿身體
疼痛者先溫其裏乃攻其表 下利後身疼痛清便自
調者急當救表 太陽病頭痛發熱汗出惡風寒者
太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出
嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者 太陽病
發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者
太陽病下之後其氣上衝者 以上並屬桂枝湯證
太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與
桂枝湯則愈 燒針令其汗針處被寒核起而赤者必

發奔豚氣從少腹上撞心者灸其核上各一壯與桂枝
加桂湯 太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚
朴杏子湯

麻黃證
脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮
衛俱病骨節煩疼可發其汗 傷寒脈浮緊不發汗因
致衄者 陽明病脈浮無汗而喘者 太陽病脈浮緊
無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在當復發汗服
湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者
陽氣重故也 脈浮者病在表可發汗 太陽病頭痛
發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者 太陽與
陽明合病喘而胸滿者 陽明中風脈但浮無餘證者
太陽病十日以去脈但浮者 以上並屬麻黃湯證
少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯
少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三
日無證故微發汗也

大青龍證
太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者
大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之
則厥逆筋惕肉瞤此為逆也 傷寒脈浮緩身不疼但
重乍有輕時無少陰證者可與大青龍湯發之

小青龍證
傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或

噎或小便不利少腹滿宜小青龍湯 傷寒心下有水
氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也宜
小青龍湯

葛根證
太陽病項背強几几反汗出惡風者宜桂枝加葛根湯
太陽病項背強几几無汗惡風者宜葛根湯 太陽
與陽明合病必自下利不嘔者宜葛根湯 太陽與陽
明合病不下利但嘔者宜葛根加半夏湯 太陽病桂
枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出
者宜葛根黃芩黃連湯

小柴胡證
陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按

之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解過十日脈續浮者與小柴胡湯　太陽病十日以去脈浮而細嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯　中風往來寒熱傷寒五六日以後胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食煩心喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者宜小柴胡湯　傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者宜小柴胡湯　傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

脈浮小便不利微熱消渴者與五苓散利小便發汗

張仲景之書曲盡其妙凡為汗證關防無所不備且如太陽中風桂枝湯主之加喘者桂枝加厚朴杏子湯主之几几有汗惡風者桂枝加葛根湯主之若形如瘧狀日二三度發者桂枝麻黃各半湯主之日再發者桂枝二麻黃一湯主之脈微弱者不可汗桂枝二越婢一湯主之至于傷風几几無汗惡風者葛根湯主之惡風無汗而喘者麻黃湯主之復加煩躁者大青龍湯主之隨其所感輕重具衆理以應之可見汗證中閒其閒詳整盖無所不至矣

活傷寒脈浮而緊身體拘急惡寒無熱寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足四末微厥此麻黃證也

傷寒脈浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼惡風寒多熱少其面光而不慘煩躁手足不冷此桂枝證也　傷寒者脈緊而濇傷風者脈浮而緩傷寒無汗傷風有汗傷寒畏寒不畏風傷風畏風不畏寒大抵太陽病者必脈浮發熱惡風惡寒惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風而憎寒也　六經皆有傷風傷寒其證各異太陽脈浮有汗為中風脈緊無汗為傷寒陽明善饑為中風不食為傷寒少陽兩耳聾目赤

胸滿而煩為中風口苦咽乾目眩為傷寒若三陰傷風無變異形證但四肢煩疼餘證同三陽也　傷風見寒脈者發熱惡風煩躁手足溫而脈反浮緊蓋發熱惡風煩躁手足溫為中風候脈浮緊為傷寒候也

傷寒見風脈者寒多熱少不煩躁手足微厥而脈反浮緩蓋多熱少寒不煩躁手足微厥為傷寒候脈浮緩為中風候也

夫傷寒發表須當隨證輕重而汗之故仲景有發汗者有和解者發汗如麻黃湯桂枝湯大青龍湯是也和解如小青龍湯桂枝麻黃各半湯白虎湯桂枝二

越婢一湯柴胡桂枝之類是也後人不能深究寒邪淺深藥性緊慢一槩用藥因致夭傷其間縱或生全往往汗後虛乏遂至勞役或變成百病淹引歲月卒至不救此皆由汗下過度陰陽並竭血氣羸損以致此禍如遇病輕但當和解之所謂和其榮衛以通津液令其自解可也　丹溪治傷寒表證用補中益氣湯發散海藏用神术湯白术湯九味羌活散發散此皆和解之意不使真氣散失也

傷寒連服湯劑而汗不出者如中風法蒸之使溫熱之氣於外迎之無不得汗其法用薪火燒地良久掃去以水洒之取蠶沙柏葉桃葉糠麩皆鋪燒地上可側手厚上鋪席令病人當上卧溫覆之移時汗立至候周身至脚心漐漐乃用溫粉撲之汗止上床最得力者蠶沙桃栢葉也糠麩乃助其厚多少隨用

凡感冒風寒頭痛惡寒拘急者用葱白連根一握生薑五片陳皮一塊細茶一撮白梅一箇用水二鍾煎至一鍾乘熱熏頭目飲下以衣溫覆取汗如急用以白沸湯泡蓋定候味出服之亦佳或葱白一握淡豆豉半合湯泡服之佳或紫蘇葱白生薑湯亦可或只一味紫蘇煎湯與之亦能發汗也　又方七沸湯用水七碗燒鍋令赤熱投水于中取起再燒熱又以水投之如此七次取湯一碗乘熱飲之以衣被溫覆取汗神効　治傷寒汗不出搐脚法用海蛤粉烏頭各二兩穿山甲三兩爲末酒糊和丸大一寸許捏扁置患人足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於煖室取熱湯浸脚至膝下久則水溫又添熱水候遍身汗出爲度凡一二日一次浸脚以知爲度

不可汗脉沉爲在裏而反發其汗則津液越出大便難表虛裏實久則譫語也　脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之以榮氣不足血少故也昔人云先以小建中湯加黃芪如尺脉尚遲再作一劑却服柴胡桂枝二越婢一湯[illegible]

證一鄉人丘生者病傷寒發熱頭疼煩渴脉雖浮數無力尺以下遲而弱予曰此雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯加當歸黃芪令飲翌日脉尚爾其家煎迫日夜督發汗藥幾不遜矣余忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜二服發狂須臾稍定略睡已中汗矣信知此事誠難仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日

若不循次第暫時得安損虧五藏以促壽限何足貴哉南史載范雲病傷寒恐不得預武帝九錫之慶召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便瘥甚易但恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可況二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於其上頃刻汗解撲以温粉翼日果愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限況不顧表裏不待時日便欲速效乎每見病家不耐病未三四晝夜促汗醫者隨情順意鮮有不敗事者予故書此以為戒

少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗　少陰病脉微不可發汗亡陽故也　脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠　動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水　動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤　動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端　動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前　咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足厥冷欲得踡臥不能自温　諸脉得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾（一云小便難胞中乾）胃躁而煩其形相象根本異源　脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得温微弦為虛不可發汗發汗則寒慄不能自還　欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩晬時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗踡而苦滿腹中復堅　厥脉緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不得前　諸逆發汗病微者難瘥劇者言亂目眩者死（一云讝言目眩睛亂者死）命將難全　太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多

寒少其人不嘔清便續自可一日二三度發脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗也　太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者無陽也不可發汗　咽喉乾燥者不可發汗　亡血不可發汗發汗則寒慄而振　衄家不可發汗汗出必額上陷脉急緊直視不能眴不得眠　汗家不可發汗發汗必恍惚心亂小便已陰疼宜禹餘粮丸（闕）　淋家不可發汗發汗必便血　瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痓　下利不可發汗汗出必脹滿　欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥逆冷　傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥

者後必熱厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而
反發汗者必口傷爛赤　傷寒脉弦細頭痛發熱者屬
少陽少陽不可發汗　傷寒頭痛翕翕發熱形象中風
常微汗出自嘔者下之益煩心懊憹如飢發汗則致痙
身強難以伸屈熏之則發黃不得小便久則發咳唾
太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞
鞕者不可發汗　太陽病發汗因致痙　少陰病欬而
下利讝語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰
汗也　少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從
何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭爲難治

永類鈐方云傷寒發汗有四難凡發熱頭疼有汗而
非無汗惡風而非惡寒例發其汗汗不止爲漏風間
有發而爲痙者此分外證發汗之一難也至於發熱
頭痛尺脉遲者爲榮虛血少不可發汗發熱頭痛脉
弦細屬少陽不可汗汗則譫語此分脉發汗之二難
也動氣在左不可汗汗則頭眩汗不止則筋惕肉瞤
動氣在右不可汗汗則衄而渴心煩飲則吐水動氣
在上不可汗汗則氣衝心動氣在下不可汗汗則無
汗心煩骨節疼此分內證發汗之三難也春宜汗不
可大發以陽氣尚微冬不大汗以陽氣伏藏汗之必
吐利口爛生瘡此知時發汗之四難也
可發汗　非身熱惡寒不
可發汗　非頭痛項強不可發汗
可發汗　非脉浮不可發汗
活其脉微弱或尺脉遲者不可表　其人當汗而衄
血者不可表　壞病者不可表　婦人經水適來者
不可表　風溫者不可表　濕溫者不可表　虛煩
者不可表　病人腹間左右上下有築觸動氣者不
可表
太陽咽乾鼻衄淋瀝小便不利皆不當汗已經發汗
不得重發如無已上忌證雖經發汗邪氣未盡亦當

重發之　當汗不汗則生黃其證爲風寒所傷陽氣
下陷入内而與寒水上行於經絡之間本當發汗以
徹其邪醫失汗之故生黃也脾主肌肉四肢寒濕與
内熱相合故生黃也　不當汗而汗爲畜血之證燥
火也當益津液爲上而反汗以亡之其毒擾陽之極
則侵陰也故燥血畜于胸中也　當汗而發汗過多
腠理開泄汗漏不止故四肢急難以屈伸也
可下大法秋宜下　凡可下者用湯勝丸散中病便止
不必盡劑也
下利三部脉皆平按之心下鞕者急下之　下利脉遲

而滑者內實也利未欲止當下之　少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之　少陰病六七日腹滿不大便者急下之　陽明少陽合病必下利其脉不負者為順也負者失也互相尅賊名為負也脉滑而數者有宿食當下之　問曰人病有宿食何以别之師曰寸口脉浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之　下利不欲食者以有宿食故也當下之　下利差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之　下利脉反滑當有所去下乃愈　脉雙弦而遲者必心下鞕脉大而緊者陽中有陰也可下之　陽明病讝語有潮熱反

不能食者胃中有燥屎五六枚也若能食者但鞕耳　得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下痞至四五日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不大便但初頭鞕後必溏此未定成鞕也攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之　陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也　二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈　病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也　大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也　以上俱屬大承氣湯證

陽明病發熱汗多者急下之　傷寒後脉沉沉者內實也下之解　太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但尺脉實者下之而解　病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之　傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者　傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者　以上俱屬大柴胡湯證

少陰病下利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之

病腹中滿痛者此為實也當下之　腹滿不減減不足言當下之　傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之　汗出讝語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早者語言必亂以表虛裏實故也下之愈　病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者可下之　以上俱屬大柴胡大承氣證

下利讝語者有燥屎也　陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語　以上但屬小承氣湯證　陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹

而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出
者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗出多微發熱惡
寒者外未解也桂枝湯主之其熱不潮未可與承氣湯
若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄
下　陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者
不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與
小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之
若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必
脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便
必復鞕而少也宜以小承氣湯和之不轉失氣者愼不

可攻也　陽明病譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯
主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉
氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也為
難治不可更與承氣湯
陽明病不吐不下心煩者屬調胃承氣湯
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外
未解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者
乃可攻之宜桃核承氣湯
太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發
狂者以熱在下焦少腹當鞕滿而小便自利者下血乃
愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之　太
陽病身黃脉沉結少腹鞕滿小便不利者為無血也小
便自利其人如狂者血證諦也　陽明證其人喜忘者
必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大
便反易其色必黑　以上俱抵當湯證　傷寒有熱少
腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之宜抵當
丸
陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出
身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者以瘀熱在裏
身必發黃宜下之以茵蔯蒿湯　傷寒七八日身黃如

橘子色小便不利腹微滿者亦屬茵蔯蒿湯證
但結胸無大熱者以水結在胸脇也但頭微汗出者
傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞕者
俱屬大陷胸湯　結胸者項亦強如柔痓狀下之則
和
太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗
出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔則短氣
汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯
[異]經言太陽病發熱汗出不解其人蒸蒸發熱者屬
胃也調胃承氣湯下之凡潮熱腹痛者大柴胡加厚

朴丁之凡陽明病汗多胃中必燥大便必鞕譫語小承氣湯若譫語脉滑而疾發潮熱者大柴胡湯凡譫語有潮熱不食者胃中必有燥屎五六枚小承氣湯若能食大便鞕者大承氣湯凡汗出譫語必有燥屎病調胃承氣湯凡潮熱手足漐漐然汗出大便難而譫語者大承氣湯凡五六日不大便繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎也調胃承氣湯凡曾經下後又六七日不大便煩熱不解腹滿痛者此有燥屎也大承氣湯病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘滿不能臥者有燥屎也大承氣湯凡吐後腹脹滿

者調胃承氣湯凡汗吐下後微煩小便數而大便鞕者小承氣湯凡腹滿不減者小承氣湯凡下利脉滑而數者有宿食也小承氣湯凡病腹中滿痛者有宿食也小承氣湯凡脉沉有力內實潮熱不解者大柴胡湯大抵下藥必切脉沉實或沉滑沉疾有力者可下也再以手按臍腹鞕者或叫痛不可按者則下之無疑也凡下後不解者再按臍腹有無鞕處如有手不可按下未盡也復再下之若下後噎中虛軟脉無力者此為虛也以參胡三白湯和之若發熱或潮熱或往來寒熱不解者宜小柴胡湯增損和之若煩熱

不得眠者宜竹葉石膏湯或十味溫膽湯

活傷寒裏證須看熱氣淺深故仲景有直下之者如大小承氣十棗大柴胡湯是也有微和其胃氣者如調胃承氣湯脾約丸少與小承氣微和之之類是也

虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者雖瀉勿大泄之此金匱語也故王叔和序傷寒有承氣之戒

短藥用大承氣湯最緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡湯又次之

活大承氣湯治大實大滿滿則胸腹脹滿狀若合瓦大實則不大便也痞滿燥實四證俱備則用之雜病

則進退用之

大黃治大實 芒硝治大燥此二味治有形血藥也

厚朴治大滿 枳實治痞此二味治無形氣藥也

小承氣湯治痞實而微滿狀若饑人食飽飯腹中無轉失氣即大承氣只去芒硝心下痞大便或通熱甚須可下宜此方 調胃承氣湯治實而不滿者腹如仰瓦腹中有轉失氣有燥糞不大便而譫語堅實之證宜用之

右已上三法不可差差則無者生之有者遺之假令調胃承氣證用大承氣下之則愈後元氣不復以其

氣藥犯之也若大承氣證用調胃承氣下之則愈後
神癡不清以其無氣藥也小承氣證若用芒硝下之
則或利不止變而成虛矣
〔三一承氣湯辨〕實則瀉之人所共知如緩急輕
重之劑則臨時消息焉如不惡寒反惡熱發渴譫語
腹滿而喘手足濈然汗出急下之宜大承氣湯如邪
未深恐有燥糞少腹痛小承氣湯試之腹中轉失氣
者有燥糞也乃可攻之不轉失氣者初鞕後溏尚未
可攻攻之則腹滿不能食若腹不通止與小承氣湯
微和胃氣勿令大泄如發汗不惡寒但實者胃實也

當和胃氣調胃承氣湯主之
〔成〕大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣
湯以熱不大甚故于大承氣湯中去芒硝又以結不
至堅故減厚朴枳實如不至大堅然邪熱已甚而須
攻下者亦未可投大承氣湯必以輕緩之劑攻之于
大承氣湯中減厚朴枳實加甘草乃輕緩之劑以調
胃也設若大承氣湯證反用調胃承氣湯下之則邪
氣不伏小承氣湯證反用大承氣湯下之則過傷正
氣而腹滿不能食故有勿大泄之戒此仲景所以分
而治之未嘗越聖人之制度後之醫者以此三藥合

而為一且云通治三藥之證及傷寒雜病內外一切
所傷若如此說與仲景之方甚相背戾且失軒岐緩
急之旨由是紅紫亂朱迷惑世人一唱百和使病者
暗受其弊將何所咎哉倘有公心審是者當于內經
仲景方中求之責使藥證相對以聖賢之心為心則
方之真偽自可得而知矣
〔瀉〕傷寒外證全是下證而脈反細不可下者瀉心湯
主之脈有力者黃連瀉心湯無力者半夏瀉心湯
〔不可下〕脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反
在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而

反躁煩濇則無血厥而且寒陽微則不可下下之則心
下痞鞕　動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻
乾頭眩心悸也　動氣在左不可下下之則腹內拘急
食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲踡　動氣在上不
可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自
灌　動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則
清穀心下痞也　咽中閉塞不可下下之則上輕下重
水漿不下臥則欲踡身急痛下利日數十行　諸外實
者不可下下之則發微熱亡脈厥者當齊握熱　諸虛
者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇　脈濡

而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽
運微爲陰寒上實下虛意欲得温微弦爲虛虛者不可
下也微則爲欬欬則吐涎下之則欬止而利因不休利
不休則胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘
息爲難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若氷眼
睛不慧語言不休而穀氣多入此爲除中口雖欲
言舌不得前　脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在
上數反在下浮爲陽虛數爲無血浮爲虛數生熱浮爲
虛自汗出而惡寒數爲痛振而寒慄微弱在關胸下爲
急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脅振寒相搏形

如瘧狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下爲痞
小便淋瀝少腹甚鞕小便則尿血也　脈濡而緊濡則
衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃
氣冷微嘔心內煩醫謂有大熱解肌而發汗亡陽虛煩
躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚
悵快不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲
水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出
而冒巔體惕而又振小便爲微難寒氣因水發清穀不
容間嘔變反腸出顛倒不得安手足爲微逆身冷而內
煩遲欲從後救安可復追還　脈浮而大浮爲氣實大

爲血虛血虛爲無陰孤陽獨下陰部者小便當赤而難
胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反
更實津液四射榮竭血盡乾煩而不眠血薄肉消而成
暴液醫復以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期
必下如汗泥而死　脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風
則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗而不
可下也　趺陽脈遲而緩胃氣如經也趺陽脈浮而數
浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也榮衛
內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞕氣噫而除何
以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便

鞕氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢
邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如
法病者則飢數脈不時則生惡瘡也　脈數者久數不
止止則邪結正氣不能復正氣卻結於藏故邪氣浮之
與皮毛相得脈數者不可下下之必煩利不止　少陰
病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺中弱濇者復不
可下之　脈浮大應發汗醫反下之此爲大逆也　脈
浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者
不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脈
遲尚未可攻　二陽併病太陽初得病時而發其汗汗

先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證
不罷者不可下下之爲逆　結胸證脉浮大者不可下
下之即死　太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下
太陽與少陽合病者心下鞕頸項強而眩者不可下
諸四逆厥者不可下之虛家亦然　病欲吐者不可下
太陽病有外證未解不可下下之爲逆　病發於陽
而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞
病脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞　夫病陽
多者熱下之則鞕　本虛攻其熱必噦　無陽陰強大
便鞕者下之必清穀腹滿　太陰之爲病腹滿而吐食

不下自利益甚時腹自痛下之必胸下結鞕　厥陰之
爲病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐蚘
下之利不止　少陰病飲食入口則吐心中嗢嗢欲吐
復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下
也　傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下此
亡血下之死　傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人
熏之則喘不得小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛
背強加溫針則衄　傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉
欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸大是其候也如此
者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛若熱多者目赤脉多睛

不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多便
清穀熱多便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若
小便利者可救之若小便難者爲危殆　傷寒發熱口
中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者
厥若下之咽中生瘡假令手足溫者必下重便膿血頭
痛目黃者若下之則目閉貪水者若下之其脉必厥其
聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之
則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白
胎煩躁脉數實不大便六七日後必便血若發汗則小
便自利也　得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心

下痞至四日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安
至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少雖不
大便但頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎
定鞕乃可攻之　藏結無陽證不往來寒熱其人反靜
舌上胎滑者不可攻也　傷寒嘔多雖有陽明證不可
攻之　陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕
者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少
與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻
之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之
必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大

作必復鞕而少也宜小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也　傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也　下利脉大者虚也以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴者　陽明病身合色赤不可攻之必發熱色黃者小便不利也　陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈　陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞕不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及豬膽汁皆可為導

云非陽明之本病不可下陽明本病胃家實故也

非痞滿燥實不可下　非潮熱發渴不可下　非罵詈親踈不可下　非脉沉數不可下　非棄衣而走登高而歌如見鬼狀不可下

浮脉浮者不可下　脉虛者不可下　惡寒者不可下　嘔吐者不可下　不轉失氣者不可下
也　小便清者不可下　大便堅小便數者不可用承氣湯攻之　大便鞕小便少者未可攻

陽明病自汗出若發汗小便自利者不可下宜用蜜煎導之

吴凡有惡風惡寒者凡腹滿時減時滿者凡腹脹滿可揉可按虛軟者凡陰虛勞倦凡手足逆冷尺脉弱者凡脉在表俱不可下凡脉沉不實不疾按之無力者凡亡血虛家及婦人經水適來適斷或熱入血室與夫胎前産後崩漏等證及小便頻數小便清而大便秘者俱不可下

𧹞陽明下證已具其人喘嗽或微惡寒為太陽陽明或往來寒熱為少陽陽明於陽明證中而有太陽少陽證未罷此非正陽明也須未可遽下所以古註陽明有三常須識此

可吐　大法春宜吐　凡用吐湯中病即止不必盡劑也

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕氣上撞咽喉不得息者此為有寒當吐之一云此以內有久痰宜吐之

病胸上諸實實一作寒　胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之吐之利則止　少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐者宜吐之　宿食在上脘者當吐之　病手足逆冷脉乍結以客氣在胸中心下滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之

吴凡病在膈上者脉大胸滿多痰者食在胃口脉滑

者俱宜吐之華佗謂傷寒三四日邪在胸中者宜吐之凡吐用瓜蒂散或淡鹽湯或溫茶湯與之如人弱者以人參蘆湯吐之亦可若痰多者以二陳湯一既乘熱與之以指探喉中即吐也凡老人怯弱與病勞內傷虛人并婦人胎前產後血虛脈弱小者皆不可吐凡藥發吐者如防風桔梗山梔只用一味煎湯溫服之則吐盡誤吐則損人上焦元氣為患非輕可不慎哉

不可吐 太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也若得病一二日吐之者

腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆 太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此為吐之內煩也 少陰病飲食入口則吐心中嗢嗢欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之 少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

四肢厥逆 虛家 新產 脈微 皆不可吐

愈解 問曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脈為陰陽和平雖劇當愈

凡得病厥脈動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈證也 脈浮數而致病人身溫和者欲解也

凡病反能飲水者為欲愈 太陰中風脈陽微陰濇而長者為欲愈 少陰中風脈陽微陰浮者欲愈 厥陰中風脈微浮者欲愈不浮未愈

太陽病巳至未解 陽明病申至戌解

少陽病寅至辰解 太陰病亥至丑解

少陰病子至寅解 厥陰病丑至卯解

問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則解也 病家人請云病人苦發熱身體疼病人自臥師到診其脈沉而遲者知其差也何以知之表有病者脈當浮大今反沉遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脈當沉而細今脈浮大故知愈也

問曰病有戰而汗出者因得解者何也答曰脈浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脈浮故當汗出而解也

若脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但出汗耳不發戰也　問曰病有不戰而汗出解者何也荅曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也

問曰病有不戰不汗出而解者何也荅曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液待陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也

右海藏云戰而後解者太陽也不戰有汗而解者陽明也不戰無汗而解者少陽也

太陽病未解脉陰陽俱停必先戰慄汗出而解陽微者汗解陰微者下解

海太陽傳陽明其中或有下證陽明證反退而無熱與不渴却顯少陽證是知可解也　太陽證知可解者爲頭不痛項不強肢節不痛則知表易解也　陽明證知可解者爲無發熱惡熱則知裏易解也　少陽知可解者寒熱日不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之于晏晏移之于早氣移之于血血移之于氣是邪無可容之地知可解也　可解之脉浮而虛不可解之脉浮而實浮而虛者只在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽明也

死證結胸證其脉浮大者不可下下之則死　結胸證悉具煩躁者亦死　陽明病心下鞕滿者不可攻攻之利遂不止者死　直視讝語喘滿者死下利者亦死　發汗多重發汗者亡其陽譫語氣短者死　傷寒若吐若下不解不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉澁者死　脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絶　少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治　少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治　少陰病六七日息高者死　傷寒脉遲六

七日而反與黄芩湯徹其熱脉遲爲寒今與黄芩湯復除其熱腹中當冷不能食今反能食此名除中必死

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰脉不還者死

傷寒發熱下利厥逆躁不得卧者死　傷寒發熱下利至甚厥止者死　傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也　傷寒五六日不結胸脉濡脉虛復厥者不可下此爲亡血下之死　發熱而厥七日下利者爲難治　傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治　下利手足厥逆無脉者灸之不溫若

脉不還反微喘者死　下利後脉絶手足厥冷晬時脉還手足温者生脉不還者死　傷寒下利十餘行脉反實者死　嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者為難治　濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

附死證歌

兩感傷寒不須治陰陽毒過七朝期黑斑下厥與上竭陽病見陰脉者危舌卷耳聾并囊縮陰陽交及捜詩衣重暍除中皆不治脣吻青兮面黑黧欬逆不已并噦結溲便遺屎便難着汗出雖多不至足口張目陷更何為喘不休與陰陽易離經脉見死當知結胸證具煩躁甚直視摇頭是死時少陽證與陽明合脉弦長大救時遲汗後反加脉躁疾須知藏厥命難追發逆屎滿并雀啄魚翔彈石解繩推更有代脉皆不救已上諸證死無疑

附

陰陽說凡治傷寒須辨陰陽二候不可誤也陽經有三太陽陽明少陽是也陰經亦有三太陰少陰厥陰是也經之陰陽以藏府言府為陽膀胱胃膽是也藏為陰脾腎肝是也病之陰陽乃是外邪之陰陽陰氣陽氣是也

病在太陽則熱在皮膚之分翕翕然怫怫然而熱便有頭疼惡寒體痛其脉必浮而緊　病在陽明則熱在肌肉之分或壯熱或濇濇而熱或蒸蒸而熱便有頭額痛或潮熱自汗其脉必長而數　病在少陽則必半表半裏之熱或往來寒熱便有頭痛口苦嘔而胸滿脇痛其脉必弦而數　病在太陰則手足漸冷脉息漸沉或自利腹滿嘔吐不渴　病在少陰雖然發熱手足自冷脉必沉細　病在厥陰則手足厥冷脉微而緩甚則脣青舌卷囊縮　陽證面紅光彩脣紅口乾舌燥能飲水漿其人身輕易以轉動常欲開眼見人目睛了了喜語言其聲響亮口鼻之氣呼吸出入能往而能來小便或赤或黃大便或秘或鞕手足自温煖爪甲俱紅活

陰證面青黑或有虚陽泛上雖亦赤色而不紅活光彩其人身重難以轉側或喜向壁卧或蜷卧欲寐或閉目不欲見人目睛不了了懶言語語無聲氣雖布息鼻中呼不出吸不入往來口與鼻中氣冷不欲飲水而上惡寒有如刀刮脣口或青或紫舌色或青或紫或白胎鋪滿而滑不見紅色手足自冷爪甲或青或紫血自不紅活小便清白或有淡黃大便不實或瀉雖肌表有熱以手按之則不甚熱陰甚者則冷透手也　陰陽二氣皆

能犯藏府故陽氣犯太陽則為傷風惡風而有汗陰氣犯太陽則為傷寒惡寒而無汗在太陽未得解轉入陽明少陽二經則純乎陽不如太陽之易治若陽氣未能罷以次傳入陰經則為陰中之陽蓋緣陽經之陽氣來入陰經雖有自利欲寐唇青手足厥冷舌卷囊縮等證亦不可妄投熱藥宜瀉其陽之在陰經也　若陽病下之太過陽氣已脫遂變為陰所謂害熱未已寒病復起或初得病便是陰證此是陰中之陰蓋緣陰氣攻陰經陰自得傳非自傳諸陽經來只當以温藥回其陽故陽入陰者變陽以救陰陰入陽者用陽以救陽二者不可不辨

治太陽陽明少陽皆屬陽證也太陽者膀胱也發熱惡寒頭疼腰痛而脉浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濈濈汗出大便秘潮熱而脉長也少陽者膽也口苦咽乾脇下滿發熱而嘔或往來寒熱而脉弦也麻黄湯大青龍湯桂枝湯治太陽傷風寒也大柴胡湯調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯治陽明傷寒也小柴胡湯治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後證也若陽氣獨盛陰氣暴絶即為陽毒必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦紋或下利黄赤脉洪實或滑促當以酸苦之藥投之令陰氣復而大汗解矣古人云酸苦涌泄為陰謂苦參大青葶藶苦酒之類皆復其陰氣也微用苦甚則兼用酸苦折熱復陰若熱極發厥陽證似陰者學者當以脉別之

太陰少陰厥陰三經皆屬陰證也何謂太陰證太陰脾之經主胸膈䐜脹何謂少陰證少陰腎之經主脉細心煩但欲寐或自利而渴何謂厥陰證厥陰肝之經主消渴氣上衝心心中疼熱飢不欲食食則吐蚘下之利不止也三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利即乾薑甘艸湯大段重者用四逆湯無脉者用通脉四逆湯若陰氣

獨盛陽氣暴絶則為陰毒其證四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脉沉實病或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令復陽氣而大汗解矣古人云辛甘發散為陽謂桂枝甘草乾薑附子之類能復其陽氣也微用辛甘甚則用辛苦若陰極熱躁陰證似陽者學者亦當以脉別之

辨陰證陽證辨　靜江府提刑李君長子年十九歲四月病傷寒九日醫者作陰證治之與附子理中丸數服其證增劇別易一醫又作陽證議論差互不敢服藥李君邀予往視座間有數人予不欲直言其證但細為分解令自忖度之凡陽證者身大熱而手足不厥卧則但

然起則有力不惡寒反惡熱不嘔不瀉渴而飲水煩躁不得眠能食而多語其脉浮大而數者陽證也凡陰證者身不熱而手足厥冷惡寒踡卧惡聞人聲或自引衣蓋覆不煩渴不飲食小便自利大便反快其脉沉細而微遲者陰證也今診其脉數得六七至其母云夜來叫呼不絕全不睡又喜飲冰水予謂其言知陽證悉具且三日不見大便宜急下之予遂以酒煨大黃六錢甘草炙二錢芒硝五錢煎服至夕下數行燥糞二十餘塊是夜汗大出明日往視之身凉脉靜矣予思素問熱論云治之各通其藏府故仲景述傷寒論云六經各異傳變

不同活人亦云凡治傷寒先須明經絡其義一也昧者不學經絡不問病源按寸握尺妄意病證不知邪氣之所在動致顛覆責盲醫哉昔韓子云醫之病病在少思眞理致之言也學者審之

吳夫陰證似陽者乃水極似火也蓋傷寒傳變誤服凉劑攻熱太速其人素本腎氣虛寒遂變陰證冷甚于內逼其浮陽之火發於外其人面赤煩躁身有微熱渴欲飲水復不能飲大便秘結不通小便淡黃或嘔逆或氣促或鄭聲或咽喉痛所以狀似陽證或見面赤煩渴大便秘結作陽證妄投寒凉之藥下咽遂斃可不謹哉切其脉沉細遲微者急以通脉四逆湯倍加人參附子以接其眞陽之氣設或差遲遂致陰盛陽衰參附亦不能救矣此與陰盛隔陽例同王太僕所謂身熱脉數按之不鼓擊者此名陰盛隔陽非熱也

婁云素問云脉從而病反言證似陽者脉亦從證似陽而其病反是寒也證似陰者脉亦從證似陰而其病反是熱也故皆反其脉證施治如身熱微熱煩躁面赤其脉沉而微者陰證似陽也身熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面戴陽者下虛故也若醫者不知脉誤謂實熱反與凉藥則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛發躁名曰

陰躁欲坐井中宜以熱藥治之故仲景少陰證面赤者四逆湯加葱白治之此極寒涼之藥入腹周身之火得水則升走陰寒之極故欲坐井中提醒以先亡醫用不語復認熱爲熱世以其藥投之其死何疑焉

躁或因吐因嘔因欬而發躁蒸蒸身熱如坐甑中欲得去衣居寒處或飲寒水則便如故振寒復至則氣短促速胸中滿悶欲絕甚則口開目瞪聲聞于外而淚涕涎痰大作其發躁須臾而已如前六脉細弦而濇按之而虛此大寒證也以辛寒甘溫之劑大瀉南方北方則愈

馮內翰姪因病傷寒目赤而煩渴脉息七至按之不鼓經曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然此陰盛格陽于

外非熱也與葛附子湯汗出愈

許傷寒六七日無熱脉沉緊而細煩躁不飲水此陰盛格陽也當用附子霹靂散飲水者不可與服

吳夫陽證似陰乃火極似水也蓋傷寒熱甚失于汗下陽氣亢極鬱伏于內反見勝己之化于外故身寒逆冷神氣昏昏狀若陰證也大抵唇焦舌燥能飲水大便秘鞕小便赤澁設有稀糞水利出者此內有燥屎結聚乃傍流之物非冷利也再審有失氣極臭者是也其脉雖沉切之必滑有力或時躁熱不欲衣被或揚手擲足或讝語有力此陽證也輕者人參白虎湯或小柴胡合解

傷寒纂例　陽候之一　余十五

毒湯主之內實者須下之以調胃承氣湯或有潮熱者以大柴胡加芒硝若大實大滿秘而不通者以大承氣湯下之必須審察輕重酌量用之蓋此與陽盛拒陰亦同王太僕所謂病人身寒厥冷其脉滑數按之鼓擊于指下者此名陽盛拒陰非寒也

活手足逆冷大便秘小便赤或大便黑色脉沉而滑者陽證似陰也輕者白虎湯重者承氣湯傷寒失下血氣不通令四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深速以大承氣湯加膩粉下之汗出乃愈若熱厥與陰厥自不同熱厥者微厥却發熱陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉細

大小便滑泄

右二節言證似陽而脉病屬陰證似陰而脉病屬陽故反其證而治之蓋證似陽而脉病屬陰者世尚能辨若脉證俱是陰而病獨屬陽者舉世莫辨而致夭折者滔滔皆是許學士云廄吏中郊守迪因其循子病傷寒見其煩渴而汗多以涼藥治之遂成陰毒數日卒迪痛悼之遂著陰毒形證訣三篇蓋傷世之意深矣

論曰陰盛則外寒陽虛則外寒屬表故表證條云外寒者汗之則愈也陽盛則內熱陰虛則內熱內熱屬裏故裏證條云內熱者下之則愈也

傷寒纂例　陽候之一　余十六

趙活人第三十三問引素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則內熱陰盛則外寒故治傷寒者陽虛陰盛汗之則愈下之則死陰虛陽盛下之則愈汗之則死陰陽虛盛非謂分尺寸也難經云陰陽虛盛者說脉也素問云陰陽虛盛者說表裡也仲景論傷寒汗下故引素問表裏之說與外臺所論合矣外臺云表病裡和汗之則愈表和裏病下之則愈愚詳素問論陰陽虛盛四證者雜病也難經六難之文論脉也外臺所述之文論傷寒表裡也但仲景所論陰陽虛盛

之意理實與焉經曰邪氣盛則實精氣脫則虛因正氣先虛以致邪氣客之則為盛實於是有陰虛陽盛陽虛陰盛二證之別今活人書却將素問所論雜病陰陽虛盛四證合而引證仲景傷寒四證之法又改陽盛內熱作外熱陰盛內寒作外寒所論初未嘗合惡因拓仲景所主陰陽虛盛之理而詳說之蓋盛者指邪氣而言虛者指正氣而言陰陽虛盛邪正消長之機也且正氣在人陽主表而陰主裏邪氣中人表為陰而裏為陽若夫表之真陽先虛故陰邪乘陽而盛實表受邪者陽虛也脉浮緊者陰邪盛于外也是

謂陽虛陰盛所以用桂枝辛甘之溫劑汗之則陰邪消溫之則真陽長使邪去正安故愈又若裏之真陰先虛故陽邪入陰而盛實裏受邪者陰虛也脉沉實者陽邪盛于內也是謂陰虛陽盛所以用承氣酸苦之寒劑下之則陽邪消寒之則真陰長邪去正安故愈如其不然陽盛而用桂枝下咽即斃陰盛而用承氣入胃即亡是皆盛盛虛虛而致邪失正也以是知仲景所主陽虛陰盛陰虛陽盛二證之意深蓋指一為表證一為裏證邪正消長而言非兼言表和裏病裏和表病而謂之陰陽虛盛也況和者無病處也以

存字訓虛字恐礙理

王難經曰傷寒陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之則愈嗟乎其傷寒汗下之樞機乎夫邪之傷於人也有淺深焉淺則居表深則入裏居表則閉腠理發怫熱見惡寒惡風頭痛等證於斯時也宜辛溫解散而可愈入裏則為燥屎作潮熱形狂言譫語大渴等證於斯時也惟鹹寒攻下而可平夫寒邪外客非陰盛而陽虛乎熱邪內熾非陽盛而陰虛乎汗下一差生死反掌吁是言也謂之傷寒汗下樞機其不然歟惜乎釋者刻求厥義遂隱外臺秘

要曰此陰陽指身之表裏言病者為虛不病者為盛表病裏和是陽虛陰盛也表和裏病是陽盛陰虛也竊意陰陽之在人均則寧偏則病無過不及之謂均過與不及之謂偏盛則過矣虛則不及矣其可以盛為和乎故內經云邪氣盛則實精氣奪則虛且謂陽虛當汗陰虛當下乃遺邪氣而反指正氣為言得無晦乎傷寒微旨曰此陰陽指脉之尺寸言尺脉實大寸脉短小名陰盛陽虛可汗寸脉實大尺脉短小名陽盛陰虛可下苟汗證已具而脉未應必待尺脉力過於寸而後行下證已具而脉未應必待寸脉力過

於尺而後用竊意越人設問以病不以脈其所答也
何反以脈不以病乎且或問以候病也倘汗下之證
已急不可少緩待脈應而未應欲不待則惑於心欲
待之則慮其變二者之間將從病歟將從脈歟吾不
得無疑於此也或詰予曰仲景傷寒論引此而繼以
桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡之語夫桂
枝表藥承氣裏藥反則為害是固然矣然麻黃湯亦
表藥也其不言之何歟且子以陰盛為寒邪寒邪固
宜用麻黃也今反舉桂枝又何歟予曰何不味仲景
之言乎其曰凡傷寒之病多從風寒得之又曰脉浮

而緊浮則為風緊則為寒又桂枝湯條而曰嗇嗇惡
寒淅淅惡風麻黃湯條而曰惡風夫風寒分言則風
陽而寒陰風苟行於天地嚴凝凛冽之時其得謂之
陽乎是則風寒常相因耳故桂枝麻黃皆溫劑也以
溫劑為治足以見風寒之俱為陰邪矣但傷衛則桂
枝傷榮則麻黃榮衛雖殊其為表則一耳仲景此言
但以戒汗下之誤為主不為榮衛設也舉桂枝則麻
黃在其中矣所謂陽盛即斃者是言表證已罷而裏
證既全可攻而不可汗所謂陰盛以亡者是言裏證
未形而表證獨具可汗而不可攻由此觀之則越人

仲景之本旨庶乎暢然於其中矣
表裏王海藏云治傷寒須分表裏若表裏不分汗下差
誤豈為上工且如均是發熱身熱不渴為表有熱小柴
胡加桂枝主之厥而脉滑為裏有熱白虎加人參主之
均是水氣乾嘔微利發熱而咳為表有水小青龍加芫
花主之體涼表證罷欬而脇下痛為裏有水十棗湯主
之均是惡寒有熱而惡寒者發於陽也麻黃桂枝小柴
胡主之無熱而惡寒者發於陰也附子四逆主之均是
身體痛脉浮發熱頭痛身體痛者為表未解麻黃湯主
之脉沉自利身體痛者為裏不和四逆湯主之以此觀

之仲景表裡之法甚詳學者宜深究心焉
活人云發熱惡寒身體痛而脉浮者表證也表證者惡
寒是也惡寒者屬太陽宜汗之　不惡寒反惡熱手掌
心并腋下濈濈汗出胃中乾燥結聚潮熱大便鞕小便
如常腹滿而喘或譫語脉浮而滑者裏證也裏證者內
熱是也內熱者屬陽明宜下之　傷寒始發熱惡寒今
汗後不惡寒但倍發熱而躁始脉浮而大今脉洪實或
沉數細始惺靜今狂語此為胃實陽盛再汗即死須下
之則瘉亦有始得病便變陽盛之證須便下之不可拘
以日數更有心胸連臍大段疰悶腹中痛坐臥不安

胃悶喘急極者亦不問他證便下之若失下則氣血不通四肢便厥醫人不知反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌不可不察也
成無已曰邪之客於表者為寒邪與陽相爭則為寒矣邪之入於裏者為熱邪與陰相爭則為熱矣邪在半表半裏外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱是以往來寒熱邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪半在表半在裏則寒熱亦半矣邪在表者必漬形以為汗邪在裏者必蕩滌以取利其餘不外不內半表半裏又非發汗之所宜亦非吐下之所對是當和解則可矣小柴胡為和解之劑也　李東垣曰邪在榮衛之間謂之半表半裡也太陽陽明之間少陽居身之半表半裏也五苓散分陰陽膀胱經之半表半裏也理中湯治吐泄上下之半表半裏也

活傷寒表證當汗裏證當下不易之法也發表攻裏本自不同甘遂神丹不可合飲桂枝承氣安可並進然而假令病人脉浮而大是表證當汗其人發熱煩渴小便赤却當下此是表裏俱見五苓散主之　假令傷寒不大便六七日頭痛有熱者是裏證當下其人小便清者知不在裏仍在表也當須發汗此是兩證俱見即未可下宜與桂枝湯　假令病人心下滿口不欲食大便鞕脉沉細是裏證當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩證俱見者仲景所謂半在表半在裏也小柴胡主之　假令太陽病表證未除而醫數下之遂挾熱而利不止心下痞鞕仲景謂之表裏不解桂枝人參湯主之　本太陽病醫反下之因爾腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃　又云太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之　煩躁口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱此陽明證也則脉反浮而緊是有表裏俱見不可汗下宜梔子湯吐之　此仲景治傷寒有表復有裏之法也　王海藏云大柴胡湯治表裏內外俱熱之證治有表者或脉浮或頭痛或惡風或惡寒四證中或有一二尚在者乃十三日過經不解是也治有裏者或譫語或妄語或擲手揚視此皆裏之急者也若欲汗之則裏證已急欲下之則表證尚在通宜大柴胡湯

活傷寒四五日後以至過經無表證又於裏證未可下者皆可用小柴胡隨證加減用之以至十餘日亦可用十餘日外用小柴胡不愈者若大便鞕看證可下則用大

柴胡下之以過經其人稍虛當下者用大柴胡湯則穩當恐承氣太緊病人不堪也仲景云六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱此為實也當下之宜大承氣湯又云病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數可用大柴胡下之假令已下脉數不解至六七日不大便者有瘀血也屬抵當湯

傷寒雜病海藏王好古曰世之治傷寒有法療雜病有方是則然矣然猶未也吾謂治傷寒亦有法療雜病亦有方方即法也豈有異乎要當全識部分經絡表裏藏府豈有二哉以其後世才智之不及古也所以分傷寒

雜病為二門故有長于此而短于彼者違夫國家取士分科為七宜乎愈學而愈陋愈專而愈粗也試以傷寒雜病二科論之傷寒從外而之內者法當先治外而後治內雜病從內而之外者法當先治內而後治外至若于中外不相及則治主病其方法一也亦何必分之為二哉大抵雜病之外不離乎表傷寒之內不離乎裏表則汗裏則下中則和不易之法劑之寒熱溫凉在其中矣

或有傷寒雜病有傷寒正病傷寒雜病者雖以正病治如病人證狀不一有冷有熱陰陽顯在目前當就其中大節先治其餘證則除治然亦不可用獨熱獨寒之劑又如嘔渴煩熱進小柴胡湯嘔渴煩熱止矣而下利不休以小柴胡湯為非則嘔渴煩熱不應止以為是則下利不應見吐利厥逆進薑附湯吐利厥逆止矣而熱渴譫語昏不知人以薑附為非則吐利厥逆不應止以為是則熱渴譫語不應見此亦傷寒雜病雖無前項冷熱二證顯然並見之跡而陰中有陽陽中有陰潛伏其間未即發見用藥一偏此衰彼盛醫者當於有可疑之處能反覆體認無致舉一廢一則盡善矣

類證雜論三陽證有合陽有純陽三陰證有盛陰有純

陰合陽者經所謂合病者是也純陽者經所謂脉陰陽俱盛大汗出不解者死又曰凡發汗服湯藥至有不肯汗者死謂陽熱甚而陰氣絕也故不能作汗二者俱是有陽而無陰故曰純陽也三陰有盛陰者如少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子湯主之謂手足寒身蜷痛脉沉者寒盛於陰也純陰者如少陰病惡寒身蜷而利手足逆冷者不治謂無陽也有寒客三陰極而生熱則傳陽明凡邪初中三陰則寒故宜溫藥發汗及寒極發熱則復宜寒藥下之蓋三陰三陽皆能自受邪不止自太陽經傳也故經曰陽明居中土也萬物所歸無

所復傳如太陽入胃則不傳陽明陽明入胃則不傳少陽少陽入胃則不傳三陰若三陰又有自受邪變熱入胃者故經曰傷寒脉浮而緩手足自温者係在太陰太陰當發身黄若小便自利者不能發黄至七八日大便鞕者為陽明病也此太陰之邪入陽明也又少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯此少陰之邪入府也經曰下利有譫語者燥屎也宜小承氣湯此厥陰之邪入府也三陰變熱入府者往往有之不可不察

有一陽中寒者太陽十六證云傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒攣急此邪中膀胱經虚寒也宜桂枝加

附子湯則愈醫以其證象於陽旦若反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾薑湯以復其陽厥愈足温更作芍藥甘艸湯以伸其脚若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之觀仲景此治其於壞病何有此先汗而後下之法也又如下利清穀裏寒外熱身體疼痛急當救裏四逆湯利止裏和清便自調急當救表桂枝湯此先温而後汗之法也孫兆曰本是陽病熱證為醫吐下過多遂成陰病者却宜温之有本是陰病與温藥過多致胃中熱實或大便鞕有狂言者亦宜下也

有稱大陽經病者太陰經病者有稱傷寒者中風者有但稱厥者下利者有但稱病者凡稱其經者蓋以邪中其經故以經名之非特謂傷寒之候謂兼有雜病也凡云傷寒而不云經者故非雜病也謂六經俱有之證難以一經拘之中風者亦然凡云下利及厥與夫稱病人等名證者謂六經傷寒中風雜病等候俱有是證也叔和類證編入各經故有所未當者如下利有譫語者有燥屎也宜小承氣湯叔和編入厥陰下利條內若以證言之正當屬陽明也似此者非一致令後人拘於六經妄分寒熱有悖聖道夫善治病者須要詳辨太陽

傳經之邪各經直中之邪曾無汗吐下之證火逆水噴之證結胸發黄血證痞利厥逆之證如中風傷寒雜病之候一切之疾不拘六經但分表裡蓋六經俱有表裏二證但有表證即發汗但有裏證即宜下或表裏二證俱見則宜以攻裏之藥發汗分表裏病證多少用之病在半表半裏者和解之此傳經之治也雜病寒證在表者辛温汗之寒中裏者大熱之劑救之亦不過明其表裏而已矣

大凡初服藥時無是證服藥後而生新證者故經曰若吐若汗若下後之證是也即壞病也當救何逆而治之

若初服藥有是證服藥後只是原證如故不見新有證候者只是病未退仲景所謂服湯一劑盡病證猶在者更作服也汗下同法清碧杜先生曰陽熱病暴發陰寒病易治蓋熱者傳經變態不一陰寒不傳治之亦一定法耳仁安嚴先生云凡醫他人治過傷寒須究前證曾服何藥借證交雜先以重者為主次論輕者假如傳經之邪治有三法在皮膚者汗之在表裏兩間者和解之在裏者下之此自外入內之治也至若體虛之人交接陰陽飲食不節則裏虛中邪又非在表可汗之法必用大熱之劑溫散經曰陰中於邪必內慄也表氣微虛裏

氣失守故使邪中於陰也方其裏氣不守而為邪中正氣怯弱故成慄也故經言寒則傷榮榮者血也血寒則凝而不行致四肢血氣不接而厥身體冷而惡風寒附子乾薑適得其當若寒退而熱毒內攻日中不了了下利清水腹滿又有急下之法此論少陰經之治法也若寒退而手足厥其厥乍熱乍寒腹中痛而小便不利又有四逆散之治法所謂少陰傳變與太陽相同者也

大抵治傷寒必須審證施治有脈與證相合者則易於識別若脈證不相符卻宜審的急緩治之但憑證亦不可但憑脈亦不可務要脈證兩得方為盡善上工治尤甚者為急故雖有但憑證而不憑脈者有但憑脈而不憑證者如經曰脈浮大心下鞕有熱屬藏者攻之不令發汗此又非表邪可汗之脈法也如促脈為陽盛若下利喘而汗出用葛根黃芩黃連湯若厥冷脈促為虛脫非灸非溫不可此又非陽盛之脈法也如陽明脈遲不惡寒身體濈濈汗出則用大承氣此又非諸遲為寒之脈法也少陰病始得之反發熱脈沉宜麻黃細辛附子湯微汗之此又非脈沉在裏之脈法也但不惡寒三字為主經雖云桂枝下咽陽盛則斃此定法也如譫語而惡寒必用桂枝先解之已而下之但以有表無表為辨

耳此仲景但憑證不憑脈之治法也

如經所謂結胸證宜下之其脈浮者不可下此又非發熱七八日雖脈浮數者可下之證也讝語發潮熱脈滑而疾者小承氣因與一升明日不大便脈反微澁者不可更與承氣也此又非湯入腹中轉失氣者乃可攻之之證也發熱惡寒脈微弱尺中遲者俱不可汗此又非在表宜汗之證也此仲景憑脈不憑證之治法也

蓋以脈而知病之淺深其證之必然者也圓機之士臨病消息脈證既決又何難焉醫之玄微其在斯乎

凡經云其陽其陰病者卻要辨認疑似之間而確得病

證明白然後用藥庶免差誤經曰病有發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也謂如傷寒或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者謂繼之以發熱此則發於陽也其初未發熱與無熱而惡寒發於陰者相似有不同者頭痛項強陰證無頭疼故也若惡寒而踡脉沉細而緊者此發於陰也在陽者可發汗在陰者宜溫裏

如少陰脉沉始得之反發熱似乎太陽乃有不同者其熱不翕翕然證無頭疼

少陰腹痛下利與太陰相似有不同者太陰不渴少陰

則渴手足有溫厥之殊

溫病與痓病皆與太陽相似有不同者痓脉沉細溫病不惡風寒而渴

傷寒與中暍相似其不同者傷風不渴中暍即渴傷寒與冬溫相似其不同者傷寒脉浮緊冬溫脉不浮

時行傳染與傷寒相似其不同者時行傳染脉不浮傷寒脉浮

太陽中濕與太陽傷寒相似有不同者濕脉沉而細也合目脉雖相似而痓則不同痓則身不疼而濕則身疼也

暑脉虛細又曰微弱又曰弦細芤遲諸如此者與痓脉濕脉頗相似雖然脉似而證不同暑則自汗而渴濕則不渴身疼痓則身不疼也

太陽中風見寒脉用大青龍其證與太陽傷寒相似有不同者中風見寒脉有煩躁也麻黃證則無煩躁

太陽傷寒見風脉用大青龍其證與中寒濕相似有不同者其脉浮緩寒濕則脉沉細微經云無少陰裏證者蓋太陽與少陰為表裏今脉證俱屬太陽表經故云無少陰裏證也

小青龍證與小柴胡證相似有不同者小青龍無往來

寒熱脅肋滿硬痛之證但有乾嘔發熱而欬此則為表不解水停心下也雖有或為之證與小柴胡相似終無半表半裏之證為異耳

察色要略凡看傷寒必先察其色內經曰聲合五音色合五行聲色符同然後可以知五藏之病也然肝色青其聲呼肺色白其聲哭心色赤其聲笑脾色黃其聲歌腎色黑其聲呻也且夫四時之色相生則吉而相尅則凶如青赤見於春赤黃見於夏黃白見於長夏白黑見於秋黑青見於冬此乃相生之色也若肝病之色青而白心病之色赤而黑脾病之色黃而青肺病之色白而

赤腎病之色黑而黄此皆五行之相尅爲難治矣且以
五藏之熱色見於面者肝熱則左頰先赤肺熱則右頰
先赤心熱則顔先赤脾熱則鼻先赤腎熱則頤先赤也
至于面黑者爲陰寒面青爲風寒青而黑主風主寒主
痛黄而白爲濕爲熱爲氣不調青而白爲風爲氣滯爲
寒爲痛也大抵黑氣見于面多凶爲病最重若黑氣暗
中明準頭年壽亮而滋潤者生黑而枯夭者死也此乃
畧舉其要内經以五色微診可以目察難經曰望而知
之謂之神故色不可不察也
凡看傷寒必先察色然後切脉審證參合以决死生吉

凶夫色有青黄赤白黑見於面部皮膚之上氣有如亂
絲亂髮之狀隱於皮裏也蓋五藏有五色六經有六色
皆見於面以應五行相生者吉相尅者凶滋榮者生枯
夭者死自準頭年壽命宫法令人中皆有氣色其滋潤
而明亮者吉暗而枯燥者凶也又當分四時生尅之理
而通察之兹畧具五色傷寒之要者列于左以便覽驗
青色屬木主風主寒主痛乃足厥陰肝經之色也凡面
青唇青者陰極也若舌卷囊縮者宜急温之如夾陰傷
寒小腹痛則面青也内經曰青如翠羽者生青如草兹
者死青而黑青而紅相生者生如青白而枯燥者相尅

乃死也脾病見青氣多難治
赤色屬火主熱乃手少陰心經之色在傷寒見之而有
三陽一陰之分也如足太陽屬水寒則本黑熱則紅也
經曰面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表汗不徹故也當
發其汗若脉浮數表熱不汗出者面色紅赤而光彩也
經言陽明病面合赤色者不可攻之合者通也謂表邪
未解不可攻裏也若陽明内實惡熱不惡寒或蒸蒸發
熱或日晡潮熱大便秘結譫語面赤者此實熱在裏可
攻之也如表裏俱熱口燥舌乾飲水脉洪面赤裏未實
者且未可下宜人參白虎湯和之也如少陽經病熱在

半表半裏面紅脉弦者宜小柴胡湯和之不可下也經
言少陰病下利清穀裏寒外熱面赤者四逆湯加葱白
主之此陰寒内極逼其浮火上行於面故發赤色非熱
也若不察仔細誤投寒凉之劑卽死可不謹哉又夾陰
傷寒虚陽泛上者亦面赤也但足冷脉沉者是又煩躁
面赤足冷脉沉不能飲水者此陰極也宜温之若久病
虚人午後面兩頰顴赤者此陰火也不可作傷寒治之
然三陽之氣皆會於頭額其從額上至巔頂絡腦後者
太陽也從額至鼻下於面者陽明也從頭角下耳中耳
之前後者少陽也但有紅氣或赤腫者以分之蓋大頭

傷寒證正要知此部分可也内經曰心熱則頦先赤脾熱則鼻先赤肝熱則左頰先赤肺熱則右頰先赤腎熱則頤先赤若赤而青赤而黄爲相生則吉如赤而黑爲相尅則凶經言赤如鷄冠者生如衃血者死蓋準頭印堂有赤氣枯夭者死明潤者生也如肺病見赤氣者則難治

黄色屬土主濕乃足太陰脾經之色黄如橘子明者熱也黄如熏黄而暗者濕也凡黄而白黄而紅相生則吉若黄而青相尅者則凶也内經曰黄如蟹膏者生黄如枳實者死若準頭年壽印堂有黄氣明潤者病退而有

喜兆也若枯燥而夭者死凡病欲愈目皆黄也長夏見黄白則吉若黄青則凶也

白色屬肺金主氣血不足也乃手太陰肺經之色肝病見之難治内經曰白如豕膏者生白如枯骨者死凡印堂年壽白而枯夭者凶白而光潤者吉若白而黑白而黄相生吉也若白而赤相尅則凶矣凡傷寒面白無神者發汗過多或脱血所致也

黑色屬水主寒主痛乃足少陰腎經之色也凡黑而白黑而青相生則吉若黑而黄相尅則凶内經曰黑如烏羽者生黑如炲者死若準頭年壽印堂黑氣枯夭者死耳中明潤者生也黑氣自魚尾相牽入太陰者死黑氣自法令人中入口者死耳目口鼻黑氣枯夭者死凡面準頭命宮明潤者生枯暗者死若心病見黑氣在頭者死也華陀曰凡病人面色相等者吉不相等者凶如面青目白面赤目青面黄目青面赤目白面白目黑面黑目白面白目青皆爲不相等故曰凶也相等者面目俱青俱紅之類也

察目

凡目睛明能識見者可治睛昏不識人或反目上視或瞪目直視或目睛正圓或戴眼反折或眼胞陷下者皆

不治也凡開目而欲見人者陽證也閉目而不欲見人者陰證也凡目中不了了睛不和熱甚於内也凡目疼痛者屬陽明之熱目赤者亦熱甚也目瞑者必將衄血也白睛黄者將發身黄也凡病欲愈目眥黄鼻準明山根亮也

察鼻

鼻頭色青者腹中痛苦冷者死微黑者水氣黄色者小便難白色者爲氣虚赤色者爲肺熱鮮明者有留飲也鼻孔乾燥者屬陽明之熱必將衄血也鼻孔乾燥黑如烟煤陽毒熱深也鼻孔冷滑而黑者陰毒冷極也鼻息

鼾睡者風温也鼻塞濁涕者風熱也鼻孔搧張者爲肺風肺絶而不治也

察口唇

凡口唇焦乾爲脾熱焦而紅者吉焦而黑者凶唇口俱赤腫者熱甚也唇口俱青黑者冷極也口苦者膽熱也口中甜者脾熱也口燥咽乾者腎熱也舌乾口燥而欲飲水者陽明之熱也口噤難言者痙風也凡唇上有瘡爲狐虫食其藏下唇有瘡爲惑虫食其肛也若唇青舌卷唇吻反青環口黧黑口張氣直口如魚口口唇顫搖不止氣出不返皆不治也

察耳

凡耳輪紅潤者生或黄或白或黑或青而枯燥者死薄而白薄而黑皆爲腎敗凡耳聾耳中疼皆屬少陽之熱而爲可治若耳聾舌卷唇青此屬厥陰爲難治也

察舌

凡舌鮮紅者吉青爲冷青而紫者爲陰爲寒也赤而紫者爲陽爲熱也黑者亢極爲難治凡舌上胎白而滑者表有寒也又曰丹田有熱而胸中有寒也胎黄而燥渴者熱盛也胎黑而燥渴者熱甚而亢極也若不燥渴舌上黑胎而滑者爲寒爲陰也舌卷而焦黑而燥者陽毒熱極也舌青而胎滑者陰毒冷極也凡舌腫脹舌上燥裂舌生芒刺皆熱甚也凡舌鞕舌強舌短縮神氣昏亂語言不清者死也又陰陽易病吐舌數寸者死也舌乃心之竅屬火而色紅者吉惟黑者乃水尅火故難治也

察身

凡病人身輕自能轉側者易治若身體沉重不能轉側者則難治也盖陰證則身重必足冷而踡卧惡寒常好向壁卧閉目不欲向明懶見人也又陰毒身如被杖之疼身重如山而不能轉側也又中濕風濕皆主身重疼痛不可轉側要當辨之大抵陽證身輕而手足和煖開目而欲見人爲可治若頭重視身此天柱骨倒而元氣敗也凡傷寒傳變循衣摸牀兩手撮空此神去而魂亂也凡病人皮膚潤澤者生而枯燥者死經曰脉浮而洪身汗如油喘而不休形體不仁乍靜乍亂此爲命絶也

傷寒證治準繩卷之一

金壇王肯堂輯　門人南昌張　綍校

太陽病　發熱　惡寒　惡風　頭痛　項強　身體痛

黃經曰太陽之為病頭項強痛而惡風寒不傳經者固有之然而傳者多矣如經言傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐及煩燥脉數急者為傳也又曰傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也太陽經治法有汗吐下溫和解調併刺俱有之盖太陽所感非一傳變多端故也雖發汗解肌一法證有輕重脉有浮沉用藥必宜隨脉證用之庶造仲景之深意如發熱惡寒脉浮緊麻黃湯自汗惡風脉浮緩桂枝湯此脉證相應之定法也又如項背強几几反汗出惡風桂枝加葛根脉微而惡寒桂枝麻黃各半湯發熱惡寒熱多寒少脉微弱者桂枝二越婢一湯脉浮緊自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急桂枝加附子湯又如汗後復宜汗者發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯服桂枝大汗出脉洪大者與桂枝如前法若如瘧狀日再發宜桂枝二麻黃一湯仲景汗劑二十七湯所治五十九證大宜精別如何而用青龍湯如何而用五苓散如何而用茯苓甘草湯之類盖病有輕重治有急緩故也清碧杜先生曰傷寒陽熱之證傳經之邪變態不一辨之不精則汗吐下三法之治一差死生反掌矣非比陰寒之邪中在一經不復傳變易於治也不過隨寒邪輕重用溫藥治之一定之法耳今之庸工好用熱劑而不知涼藥之妙且難也

汗

桂枝湯　桂枝加葛根湯
桂枝加厚朴杏子湯　桂枝加附子湯
桂枝去芍藥湯　桂枝去芍藥加附子湯
桂枝麻黃各半湯　桂枝二越婢一湯
桂枝二麻黃一湯　桂枝去桂加茯苓白朮湯
葛根湯　葛根加半夏湯
葛根黃連黃芩湯　麻黃湯
大青龍湯　小青龍湯
桂枝加芍藥人參新加湯　麻黃杏仁甘草石膏湯
五苓散
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
桂枝加桂湯　桂枝甘草龍骨牡蠣湯
桂枝附子湯　茯苓甘草湯

文蛤散　去桂加白朮湯
甘草附子湯

吐

梔子豉湯　梔子甘草豉湯
梔子生薑豉湯　梔子厚朴湯
梔子乾薑湯　瓜蔕散

下

調胃承氣湯　大柴胡湯
承氣湯　柴胡加芒硝湯
桃仁承氣湯　抵當丸

大陷胸湯　抵當湯　大陷胸丸
白散　十棗湯　大黄黄連瀉心湯
附子瀉心湯

温

甘草乾薑湯　芍藥甘草湯
四逆湯　乾薑附子湯　茯苓桂枝甘草大棗湯
厚朴生薑甘草半夏人參湯　茯苓桂枝白朮甘草湯
芍藥甘草附子湯　茯苓四逆湯
桂枝甘草湯　真武湯　小建中湯　炙甘草湯

和解

小柴胡湯　柴胡加龍骨牡蠣湯
小陷胸湯　柴胡桂枝乾薑湯
半夏瀉心湯　生薑瀉心湯
甘草瀉心湯　柴胡桂枝湯
桂枝人參湯　白虎湯
白虎加人參湯　黄芩湯
黄芩加半夏生薑湯

調

赤石脂禹餘糧湯　旋復代赭石湯
黄連湯

刺

縱横刺期門　服桂枝刺風池風府
太少併病刺期門　熱入血室刺期門
太少併病刺大椎肺俞

脈浮緩有汗為中風宜桂枝湯

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒（經曰尺寸俱浮者太陽受病太陽主表為諸陽主氣脈浮頭項強痛而惡寒者太陽表病也[illegible]一毫惡寒猶為在表）

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名為中風（[illegible]者是也[illegible]所謂云[illegible]風陽也[illegible]故也）

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝

湯主之　太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯[illegible]

[illegible]

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之[illegible]

[illegible]

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也

先其時發汗則愈宜桂枝湯主之[illegible]

[illegible]

桂枝湯方

桂枝[illegible]　芍藥[illegible]　甘草[illegible]

生薑[illegible]　大棗[illegible]

右五味㕮咀以水柒升微火煮取叁升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物[illegible]

成經云桂枝本爲解肌若脉浮緊發熱汗不出者不可與之常須識此勿令誤也蓋桂枝湯本專主太陽中風必也皮膚疎湊又自汗風邪干於衛氣者乃可投之也仲景以解肌爲輕以發汗爲重故發汗吐下後身疼不休者津液內耗也雖有表邪而止可解肌故須桂枝湯少和之也桂味辛熱用之爲君桂猶圭

也宣導諸藥爲之先聘是謂辛甘發散爲陽之意蓋發散風邪必以辛爲主內經所謂風淫所勝平以辛佐以苦以甘緩之以酸收之是以芍藥爲臣而甘草爲佐也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之生薑味辛溫大棗味甘溫是用以爲使而此又不特專於發散以脾主爲胃行其津液薑棗之用專行脾之津液而和榮衛者也麻黃湯不用薑棗者謂專於發汗不待行化而津液得通矣

龐凡桂枝湯病證者常自汗出小便不數手足溫和或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而

又憎寒始可行之若病者無汗小便數或手足逆身冷不惡寒反惡熱或飲酒後愼不可行桂枝湯也脉緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

〇許有人病發熱惡寒自汗脉微弱而浮三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首今人全不用何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者云云至翕翕發熱宜桂枝湯此脉與證仲景說得甚明後人看不透所以不敢用也　假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯哉

〇仲景治表虛製此湯桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝為君芍藥甘草佐之如陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君桂枝甘草佐之一則治其表虛一則治其裏虛故各有主用也後學當觸類而長之　以桂枝易肉桂

治寒腹痛神品藥也如夏中熱腹疼少加黃芩去桂痛立止桂於春夏二時爲禁藥

〇桂枝麻黃湯爲當時傷寒設與過時之溫暑者何預焉若以此二湯通治春溫夏暍之病則誤之甚矣

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒 [illegible]

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之 [illegible]

麻黃湯方

麻黃 [illegible]　桂枝 [illegible]　甘草 [illegible]兩炙

杏仁 [illegible]

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法 [illegible]

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露

出外用炒糯米壹升龍骨牡蠣藁本防風各壹兩研爲細末周身撲之隨後祕方用藥兒至亡陽而死此良法也

與或云發汗必用麻黄亦有禁用者何也凡傷寒發於天令寒冷之時且其寒邪在表閉其腠理身疼拘急惡寒而無汗者須用麻黄辛苦之藥爲能開發腠理逐寒邪汗出而解也惟夏月炎暑之時爲禁用之藥故宜辛凉之劑以發之乃葛根葱白豆豉之類是也若麻黄加凉劑在内亦可用如通解散是也

成本草言輕可去實即麻黄葛根之屬實謂寒邪在表汗不出而腠密邪氣勝而表實輕劑所以揚之麻黄味甘苦用以爲君者以麻黄爲輕劑而專主發散也風邪在表而膚理疎者必以桂枝解其肌今寒邪在經表實而腠密非桂枝所能獨散必專麻黄以發汗而桂枝所以爲臣也内經曰寒淫於内治以甘熱佐以辛苦者茲是類歟内經曰肝苦急急食甘以緩之肝者榮之主也傷寒榮勝衛固血脉不流必用味甘之物以緩之故以甘草味甘平杏仁味苦温爲之佐使且桂枝湯主中風風則傷衛風邪併於衛則衛實而榮弱中景所謂汗出惡風者此爲榮弱衛強故桂枝湯佐以芍藥用和榮也麻黄湯主傷寒寒則傷榮邪併於榮則榮實而衛虛内經所謂氣之所併爲血虛血之所併爲氣虛者是矣故麻黄湯佐以杏仁用利氣也

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也[illegible]

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之[illegible]

大青龍湯方

麻黄[illegible]　桂枝[illegible]　甘草[illegible]

杏仁[illegible]　生薑[illegible]　大棗[illegible]

石膏[illegible]

右七味以水九升先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升取微似汗汗出多者温粉粉之一服汗者停後服若復服汗多亡陽遂[illegible]虛惡風煩

躁不得眠也
成青龍東方甲乙木神也應春而主肝專發生之令
為敷榮之主萬物出甲開則有兩岐肝有兩葉以應
之謂之青龍者以發散榮衛兩傷之邪是應肝木之
體耳桂枝湯主中風麻黃湯主傷寒中風脉浮緊為
中風見寒脉傷寒脉浮緩為傷寒見風脉是風寒兩
傷也風兼寒寒兼風雖欲與桂枝湯解肌以祛風而
不能已其寒或欲以麻黃湯發汗以散寒而不能去
其風茲仲景所以特處青龍湯而兩解也麻黃味甘
溫桂枝味辛熱寒則傷榮必以甘緩之風則傷衛必

以辛散之此風寒兩傷榮衛俱病故以甘辛相合而
為發散之劑表虛膚腠疏則以桂枝為主此為表實
腠理密者則以麻黃為主是先麻黃為君後桂枝為
臣也甘草味甘平杏仁味甘苦苦甘為助佐麻黃以
發表大棗甘溫生薑味辛溫辛甘相合佐桂枝以解
肌風陽邪寒陰邪風則傷陽寒則傷陰榮衛陰陽為
風寒兩傷則非輕劑可獨除散也必須輕重之劑以
同散之乃得陰陽之邪俱已榮衛之氣俱和是以石
膏味苦辛微寒質重而又專達肌表為使也大青龍
發汗之重劑用之稍過則有亡陽之失經曰若脉微

弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為
逆也又曰一服汗者停後服若再服汗多亡陽遂致
惡風煩躁不得眠也用者宜審之
按大青龍湯仲景治傷寒發熱惡寒煩躁者則用之
夫傷寒邪氣在表不得汗出其人煩躁不安身心無
如之奈何如脉浮緊或浮數者急用此湯發汗則愈
乃仲景之妙法也譬若亢熱已極一雨而凉其理可
見也若不曉此理見其躁熱投以寒凉之藥其害豈
勝言哉若脉不浮緊而數無惡風惡寒身疼者亦不
可用之也如誤用之其害亦不淺也所以脉證不明

者多不敢用也
評仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝
治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脉傷寒見風
脉三者如鼎立人皆能言之而不曉前人處方用藥
之意故醫遂多不用無足怪也且脉緩而浮者中風
也故嗇嗇惡風淅淅惡寒翕翕發熱仲景以桂枝對
之脉浮緊而濇者傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨
節疼痛惡寒無汗而喘仲景以麻黃對之至於中風
脉浮緊傷寒脉浮緩仲景皆以青龍對之何也予嘗
深究三十年若證候與脉相對無不應手而愈何以言

之風傷衛衛氣也寒傷榮榮血也榮行脉中衛行脉外風傷衛則風邪干陽陽氣不固發越而爲汗是以自汗是表虛故仲景用桂枝以發其邪芍藥以和其血蓋中風則病在脉之外其病稍輕雖同曰發汗特解肌之藥耳故仲景於桂枝證云令半身漐漐微似有汗不可如水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反動榮血邪氣乘虛襲之故病不除也寒傷榮則寒邪入陰血而榮行脉中者也寒邪居脉中非特榮受病邪自內作則併與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱齒乾而煩冤仲景以麻黃發其汗又以桂枝甘草助其發散欲滌除內外之邪榮衛之病耳大抵二藥皆發汗以桂枝則發其衛之邪麻黃并榮與衛治之亦自有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九證云病當自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又四十七證云發熱汗出此爲榮弱衛強故使汗出者欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是

知傷寒浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并用桂枝此仲景之言也至於青龍雖治傷風見寒脉傷寒見風脉之病然仲景又云汗出惡風者不可服之服之厥逆便有筋惕肉瞤之證故青龍一證尤難用藥須是形證諦當然後可行故王寔夫證止用桂枝麻黃各半湯治之蓋慎之也

陶熱盛而煩手足自温脉浮而緊此傷風見寒脉也不煩少熱四肢微厥脉浮而緩此傷寒見風脉也二者爲榮衛俱病法宜大青龍湯但此湯險峻須風寒俱甚又加煩躁乃可與之不如桂枝麻黃各半湯爲穩尤不若九味羌活湯加石膏知母枳殼也

溫粉方

白术　藁本　川芎　白芷各等分

右研爲細末每末一兩入米粉三兩和勻撲周身止汗若汗過多恐亡陽遂厥逆惡風煩躁不得眠故宜以此粉止之

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之按許叔微云几字亦爲几几字云几几然鈎貌謂者見鳥[illegible]行欲狀如欲飛舉首緩頸者取自搦持使伸用不安動孔按此可以想見其行持搦強之狀若作爲鳥羽釋則几當音殊而於拘強之義反不切矣

葛根湯者乃桂枝湯中加麻黃葛根也其證無汗故以麻黃發之此證有汗故去麻黃而曰桂枝加葛根湯也若有麻黃則亦葛根湯矣成氏不當設疑於注以啟後學故辯之

桂枝葛根湯方

葛根肆兩　芍藥貳兩　甘草貳兩

生薑參兩切　桂枝貳兩去皮　大棗拾貳枚擘

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

無汗惡風葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

葛根湯方

葛根肆兩　麻黃參兩去節　桂貳兩去皮

芍藥貳兩　甘草貳兩炙　生薑參兩切

大棗拾貳枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減貳升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

[illegible]是也此[illegible]湯中也

陽病身痒宜桂麻各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯成氏傷寒八九日則邪傳再經又遍三陽欲傳三陰之時也傳經次第則三日傳遍三陽至四日陽去入陰不入陰者為欲解其傳陰經第六日傳遍三陰為傳經盡而當解其不解傳為再經者至九日又遍三陽陽不傳陰則解如瘧發作有時也寒多者為病進熱多者為病退經曰厥少熱多其病為愈寒多熱少陽氣退故為進也今雖發熱惡寒而熱多寒少為陽氣進而邪氣少也裏不和者嘔而利今不嘔清便自調者裏和也寒熱間日發者邪氣深也日一發者邪氣復常也日再發者邪氣淺也日二三發者邪氣微也內經曰大則邪至小則平言邪甚則脈大邪少則脈微今日數多而脈微緩者是邪氣微緩也故云欲愈脈微而惡寒者表裏俱虛也陽表也陰裏也脈微為裏虛惡寒為表虛以表裏俱虛故不可更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱色者表未解也熱色為赤色也得小汗則和不得汗則邪氣外散皮膚而為痒也與桂枝麻黃各半湯小發其汗以除表邪○首一節至寒少止為自欲愈之辭至末是小汗之法[illegible]不須治至吐也是自欲愈之辭至末是小汗之者麻黃發桂枝是止一發一止則有不得大出矣

桂枝麻黃各半湯方

桂枝壹兩拾陸銖去皮　芍藥　生薑切

甘草炙　麻黃各壹兩去節　大棗肆枚擘

杏仁貳拾肆枚湯浸去皮尖及雙仁者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

脈微弱身不痒宜桂枝二越婢一湯

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯前條脈微緩而面有熱色身痒以桂麻各半小汗之者猶未弱也此脈微而加弱焉則又虛於前證矣雖小汗亦不宜故云不可發汗夫弱也然病在太陽表證未罷用桂枝發散之藥然不可無但不令汗而已

桂枝二越婢一湯方

桂枝去皮　芍藥　甘草各十八銖

生薑一兩二銖切　大棗四枚擘　麻黃去節十八銖

石膏二十四銖碎綿裹

右七味㕮咀以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升本方當裁為越婢湯桂枝湯合飲一升今合為一方桂枝二越婢一

胃為十二經之主脾治水穀為卑藏若婢內經曰脾主為胃行其津液是湯所以謂之越婢者以發越脾氣通行津液外臺方一名越脾湯即此義

凡仲景稱太陽病者皆表證發熱惡寒頭項強痛也若脉浮大則與證相應宜發汗今見表證而脉反微不與證應故不可發汗但用一二各半湯等和之可也

太陽中暍證

若太陽中暍發熱惡寒脉微弱手足逆冷而渴者白虎加人參湯主之方論見暍證

太陽畜血證

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也抵當湯主之方論見畜血

太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也亦抵當湯主之方詳畜血

凡仲景稱太陽證脉沉者皆謂發熱惡寒頭項強痛而脉反沉也其證兼發狂小腹鞕者為畜血此條抵當湯是也

若兼關節痛小便不利身黃者為濕痺方論見濕證若兼卒口噤反張者為痙若無汗惡寒名剛痙宜葛根湯若有汗不惡寒名柔痙宜瓜蔞桂枝湯方論並見痙病

太陽病發熱頭痛脉反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯　少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛

湯主之

趙嗣詳太陽病發熱頭痛法當脉浮今反沉少陰脉沉法當無熱今反熱仲景於此兩證各言反者謂反常也蓋太陽病脉似少陰少陰病似太陽所以皆謂之反而治之當異也今究其旨均是脉沉發熱以其有頭痛故為太陽病陽證當脉浮今反不能浮者以裏虛久寒正氣衰微所致又身體疼痛故宜救裏使正氣內復逼邪出外而乾薑生附子亦能出汗而解假使裏不虛寒則脉當見浮而正屬太陽麻黃證也均是脉沉發熱以其無頭疼故名少陰病陰病當

無熱今反熱則寒邪在表未傳於裏但以皮膚鬱閉爲熱而在裏無熱故用麻黄細辛以發表間之熱附子以温少陰之經假使寒邪入裏則外必無熱當見吐利厥逆等證而正屬少陰四逆湯也由此觀之表邪浮淺發熱之反猶輕正氣衰微脉沉之反爲重此四逆湯不爲不重於麻黄附子細辛湯也又可見熱附配麻黄發中有補生附配乾薑補中有發仲景之旨微矣

麻黄附子細辛湯方

麻黄二兩去節　細辛二兩　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内藥煮取三升去滓温服一升日再服

成内經曰寒淫於内治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黄之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以温少陰之經

趙詳仲景發汗湯劑各分輕重不同如麻黄桂枝湯青龍各半越婢等湯各有差等至於少陰發汗二湯雖同用麻黄附子亦有加減輕重之别故以加細辛爲重加甘草爲輕辛散甘緩之義也其第一證以少陰本無熱今發熱故云反也蓋發熱爲邪在表而當汗又兼脉沉屬陰而當温故以附子温經麻黄散寒而熱須汗解故加細辛是汗劑之重者第二證既無裏寒之可温又無裏熱之可下求其所以用麻黄附子之義即是脉亦沉方可名曰少陰病身亦發熱方行發汗藥又得之二三日病尚淺比之前證亦稍輕故不重言脉證而但曰微發汗所以去細辛加甘草是汗劑之輕者

凡仲景稱太陽病不惡寒者皆明發熱頭項强痛脉浮而反不惡寒也其證兼渴者爲温病無汗出者爲柔痓[illegible]

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

[illegible]

柴胡加桂枝湯方

桂枝一兩半　黄芩　人參各一兩半
甘草一兩炙　芍藥一兩半　生薑一兩半
大棗六枚擘　柴胡四兩　半夏二合半

右九味以水七升煮取三升去滓温服

凡仲景稱表不解者皆謂太陽病發熱惡寒頭項強痛脉浮也蓋病雖屬太陽表證而有裏證兼之者則不言太陽病但稱表不解也其兼心下支結者此條柴胡桂枝湯是也

兼心下有水氣乾嘔而欬者小青龍也（方論見欬） 兼腸痛手足溫而渴者小柴胡也 兼心下痞者先用桂枝解表後以瀉心攻痞也（方論見痞） 兼下利腹滿脹者先以四逆溫裏後以桂枝攻表也（方論見下利）

太陽病欲解時從巳至未解 太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗出而解陰脉微者下之而解若欲下之調胃承氣湯主之 太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈

太陽外證未解不可下之下之為逆欲解外者宜桂枝湯主之（錢云本發汗而欲下之為逆也若先發汗治不為逆）

[龐]大小調胃三承氣湯必須脉浮頭痛惡風惡寒表證盡罷而反發熱惡熱譫語不大便方可用之若脉浮緊下之必結胸若脉浮緩下之必痞氣

[許]常記一親戚病傷寒身熱頭痛無汗大便不通已四五日予訊問之醫者治大黃朴硝等欲下之予曰子姑少待予為視之脉浮緩居密室中自稱甚惡風予曰表證如此唯大便不通數日腹且不脹別無所苦何遽便下之大抵仲景法須表證罷方可下不爾則邪乘虛而入不為結胸則為熱利也予作桂枝麻黃各半湯繼以小柴胡漐漐汗出大便亦通而解

仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始則表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之當先表解乃可下之若表已解而內不消大滿大堅實有燥糞者自可除下之雖四五日不能為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入為挾熱自利煩躁之變不可勝數輕者困篤重者必死矣 原本正文重疊予刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥糞或大便堅秘須是脉不浮不惡風表證罷乃可下之大便雖四五日不通亦無害若不顧表而下遂為挾熱利也

右桂枝麻黃為長沙入手第一方而麤工以之殺人者往往而是故易水師弟以它藥代之不知者謂長沙有遺巧余謂此正易水師弟不及長沙處而婆心切矣中醫守之可以萬全今且摘為後賢表證治例及補養兼發散二條于後臨病之工宜詳玩焉

發熱者無休止時也寒熱者寒已而熱熱已而寒間繼而發也潮熱者有時熱有時止如潮汛之不失其期也若發熱不惡寒而渴爲病發汗已身體灼熱者爲風溫若發熱手足厥下利清穀此爲陰證也四肢逆冷卽發熱此熱深厥亦深也頭痛發熱身不疼痛此傷食證也不惡寒身不痛知非傷寒頭不疼脈不緊知非裏實證虛煩者虛煩也

中風卽發熱者風傷衛也傷寒不卽發熱者寒傷榮也經云傷寒一二日或已發熱或未發熱是也凡翕翕發熱而有惡風惡寒頭痛脈浮者表熱也此由風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致宜汗之若小便黃非在外凡蒸蒸發熱而兼有譫語大便秘小便赤腹滿惡熱脈滑實者裏熱也此由陽氣下陷入陰中所致宜下之若小便清非在內也其在少陰厥陰發熱者謂之反發熱惟太陰無發熱之候若脈陰陽俱盛熱不止者死下利發熱汗後復發熱脈躁疾不爲汗衰狂言不能食陰陽不交者死　蘭臺治例曰邪在三陽太陽證多與潮熱若同而異邪在三陰少陰證多與煩躁相類而非

發熱惡寒脈浮者屬表卽太陽證也

發熱汗出不惡寒反惡熱者屬裏卽陽明證也

發熱脈弦細頭痛者屬半表半裏卽少陽證也

發熱而嘔者小柴胡湯

發熱欬嗽表不解者小青龍湯兼脇痛乾嘔者小柴胡加乾薑五味子湯 方見欬論

發熱而喘表不解者小青龍去麻黃加杏仁湯兼實滿者麻黃湯

發熱口渴有屬表者有屬裏者治法方論甚衆

發熱汗解半日許復煩躁脈浮數大者可更發汗宜桂枝湯

發汗後惡風寒者虛故也不惡寒但惡熱者實也當和胃氣宜調胃承氣湯

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

調胃承氣湯方

大黃 四兩

甘草 二兩 炙

芒硝

右㕮咀水一盞煮大黃甘草至七分去滓入芒硝更上火微煮令沸少少溫服

成 內經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒以除熱大黃苦寒以蕩實甘草甘平助二物推陳而緩中

發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而利者大柴胡湯 論見痞

發汗後身灼熱脈浮汗出身重多眠鼻鼾者風溫論見風溫

發汗後仍發熱心悸頭眩身瞤動振振欲擗地者宜眞武湯論見下利

汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆惡寒者宜四逆湯論見

大汗出脈陰陽俱盛不解者死[illegible]

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈桂枝湯主之

汗下後仍頭痛發熱心下滿小便不利者桂枝去桂加茯苓白木湯論見

大下後身熱不去心中結痛者梔子豉湯主之論見

大下後身熱不去微煩者梔子乾薑湯論見

陽明病下之其外有熱手足溫心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯論見

太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆[illegible]

曰小逆也

瘥後更熱者小柴胡湯脈浮者以汗解脈沉者以下解勞復

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之[illegible]

白虎湯方

知母陸兩　石膏壹斤　甘草貳兩

粳米陸合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

成白虎西方金神也應秋而歸肺熱甚於內者以寒下之熱甚於外者以涼解之其有中外俱熱內不得泄外不得發非是湯則不能解暑暍之氣得秋而止故曰處暑是湯以白虎名謂能止熱也內經曰熱淫所勝佐以苦甘又曰熱淫於內以苦發之欲徹表熱必以苦爲主故以知母苦寒爲君熱則傷氣寒以勝之甘以緩之熱勝其氣必以甘寒爲助是以石膏甘寒爲臣粳米甘濕急食甘以緩之熱氣內餘消爍津液

必以甘平之物緩其中故以甘草粳米為使是太陽中暍得此湯則頓除卽熱見白虎而盡矣立秋後不可服白虎為大寒劑秋時服之必為噦逆虛羸者多矣

垣身以前胃之經也胸胃肺之室也邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺所以號為白虎湯也

海夫傷寒表證發熱惡熱而渴與下雜證同但頭痛身熱目痛鼻乾不得卧白虎主之乃陽明經病也正陽陽明氣病脉洪大先無形也雜病裏證發熱惡熱而渴但目赤者病藏也手太陰氣不足不能管領陽

氣也宜以枸杞生地黃熟地黃之類主之脉洪大甚則嘔血先有形也　氣病在裏誤用血藥無傷也為安血而益陰也血病在裏誤用氣藥如白虎湯者非也為瀉肺而損陰也

垣辨誤服白虎變證（）昔西臺掾蕭君瑞二月中病傷寒發熱以白虎湯主之病者面黑如墨本證遂不復見脉沉細小便不禁東垣初不知也及診之曰此立夏以前誤服白虎白虎大寒非行經之藥止能寒藏腑不善用之則傷善氣本病曲隱於經絡之間或投以大熱之藥求以去陰邪他證必起非所以救白虎也可用溫藥升陽行經有難者曰白虎大寒非大熱何以救君之證奈何東垣曰病隱經絡間陽道不行而本證見矣又何難哉果如其言而愈

張活人謂白虎湯治中暍併汗後一解表藥耳非正傷寒藥也而夏月陰氣在內白虎尤宜戒之夫白虎湯具載仲景之書證治昭然明白何為言非正傷寒之藥也況傷寒論言無表證者可與白虎湯今云汗後一解表藥耳于法既無表證何解之有又曰夏月陰氣在內白虎尤宜戒之而明理論又云立秋後不可服秋則陰氣半矣而白虎大寒若不能禁服之而

為噦逆不能食或虛羸者多矣夫傷寒之法有是證則投是藥安可拘于時而為治哉假如秋冬之間患傷寒身無表證而大煩渴于法合用白虎湯苟拘其時何以措手若以白虎為大寒其承氣又何行于冬令乎既以夏宜戒秋後不可行然則宜乎何時也雖然經云必先歲氣無伐天和此言常也假如賊邪變出陰陽寒熱亦當捨時從證豈可以時令拘哉

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯若大渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之（或傷寒脉浮發熱無汗其表不解不渴者宜麻黃湯渴者宜五苓散非白虎所宜大渴欲水無表證者乃可與白虎加人參湯以散裏熱）

脈浮遲者四逆湯　裏熱厥逆　表熱下利　發熱吐利　蓄血

治病之工大宜精別一一[illegible]言可與不可湯或否下可與者只須認[illegible]宜[illegible]者[illegible]決也言[illegible]湯

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯(論見下利)　下利

厥逆汗出熱不去者四逆湯

少陰病下利清穀厥逆裏寒外熱者通脈四逆湯(方論見下利)

身熱手足逆冷而脈虛當夏月發者為中暑者(論見中暑)

傷寒表不解乾嘔發熱而咳下利者小青龍去麻黃加芫花湯(論見[illegible])　太陽與陽明合病必下利其證頭痛腰疼身熱鼻乾脈浮大而長者宜葛根湯([illegible])　發熱下利脈微遲厥逆者通脈四逆湯　太陽與少陰合病自

下利其證頭寒胸滿往來寒熱脈浮大而弦者宜黃芩湯(論見下利)　下利清穀脈沉遲其人面赤微熱而厥者必鬱冒汗出自解　發熱下利厥逆躁不得卧者死　發熱而利汗不止者死(二論俱見下利)

發熱吐利心下痞硬者大柴胡湯渴者五苓散不渴者理中湯(論並見霍亂吐利門)

發熱經水適來適斷小柴胡湯刺期門(論見婦人[illegible])　發熱脈數消穀不大便者有瘀血宜抵當湯(論見蓄血)

戴氏諸陽發熱已見前三陽經陰不發熱惟少陰能發熱然少陰發熱有二證初得病即見少陰證發熱惡寒頭不疼宜麻黃細辛附子湯　若下利清穀身熱躁擾裏寒外熱仲景謂之反發熱此乃陰盛隔陽宜四逆湯附子理中湯蓋陽氣傳陰經而下利者乃是熱利陽陷入裏外所以無熱陰氣入陰經而下利者乃是裏寒自利寒既在裏為主則陽氣必客於外所以外反熱要知陰證發熱自是不同發於陽而發熱者頭必疼發於陰而發熱者頭不痛此為驗也　又發汗後只惡寒者為虛虛乃表虛發汗後只惡熱者為實實乃裏實只惡寒者是發其汗或汗出太過所謂陽微則惡寒宜芍藥甘草附子湯只發熱者是表

已解而裏不消所謂陰微則發熱宜大柴胡湯或小承氣湯　又有汗下後陰陽不相入水火不相濟致餘熱未退不可更用冷藥內外俱未可故宜小建中湯若其人已虛虛能生熱宜小建中湯加當歸一錢或四君子湯加黃芪半錢或十全大補湯調其榮衛虛者四柱湯真武湯　審之是邪熱未解雖經汗下卻不畏虛而養病宜竹葉石膏湯

宋元諸賢表證發熱治例

潔有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔疎雖有汗不當服桂枝宜用黃芪湯和解之秋冬汗孔閉

雖無汗不當服麻黃宜羽川芎湯和解之春夏有汗脉
微而弱惡風惡寒者乃太陽證秋冬之脉也宜用黃芪
湯無汗亦用川芎湯秋冬有汗脉盛而浮發熱惡熱者
乃陽明證春夏之脉也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯
大抵有汗皆宜黃芪湯無汗皆宜川芎湯主之
黃芪湯有汗則能止之
白术　黃芪　防風各等分
右㕮咀每服五七錢至一兩水煎溫服汗多惡風甚
者加桂枝
川芎湯無汗則能發之

川芎　蒼术　羌活各等分
右㕮咀每服五七錢至一兩水煎熱服無汗惡風甚
者加麻黃壹貳錢
海藏神术湯治內傷冷飲外感寒邪無汗者
蒼术製　防風各二兩　甘草炒一兩
右㕮咀加葱白生薑同煎服如太陽證發熱惡寒脉
浮而緊者加羌活貳錢　如太陽證脉浮緊中帶弦
數者是兼少陽也加柴胡貳錢　如太陽證脉浮緊
中帶洪者是兼陽明也加黃芩貳錢　婦人服者加
當歸或加木香湯或加藁本湯各貳錢如治吹妳煎

調六一散三五錢神效
又神术湯六氣加減例
太陽寒水司天　加羌活桂枝餘歲非時變寒亦加冬
亦加
陽明燥金司天　加白芷升麻餘歲非時變涼濕亦加
秋亦加
少陽相火司天　加黃芩地黃餘歲非時變雨濕亦加
夏亦加
太陰濕土司天　加白术藁本餘歲非時變熱濕亦加
夏末秋初亦加

少陰君火司天　加細辛獨活餘歲非時變熱亦加春
末夏初亦加
厥陰風木司天　加川芎防風餘歲非時變溫和亦加
夏亦加
已上神术湯六氣加減法非止為司天之氣設也至
於歲之主氣與月建日時同前應見者皆當隨所見
依上例加減之按海藏此論與戴人云病如不是當
年氣看與何年運氣同便向此中求妙法方知皆在
至真中之歌相表裏實發前人之所未發也蓋海藏
此論所謂某氣司天加某藥者治常氣之法也所謂

陵所應見加減者治變氣之法也戴人所謂看與何年同氣求治法者亦治變氣之法也能將二公之法擴充行之則內經運氣之本義燦然矣夫內經論運氣有常氣有變氣常氣者有定紀如某年屬某氣司天當寒某年屬某氣司天當熱是也變氣者無定紀如某年屬某氣司天當寒反熱當熱反寒是也王氏註文釋以經無定紀之變氣作有定紀之常氣使後學皆以年歲占運氣而其應者十無一二是以人莫之信而其道湮晦久矣二公生數千百年之後復啟其端而續之與程朱續孔孟不傳之緒同功也今僕謹於每歲逐年司天加藥之後伸餘歲變常之義同志者幸究心焉

白朮湯治內傷冷物外感風寒有汗者

白朮 叁兩　防風 貳兩　甘草 壹兩炙

右㕮咀每服五錢水一盞薑三片煎至七分溫服一日止一二服待二三日漸漸汗少為解

又白朮湯治傷寒上解三陽下安太陰

白朮 [illegible]　防風 各貳兩

每服五錢水煎七分溫服用後方加減　若發熱引飲加黃芩甘草　頭疼惡風者加羌活散三錢羌活一兩半川芎七錢細辛二錢半　若身熱目痛者加石膏湯四錢石膏二兩知母半兩白芷七錢　腹中痛加芍藥湯三錢芍藥二兩桂枝半兩　往來寒熱而嘔者加柴胡散三錢柴胡一兩半半夏半兩　心下痞加枳實一錢　若有裏證加大黃一錢次二錢又次三錢邪去止之

潔古云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若未瘥則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌解表神方

九味羌活湯 [illegible]

羌活 治太陽肢節痛君主之藥也然非無以為主也乃撥亂反正之君也故大無不通小無不入關節痛非此不治也

防風 壹兩半 治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所使引而至

蒼朮 壹兩半 別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不內傳之於足太陰脾

細辛 半兩 治足少陰腎苦頭痛　川芎 壹兩 治厥陰頭痛在腦

白芷 壹兩 治陽明頭痛在額　生地黃 壹兩 治少陰心熱在內

黃芩 壹兩 治太陰肺熱在胸

甘草 壹兩 能緩裏急調和諸藥故有國老之稱

已上九味雖為一方然亦不可執當視其經絡前後

左右之不同從其多少大小輕重之不一增損用之其效如神㕮咀水煎服若要欲汗者須熱服以熱湯助之若緩欲汗者溫服不用湯助也　脉浮而不解者先急後緩脉沉而不解者先緩後急　此湯不獨解利治雜病亦神中風行經者加附子中風祕澀者加大黃中風并三氣合而成痺等證各隨十二經上下內外寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用之　蜜作丸亦可　加生地黃各半治兩感傷寒如神用豆淋酒煎治破傷風

解表雜方

和解散 和劑　治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐利 平胃加藁治

陳皮 洗　厚朴 去粗皮薑汁炙 [illegible]　藁本

桔梗　甘草 各半斤　蒼朮 去皮 [illegible]

右為麤末每服三錢水一盞半薑三片棗二箇煎七分不拘時熱服

十味芎蘇散 [illegible] 亦名 [illegible]　治四時傷寒發熱頭痛

川芎 柒錢　紫蘇葉　乾葛

柴胡　茯苓 各半兩　半夏 [illegible]

陳皮 [illegible]　枳殼 [illegible]　桔梗 [illegible]

甘草 [illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服無時

養胃湯 [illegible]　治外感風寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停痰俱能治之但感風邪以微汗為好

半夏 [illegible]　厚朴 [illegible]　蒼朮 [illegible]

橘紅 [illegible]　藿香葉 [illegible]　草果 去皮 [illegible]

茯苓 去皮　人參 [illegible]　炙甘草 [illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎六分熱服兼治飲食傷脾發為痎瘧寒多者加附子為十味名不換金散

五積散 [illegible]　治陰經傷寒脾胃不和及感寒邪

白芷　川芎　炙甘草

茯苓 去皮　當歸 去蘆　肉桂 去麤皮

芍藥　半夏 湯泡七次　陳皮 去白

枳殼 去穰麩炒　麻黃 去根節　乾薑 炮

厚朴 去麤皮　蒼朮 [illegible]

桔梗 去蘆

右除肉桂枳殼二味別為麤末將一十三味慢火炒

令色轉攤冷次入枳桂令匀每服三錢水一盞半薑三片葱白三段煎一鍾不拘時熱服胃寒用煨薑挾氣加茱萸調經催生入艾醋服　若脾胃不和内傷冷物渾身疼痛頭昏無力胸膈不利飲食不下氣脈不和四肢覺冷或睡裡虛驚至晚心躁困倦即入鹽少許同煎　若陰經傷寒手足逆冷及虛汗不止脈細疾面青而嘔更宜加附子同煎加減多少並在臨時消息之

〔海〕麻桂芍藥甘草即麻黄桂枝各半湯也蒼朮甘草陳皮厚朴即平胃也枳桔陳茯半即枳梗半夏等湯也加芎歸治血又加乾薑爲厚朴散此數藥相合爲解表温中之劑消痞調經之方雖爲内寒外感表裏之分所制實非仲景表裏麻黄桂枝薑附之的方也惟在活法者變而通之

人參敗毒散 和劑　治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻塞聲重風濕身腫體痛惡風痰癘四時通用傷風有汗夏至後用

羌活　獨活　前胡
柴胡　芎藭　枳殼
白茯苓　桔梗　人參 已上各壹兩
甘草 半兩

右爲末每服三錢水一盞生薑三片薄荷少許同煎至七分去滓温服

參蘇飲 元戎　治内外感一切發熱王藥又云前胡葛根自能解肌枳殼陳皮自能寬膈大治中焦痞滿凡有熱不得拘其所見小兒室女尤宜服之

木香 半兩　紫蘇葉　乾葛
半夏 湯洗七次 薑汁炒　前胡 去苗　人參 去蘆
茯苓 去皮各柒錢半　枳殼 麩炒去穰　桔梗 去蘆
甘草 炙　陳皮 去白各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎不拘時稍熱服　若素有痰者候熱退以二陳六君子湯間服

右方治痰飲積聚胸膈寒眩暈嘈煩忪悸嘔逆及痰飲中人停留關節手脚嚲曳口眼喎斜半身不遂食已則嘔頭疼發熱狀如傷寒者悉治之　一法用此藥三兩加四物湯貳兩合和名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱并衄血吐血便血及婦人下血過多致虛熱者並宜服之或因用心太過發虛熱者及往來寒熱者用之神効

加味香蘇散方

香附子　紫蘇梗　陳皮

甘草

右爲㕮散每服四錢水一盞半煎一盞生薑三片連根葱白二莖同煎熱服

頭痛加川芎白芷　頭痛如斧劈加石膏連鬚葱頭　偏正頭風加細辛石膏薄荷　太陽穴痛加荊芥穗石膏　傷風自汗加桂枝　傷寒無汗加麻黄去節乾薑　傷風惡寒加蒼朮　傷風咳嗽不止加半夏杏仁去皮尖　傷風胸膈痞塞加製枳殼　傷風發熱

不退加漳柴胡黄芩　傷風鼻塞聲重咽膈不和加苦梗旋覆花　傷風痰涎壅盛加白附子天南星　傷風鼻內出血加茅花　傷風氣促不安加大腹皮桑白皮　傷風鼻塞不通頭昏加羌活荊芥　傷風不散吐血不時加生地黄　傷風不解耳內出膿疼痛加羌活荊芥　傷風不解咽喉腫痛加苦梗　傷風中脘寒不思飲食加去白青皮枳殼　傷風嘔吐惡心不止加丁香半夏　傷風頭暈眼花顛倒支持不住加熟附子　傷風時作寒慄加桂枝　傷風痰壅嘔惡不止加白附子旋覆花半夏　傷風後時時作虛熱不退加人參　傷風飲食不能消化加縮砂仁青皮　傷風一向不解作潮熱白日至日中不退日日如是加地骨皮漳柴胡人參黄芩　初感風頭痛作熱鼻塞聲重加羌活川芎　感風腰疼不能伸屈加官桂桃仁　感風渾身痛不止加赤芍藥紫金皮　感風頸項強急不能轉頭加羌活官桂　腹肚疼痛加木香　腹肚疼刺不可忍加薑黄茱萸七粒　小腹疼痛無時不可忍加木香薑棗　婦人忽然大便痛腫不能下地加木香木瓜茱萸　婦人被氣所苦胸膈痞疼脇肋刺痛小便急疼加木香枳殼

婦人被氣疼所苦加木香縮砂仁　脾胃不和中脘不快加穀芽神曲　傷食吐嘔泄瀉腹痛加乾薑木香　心卒痛者加延胡索酒一盞　飲酒太過忽遍身發疸或兩目昏黄加山茵蔯山梔子　中酒吐惡加烏梅丁香　婦人經水將行先作寒熱加蘇木紅花　婦人產後作虛熱不退煩渴加人參地黄　產後發熱不退加人參黄芪　產後腰疼不已加當歸官桂冷嗽不已加乾薑五味子杏仁　脾寒加良薑青皮草菓　脚氣加木香木瓜牛膝紫金皮茱萸川楝子　感風寒發熱頭疼加不換金正氣散　感寒

頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動加生料五積散○飲食不下欲吐不吐加丁香與蘿蔔子○感寒頭痛發熱身疼分陰陽加敗毒石膏○婦人產後風脚手疼痛生料五積散人參敗毒散加木瓜不換金正氣散加生地黃川芎同煎

十神湯 治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問陰陽兩感風寒並宜服之

川芎　甘草　麻黃

乾葛　紫蘇　升麻

赤芍藥　白芷　陳皮

香附子各等分

右㕮咀每服五錢薑葱煎如頭痛甚更加葱白三莖中滿氣實加枳殼煎並熱服

按此湯用升麻葛根能解利陽明經瘟疫時氣發散之藥也非正傷寒之藥若太陽經傷寒發熱用之則引邪入陽明經傳變發斑矣慎之

藿香正氣散 治傷寒頭痛憎寒壯熱或感濕氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉脚轉筋加香薷扁豆黃連名藿薷湯

大腹皮　白芷　茯苓去皮

紫蘇莖葉　藿香　厚朴

白朮　陳皮　桔梗

半夏麴　甘草

右㕮咀每服三錢薑三片棗一枚煎熱服

按此方宋人所製治內傷飲食外感寒邪憎寒拘急頭痛嘔逆胸膈滿悶與夫傷食傷冷傷濕中暑霍亂山嵐瘴氣不伏水土寒熱作瘧並宜增損用之非正傷寒之藥若病在太陽經頭疼發熱骨節痛者此方全無相干如妄用之先虛正氣逆其經絡雖出汗亦不解變成壞證者多矣凡傷寒發熱脈沉與元氣虛人并夾陰傷寒發熱者皆不可用切宜戒之

大白朮湯 和解四時傷寒混解六經不犯禁忌

白朮　石膏　防風

羌活　川芎　甘草

黃芩　枳實　知母

白芷　細辛

右爲麤末每服半兩水一盞半煎至一盞大溫服未解更一服兩服藥相又作一服 春倍防風羌活夏倍黃芩知母季夏雨淫倍朮白芷秋加桂枝五錢冬加桂八錢或一兩

右以上諸方皆為元氣不虛者設也如芎蘇香蘇散則內傷少而外感多者宜之和解散養胃湯則外感少而內傷多者宜之五積散則寒多者宜之冬亦宜之大白朮湯則熱多者宜之春夏亦宜之敗毒散則宜於挾濕者參蘇飲則宜於挾痰者十神正氣則吳氏之議當矣大抵證兼表裏邪由錯雜似傷寒而非正傷寒者乃可於諸方中斟酌選用若脉證與麻黃桂枝脗合自當遵仲景法治之即元氣素虛或平素有熱不宜麻桂者亦必如潔古海藏法緩緩消減庶無誤爲人命至重死不復生臨病之工宜詳審焉

戴院使元禮治法傷風傷寒初得病時並宜和解散芎芷香蘇散或養胃湯加草芎各半錢熱服溫覆若的是傷風有前自汗惡風等證可用桂枝湯令其熱服溫覆喘加杏仁一錢咳加五味子一錢渴加人參半錢外熱未止者敗毒散熱而有汗者敗毒散加桂枝半錢或陽旦湯嘔者不宜用桂枝湯合於本方加半夏一錢添薑煎此非合病之嘔係傷寒雜病即非正寒故可用也風寒二證理當發汗而其人虛不可汗者宜桂枝湯加黃芪半錢若的是傷寒有前惡寒無汗等證可用五積散厚被覆之取汗喘嗽者杏子湯加麻黃半錢欲汗而不得汗者再進已汗而身熱不退者參蘇飲或敗毒散加桂枝半錢嘔者養胃湯此非治合病之嘔若風寒俱傷或惡風而無汗或惡寒而無汗疑似之間只宜五積散半貼加敗毒散半貼名交加散喘嗽者小青龍湯有初得病太陽證具但寒而未即為熱至一二日後方熱此傷於寒若傷風即有熱矣但寒未熱者五積散發汗有已服解表藥不惡風不惡寒諸表證已罷於裏又未深未渴小便亦未赤大便如常獨身熱未除者宜香蘇散敗毒散小柴胡湯加桂枝半錢有已服解表藥證已罷又無裏證其人體痛不減者恐是發汗多榮衛不和所致宜小建中湯用半厚半薄之桂

河間劉氏治法傷寒表實無汗頭項痛腰脊強身熱惡寒肩背拘急手足指末微厥脉浮緊而濇當以清解散加天水散汗之傷風表虛自汗頭項強痛肢節煩疼鼻鳴乾嘔惡風手足溫脉浮緩當以通解散或天水散解之或表虛或表實但口乾煩渴者悉宜雙解散汗之汗後餘熱不解以涼膈散退之或日深或日淺但有表證而脉沉數者先以天水連翹飲子清之待脉浮而裏熱減然後以雙解散汗之傷寒表不

脈浮小便不利微熱口乾五苓散分之表熱多裏熱少益元一涼膈半和解之裏熱多表熱少涼膈一益元半調之若表裡俱熱頭痛口乾自汗不止白虎湯治之或半在表半在裏往來寒熱口苦舌乾耳聾乾嘔胃熱滲濕小柴胡湯和解之或膈熱嘔吐不止者半夏橘皮湯治之或飲水不止以成濕熱大便泄瀉小便赤澀腹滿急痛頭痛口乾者桂苓甘露飲主之或濕熱內餘而成下痢頻併少腹而痛者黃連解毒湯治之傷寒日深表裏熱勢極甚心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐下利或陽明病多

汗或太陰腹滿實痛或少陰下利清水心下痛而口乾或無表裏證但發熱七八日脉雖浮數宜雙除表裏之熱大柴胡湯微下之或加小承氣湯尤妙傷寒日深裏熱極甚日晡潮熱譫言妄語發狂腹滿實痛法當大承氣湯下之或用三一承氣湯尤良

右戴氏用藥偏熱劉氏用藥偏寒於世運風土稟賦感受各有所宜臨病者詳審而酌施之方許親見長沙耳劉氏所用諸方前條無之今列于後

通聖散河間 治風熱鬱結憎寒發熱筋脉攣痺肢體焦痿頭目昏眩耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利涕唾稠粘咳嗽上氣腸胃燥澀便血瘀血瘡瘍腫痛疲瘵不痊婦人產後血滯腹痛小兒驚風積熱并隊馬跌仆疼痛或傷寒傷風等證並皆治之

防風　芒硝　連翹

川芎　麻黃　薄荷

白芍藥　當歸　大黃各五錢半

黃芩　桔梗　石膏各一兩

甘草二兩　荊芥　山梔

白术二錢五分　滑石三兩

右㕮咀每服一兩或二兩水二盞生薑三片同煎七分去滓溫服不拘時如發散風寒加葱白三莖如治痰嗽每服加半夏少許

涼膈散河間 治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩口瘡唇裂鼻衄吐血欬嗽痰涎淋閉不利大小便不通或傷寒半表半裏及胃熱發斑及陰耗陽竭用以養陰退陽或汗下後餘熱不解并小兒瘡痘黑陷並皆治之

連翹二兩　甘草　山梔

黃芩　大黃　薄荷各五錢

朴硝二錢半

右為㕮咀每服一兩水一鍾竹葉三十片同煎七分

去滓入生蜜少許食後溫服加黃連五錢名清心湯
天水散 治傷寒表裡俱熱煩渴口乾小便不通及霍
亂吐瀉下利腸澼偏主石淋及婦人產難催生下乳
神仙之妙藥也
桂府滑石　粉草
右為極細末每服三錢白湯調下新汲水亦得 加
薄荷末少許名鷄蘇散加青黛末少許名碧玉散治
療並同但以避世俗之輕侮爾
三一承氣湯 治傷寒大承氣湯證腹滿實痛調胃承
氣證譫語下利小承氣湯證內熱不便三乙承氣湯
合而為一也及治中風僵仆風癇發作並皆服之此

下劑也
大黃　芒硝　厚朴
枳實　甘草
右㕮咀分作三服每服水一盞生薑三片同煎七分
去柤溫服不拘時候以利為度
雙解散 治傷寒傷風或有汗或無汗表證悉具內熱
口乾
通聖　天水
右為㕮咀每服二兩水二大鍾生薑三片葱白三根

同煎七分去滓微熱服以取其汗
消解散 治一切感冒
蒼术　荊芥　甘草　麻黃
右四味㕮咀每服一兩水二鍾生薑三片葱白一莖
同煎七分去滓微熱服以被蓋覆取汗為度
半夏橘皮湯 治一切嘔吐不止
人參　白朮　白茯苓　甘草
黃芩　半夏　厚朴　藿香葉
葛根　橘皮
右為㕮咀每服一兩水一碗煎七分去滓入生薑自

然汁少許溫服不拘時
補養兼發散例
丹溪云有卒中天地之寒氣者有口食生冷之物者
故傷寒為病必身犯寒氣口食寒物者是以從補中
益氣湯加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所
湊其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之證出入
加減氣虛甚者少用附子以行參朮之氣
內傷之病專主東垣內外傷辨甚詳世之病
此者為多但有挾痰挾外邪者鬱熱於內而發者皆
以補元氣為主宜看其所挾而兼用藥 一男子素

嗜酒因暴風寒衣薄遂覺倦怠不思飲食半日至睡
後大發徧身疼痛如被杖微惡寒天明診之六脉浮
大按之豁然左爲甚予作極虛受風寒治之人參爲
君黄芪白术歸身爲臣蒼术甘草木通乾葛爲佐使
大劑與之至五貼後通身汗如雨凡三易被得睡覺
來諸證悉除　盧兄年四十九歲自來大便下血脉
來沉遲澀面黄神倦者二年矣九月間因勞倦發熱
自服參蘇飲二貼熱退早起小勞遇寒兩手背與面
紫黑昏仆少時却醒身大熱妄語口乾身痛至不可
眠脉之三部不調微帶數重取虛豁左手大於右手

以人參二錢半帶節麻黄黄芪各一錢白术二錢當
歸五分與三五貼得睡醒來大汗如雨即安兩日後
再發脇痛欬嗽若睡時嗽不作而妄語且微惡寒診
其脉似前而左略帶緊予曰此體虛再感寒也再以
前藥加半夏茯苓至十餘貼再得大汗而安後身倦
不可久坐不思飲食用補中益氣去凉藥加神麯半
錢砂仁五七十貼而安　杭州葉君章臘月因齋素
中饑而胃寒作勞遂患發熱頭痛醫與小柴胡湯遂
自汗神昏耳聾目不見物予診其脉大如指似有力
熱不退與人參黄芪白术熟附子炙甘草作大劑服

之一日而汗少二日而熱減半耳微有聞目能視物
初用藥至四貼前藥中加蒼术與兩服再得汗而熱
除本日遂去蒼术附子又與前藥作小劑服三日而
安　呂仲修年六十六歲正月間因忍饑冒寒作勞
頭痛惡寒發熱骨節皆疼無汗至次日妄語熱愈甚
而妄語時止時作熱亦不爲十分自服參蘇飲兩貼
汗不出又再進一服以衣覆取汗大出而熱不退至
第四日予診其脉兩手皆洪數而右爲甚此因饑而
冒寒加之作勞陽明經雖受寒氣不可攻擊宜急以
大劑補之以回其虛俟胃氣充實自能出汗而解遂

以參芪白术歸身陳皮炙甘草每貼加熟附子一片
一晝夜服五貼至第三日口稍乾言語有次諸證雖
解而熱未退遂去附子加白芍又兩日思食却作肉
羹間與之又三日精神全二日許自汗出而熱退診
其脉不數洪脉却尚有些洪脉作大脉論年高而誤
汗此後必有虛證見又與前藥至次日言我大便自
病來不曾更衣今覺逼迫痛虛坐努責狀如不堪醫
者必欲投大黄巴豆等劑予謂大便非實秘爲是氣
因誤汗而虛不得充腹無力可努仍與前補藥以肉
粥及蓯蓉與之一日半煎濃葱椒湯浸下體下大便

軟塊者五六枚診其脈仍舊大未斂此因氣血未得
回復又與前藥兩貼經兩日小便不通少腹下妨悶
頗爲所苦但仰卧則點滴而出予曰補藥服之未盡
於前藥内倍加參芪大劑服兩日小便方利而安
汪機治一人年三十餘因冒寒發熱醫用發表不愈
繼用小柴胡熱熾汗多遂昏昏憒憒不知身之所在
卧則如雲之停空行則如風之飄毛兼有消穀善饑
夢遺諸證觀其形類肥者曰此内火爍灼而然虛極
矣診其脈皆浮洪如指曰脈經云脈不爲汗衰者死
在法不治所幸者脈雖大按之不鼓形雖長而色尚

蒼可救也醫以外感治之所謂虛其虛誤矣經云邪
之所湊其氣必虛宜以内傷爲重遂用參芪歸术大
劑少加桂附服十餘貼病減十之二三再減桂附加
芍藥黄芩服十餘貼病者始知身卧于牀足履于地
喜曰可不死矣服久果起
薛院使已治一人年七十九仲冬將出少妾入房致
頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲
徧舌生刺縮歛如荔枝然下唇黑裂面目俱赤煩燥
不寐或時喉間如烟火上衝急飲凉茶少解已瀕於
死脈洪大而無倫且有力捫其身烙手此腎經虛火

遊行於外投以十全大補加山茱萸澤瀉牡丹皮山藥
麥門五味附子一鍾熟寐良久脈證各減三四再與
八味丸服之諸證悉退後畏冷物而痊
本事方黄芪建中加當歸湯　治發熱頭疼脉浮數而
尺中遲弱者宜先服此藥補血却與麻黄桂枝輩
黄芪　當歸各壹兩半　白芍藥
桂枝　甘草炙壹兩
右㕮咀每服伍錢薑三片棗一枚水煎日三夜二服
如脈尚沉遲再進一服
海藏黄芪湯治傷寒兩感拘急三焦氣虛自汗及手足汗

出或手背偏多或肢體振搖腰腿沉重面赤目紅但欲
睡眠頭面壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不
渴大便或難或如常度或口乾咽燥或渴欲飲湯不欲
飲水或少欲飲水嘔噦間作心下滿悶腹中疼痛或時
喜笑或時悲哭或時太息或時語言錯亂疑作譫語狂
言者非也神不守舍耳始得病手脚冷之間或恐悸頭
項不甚痛行步只如舊此陰盛陽虛之故也兩手脉浮
沉不一或左或右往來不定有沉濇弱微弦五種陰脈
形狀按之全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也宜
先緩而後急緩宜用黄芪湯

黄芪湯方

人參　生薑　黄芩　白茯苓

白术　白芍藥（各二錢五分）　甘草（半錢）

嘔者加藿香陳皮各伍錢甚者加乾薑炮壹錢

右㕮咀水煎量證加減多少用之　如大便秘結者

調中丸主之

調中丸方

人參　白术　白茯苓

乾薑　甘草（已上各等分）

右爲末煉蜜丸每兩作十丸或五丸每服一二丸木

少許煎服若病急者黄芪湯每服加乾薑一錢大便

結者理中丸主之

理中丸方

人參　白术　乾薑（炮已上各等分熱以代之）

甘草（炙）

右等分爲末煉蜜丸每兩作五丸白湯化下先緩後急也若危急者無汗宜附子乾薑甘草湯若自汗者宜白术附子甘草湯脉沉可於四逆湯或真武湯或通脉四逆湯選用之

丹溪矩新書謂有雜合邪者當以雜合法治之譬如發熱頭疼得之成勞明是外合之邪已得浮數之脉而氣口又緊盛明是食所傷病者又倦怠脉重按俱有豁意而胸膈痞滿閉引兩脇其脉輕取又似乎弦此又平昔多怒肝邪之所爲也細取左尺大細沉弱此又平時房勞之過也治法宜以感冒一節且放後先視其形色强弱厚薄且以補中化食行滯清涼胃火而以姜辣行之則中氣稍回傷滯稍行津液得和通體得汗外感之邪自解醫者不肯詳審求之只顧表散外邪又不推究兼見之邪脉亦不察問所得之病因與性情之執著巧施雜合治法將見正氣自虛邪氣愈固皆拙工之過也

要此篇集丹溪海藏諸賢治傷寒皆以補養兼發散之法實本經成敗倚伏生於動動而不已則變作及風而寒熱不得虛邪不能獨傷人之旨也蓋凡外傷風寒者皆先因動作煩勞不已而內傷體虛然後外邪得入故一家之中有病者有不病者由體虛則邪入而體不虛則邪無隙可入而不病也是故傷寒爲病屬內傷者十居八九後學無知舉世皆謂傷寒無補法但見發熱不分虛實一例汗下而致夭横者滔滔皆是此實醫門之罪人也今集此法於仲景之後

其應如響使人蒙之不犯虛虛實實之戒也
右綱目之文余以世醫治於傷寒無補法多犯虛虛之戒故備述之而刪其純內傷者及丹溪醫按之膚無者又增近代二醫按以為虛人感寒之活例云爾神而明之存乎其人不可泥也余嘗治一刻字工人新婚冬月冒寒表證悉具令以人參紫蘇莖葉各一兩煎湯飲之汗出而愈一孕婦春夏之交患溫病頭痛發熱不惡寒而渴未及療治胎墮去血無算昏眩欲絕余令以麥門冬飲許入淡竹葉香豉頻頻飲之亦汗出而愈蓋用勞復法治之得此活法則於治是病庶幾可十全矣

〇韓祗和氏和解因時法
傷寒病有可汗者論中但統言其可汗證及可汗脉或云脉浮而數或云脉浮緊或云脉浮無汗而喘或云脉浮為在表今略舉數條後人但憑其脉之大槩並不分脉浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之證誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易為開悟耳
一病人二三月已前兩手脉浮數或緩或緊按之差軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是自裏發證未見表脉也宜候寸脉力小如關尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脉未可投藥見脉未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以證為先脉為後治傷寒病以脉為先證為後
一病人兩手脉浮數而緊名曰傷寒若關前寸脉力小關後尺脉力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脉也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脉湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之

調脉湯方
葛根壹兩 前胡去苗 防風各柒錢半 甘草炙半兩
為麤末每服五錢水一盞生薑一塊如小指大劈破煎七分去滓溫服如寸脉依前力小加棗三枚同煎
葛根柴胡湯
葛根壹兩半 柴胡去蘆壹兩 芍藥
桔梗 甘草炙各柒錢半 厚朴半兩
右㕮咀每服五錢水一盞生薑二片煎至七分去滓熱服如寸脉依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯

人參　桔梗各柒錢半　麻黃去節壹兩

石膏叁兩　甘草炙柒錢半

右每服五錢水一盞荊芥五穗同煎至七分去滓熱服如寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

一病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈也若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷壹兩　葛根　人參

甘草炙各半兩　防風去蘆貳兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯

防風去蘆壹兩　桔梗炙錢　甘草炙

旋覆花各半兩　厚朴叁分

右㕮咀每服五錢水二盞薑一塊同煎熱服如三五服寸脈力尚小加荊芥穗五七莖同煎

香芎湯

川芎貳錢半　石膏貳兩　升麻叁兩

甘草炙　厚朴製各半兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸脈力尚小加細辛二分同煎

前一段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見而證猶未見尚可以藥解之故立方耳

一病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘為多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯

麻黃去節壹兩　葛根　蒼术各柒錢半

人參　甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞棗二枚煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荊芥七錢三五服後不惡風猶汗者加丁香皮半兩

七物柴胡湯

柴胡 去蘆　蒼朮 各貳兩　荊芥

麻黃 各壹兩　甘草 炙各柒錢

右㕮咀每服五錢水一盞薑一塊棗二枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止加當歸一兩同煎

發表湯

麻黃 去節壹兩　蒼朮 貳兩　人參

當歸 各半兩　炙甘草　丁香皮 各柒錢半

右㕮咀每服五錢水一盞入薑一塊棗三枚同煎至七分去滓熱服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝七錢如汗未止更加細辛半兩以汗止為度

一病人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發熱悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘為身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯

人參 半兩　柴胡 壹兩　芍藥

炙甘草 各柒錢半　石膏 貳兩

右㕮咀每服五錢水一盞薑一塊煎七分熱服如三五服後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯

前胡 壹兩　石膏 貳兩　甘艸 炙半兩

桔梗　豉 各柒錢半

右剉每服五錢水一盞薑五片煎七分去滓熱服如三五服熱尚未解加豉三十粒煎再服

石膏湯

石膏 貳兩　芍藥　柴胡 各壹兩

升麻　黃芩　炙甘草 各柒錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半豉一合煎八分熱服如三五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

一病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽之氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前宜知母湯主之

解肌湯

石膏貳兩 麻黃去節壹錢半 甘草炙
升麻各半兩
右㕮咀每服五錢水一盞入豉半合煎至八分去滓
熱服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩
芍藥湯
甘草炙半兩 芍藥壹兩 石膏叁兩
荊芥穗壹兩
右㕮咀每服五錢水一盞生薑一塊煎至七分去滓
熱服如三五服後猶惡風者每服加生薑一塊同煎
服

知母湯
知母壹兩 石膏貳兩 麻黃
升麻各壹兩 炙甘草半兩
右㕮咀每服五錢水一盞入生薑一塊同煎至七分
去滓溫服如三五服後猶惡風者加麻黃升麻各半
兩
前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後
脉證俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之
仲景云傷寒為病脉緩者為中風脉緊者名傷寒今
分此二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽
沉潛于骨髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引
內邪出或因外傷風而引內邪出及乎內邪既出而
為病一也古人云立此二端恐後人疑其緊脉與緩
脉治別也若中風與傷寒脉異何故仲景無別法治
之此乃後人不究仲景之心也病人始得病一二日
至五六日尚有表脉及表證亦可依脉證投藥凡投
解表及發表藥每一日可投二三服病證甚可至五服
外不可頻服藥也如證未解次日依前再投如證依
前未解可作熱粥投之粥內加葱白亦可如有汗出
勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽證也

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒
之脉頭小尾大傷風之脉頭大尾小李思訓保命新
書亦分尺寸與仲景同之非若前人總言尺寸脉俱
浮而緊尺寸脉俱浮而緩緊則為傷寒無汗緩則為
傷風自汗又有傷寒有汗者傷風無汗者脉亦互差
與證不同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大即
為傷寒尾小頭大即為傷風人病間有脉證未顯于
尺寸者故韓李述為和解因時法也又恐後人疑其
不與前聖合遂於本方內又立加減法數條亦不越
前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時故又

戒麻黃桂枝不可輕用改用羌活升麻葛根柴胡之
平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也
可汗一篇若隨湯液適證應見自有定規雖明哲不
可踰也
又寸口脈小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李
云傷寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷
霧露所傷寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不
能升越也傷寒寸口小者只於關部下至膀胱本部
見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若飲
冷舉按全無也若果寸口舉按全無即不可解表只
宜温中不可不知

惡寒 此門係初集故仲景法與後人續法混列以其類有係理不復致正讀者詳之

惡寒者風寒客於榮衛非寒熱之寒又非惡風也故不
待見風而後怯寒雖身大熱亦不欲去衣被也甚則向
火增被不能遏其寒所以然者由陰氣上入陽中或陽
微或風虛相搏之所致也惡寒一切屬表雖裡證悉具
而微惡寒者亦表未解猶當先解其外俟不惡寒乃可
攻也經云發熱惡寒發於陽可發汗無熱惡寒而踡脈
沉細發於陰可溫裏惡寒雖悉屬表亦有虛實之分若
汗出而惡寒為表虛無汗而惡寒為表實表虛可解肌
表實可發汗

傷寒太陽病在表故惡寒少陽半在表半在裏亦微惡
寒陽明在裏本不惡寒或惡寒者與太陽合病也
太陽發熱惡寒脈浮 方論見前太陽病發熱門
陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊亦
麻黃湯證也　陽明病脈遲汗多微惡寒者表未解亦
桂枝湯證也 三時用代熱加前例
少陽證頭汗出微惡寒小柴胡加桂湯
三陰惟少陰經有惡寒之證太陰厥陰皆不惡寒然少
陰惡寒又有二證發於少陰者無熱而惡寒宜溫之屬
理中湯四逆湯少陰無熱惡寒似與前太陽經未即熱

一條相似所謂寒未卽熱者爲太陽發其而未熱耳此之無熱惡寒蓋無太陽頭痛等證知爲少陰也

少陰病下利惡寒而踡四逆湯眞武湯小建中湯　若惡寒而踡時時自煩欲去衣被者活人用大柴胡湯下之趙氏以爲宜溫散陰邪導引眞陽汗而解可也若下之非惟不能解表反虛其裏使惡寒之邪乘虛內陷縱使其脈沉滑而實亦未可遽用大柴胡必須先解表使惡寒證罷而後可用也　少陰病惡寒身踡而利手逆冷者不治無陽故也　少陰四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死

外有太陰自利不渴厥陰下利厥逆俱或惡寒太陰宜理中湯厥陰宜四逆湯前既言二陰不惡寒今又言或惡寒要知太陰厥陰皆不惡寒者此陽傳陰者也三陰皆能惡寒者陰入陰者也特在少陰爲多耳

惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之[illegible]

四逆加人參湯方

人參　乾薑　甘草各壹兩　附子壹枚去皮綬

右㕮咀每服五錢水煎溫服日三

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之[illegible]

芍藥　炙甘草各叁兩　附子壹枚炮去皮破八片

已上三味以水五升煮取一升伍合去滓分溫服疑非仲景意[illegible]

下後復發汗心振寒脈微細者此內外俱虛也當歸四逆湯眞武湯

太陽病下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之

桂枝去芍藥湯方

桂枝去皮麄　生薑切各壹兩　甘草炙壹兩

大棗陸枚

右㕮咀每服五錢水煎溫服

若微惡寒者去芍藥加附子湯主之前方加附子半箇去皮炮[illegible]活人云[illegible]

傷寒汗下後心下痞而惡寒者表未解也先用桂枝湯解表用大黃黃連瀉心湯攻痞若痞而汗出惡寒者表已解也附子瀉心湯主之方見痞

背惡寒背負陽抱陰背寒者陽弱也然有陰陽二證少

陰一證以陰寒氣盛不能消耗津液故口中和三陽合病以陽氣陷入津液爲之涸故舌乾口燥以此別之思過半矣　口中和而背惡寒者屬少陰宜附子湯

舌乾口燥內有熱證口中不仁背惡寒者爲三陽合病宜白虎湯　經云腹滿身重面垢譫語遺尿口中不仁爲三陽合病白虎加人參湯主之　若自汗者亦用白虎加人參湯　又陽明證背微惡寒無大熱口中燥渴者亦用白虎加人參湯　中暑亦有背惡寒證但面垢自汗脈虛而伏詳見雜病中　凡脾胃素虛之人遇暑月間飲冷水或啖生冷寒氣蓄聚陰上乘陽

故寒從背起冷如掌大此當以溫藥主之

惡風

衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也故風邪中於衛也則必惡風惡風惡寒俱爲表證但惡風比惡寒爲輕耳惡寒者雖不當風而時自怯寒惡風者居密室之中幃帳之內則無所畏或當風或揮扇則淅淅然而惡也惡寒則有陰陽之分惡風雖屬陽耳所以三陰之證並無惡風惡風雖在表而發散又自不同若無汗惡風則爲傷寒當發其汗故用麻黃湯若汗出惡風則爲中風當解其肌故用桂枝湯裏證雖具而惡風未罷皆當先解其外也

發熱惡風爲表虛屬太陽病　發汗後遂汗漏不止其證似風濕相搏證背惡風汗出小便不利四肢難屈伸但心下不滿者身不痛用桂枝加附子湯

風濕相搏者骨節煩疼掣痛用甘草附子湯

身熱惡風項強脇滿手足溫而渴者用小柴胡湯

太陽

頭痛

傷寒頭痛雖屬三陽惟太陽經獨多蓋太陽為病屬表而頭痛專為主表雖有傷寒六七日頭痛不大便有熱而與承氣湯下之者却云若小便清者知熱不在裏仍在表是知頭痛屬表明矣太陰少陰二經之脈從足至胸而還不上循頭故無頭痛惟厥陰脈循喉嚨之後上連目系與督脈會於巔亦有頭痛乾嘔吐涎沫吳茱萸湯一證却無身熱亦與陽證不同也然風温病在少陰濕温病在太陰而頭反痛至於陰毒亦然是又不可拘拘為者內因頭痛作止有時外因頭痛常常有之直須傳入裏方罷

發熱頭痛惡風屬太陽 方論見太陽病發熱　大便不利六七日頭痛身熱小便赤者宜承氣湯若小便利者知不在裏仍在表須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯 方論見前鼻衄　服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯 方論見項強　太陽中風下利嘔逆表解者可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯 方論見結胸

然或謂十棗湯與桂枝去桂加茯苓白朮湯二者皆屬飲家俱有頭項強痛之病何也此經絡所繫非偶爾而言也針經曰太陽膀胱之脈起于目內眥背上額交巔上其支者從巔上至耳上角直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱上支所絡腎者即三焦也夫三焦者為陽氣之父決瀆之官引導陰陽開通閉塞水道出以氣化而言也緣太陽經多血少氣既病則氣愈弱其時表病而裏熱未甚微渴而恣飲水漿為水多氣弱不能施化遂停伏于內則本經血氣因而凝滯致有頭痛項強之患矣若伏飲流行經絡疏利而頭痛自愈矣

病發熱頭痛脈反沉若不瘥身痛當救裏四逆湯 方論見發熱

刺　太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈 傷寒自一日至六日傳三陽三陰經盡至七日當愈經曰七日太陽病衰頭痛少愈若七日不愈則太陽之邪再傳陽明針足陽明為迎而奪之使經不傳則愈[illegible]太陽也宜刺腕骨京骨又云表證頭疼惡寒發熱刺合谷

陽明

陽明身熱頭痛漱水不欲嚥必發衄脈數者犀角地黃湯茅花湯 見鼻衄　陽明病表裏大熱煩渴引飲頭痛如破者宜竹葉石膏湯　陽明頭痛不惡寒反惡熱大便實調胃承氣湯　陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭

不痛（[illegible]）

吴陽明頭痛額前目疼鼻乾脈長也無汗者葛根加葱白白芷汗之若有汗曾經發汗頭痛不解者宜葛根葱白湯主之若不惡風而反惡熱自汗煩渴脈洪數飲水頭疼者白虎加白芷湯主之若内有燥屎蒸蒸發熱頭痛者調胃承氣湯主之凡陽明頭痛無汗者葛根麻黄葱白白芷石膏之屬也有汗則白芷石膏葛根川芎湯也

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可發汗汗之則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸宜小柴胡湯（[illegible]）

吴少陽經頭痛頭角或耳中痛脈弦數口苦發熱往來寒熱者並用小柴胡湯和之一方加川芎尤妙蓋川芎亦膽經藥也凡少陽頭痛不分有汗無汗皆以柴胡湯主之非次頭痛及發寒熱脈緊不大即是上膈有痰瓜蒂散吐之

頭痛乾嘔吐涎沫者吴茱萸湯（方[illegible]） 活人云厥陰頭痛為欲愈小建中湯

活若已發汗或未發汗頭痛如破者用連鬚葱白湯

連鬚葱白湯方

葱白（連鬚切半斤） 生薑（二兩）

右以水二升煮取一升分二次温服再不止者宜服後方

葛根葱白湯方

葛根 芍藥 知母（各半兩）

川芎 葱白 生薑（各[illegible]）

右以水三升煎至一升熱服

若非次頭疼胸中滿及發寒熱脈緊而不大者即是膈上有涎宜用瓜蒂末一錢煖水調下吐涎立愈

雲傷寒汗下後頭痛起目眩者宜獨活湯

防風 獨活 旋覆花 當歸（各等分）

右㕮咀薑水同煎服

傷寒熱病後頭痛不止者用石膏川芎湯

石膏 川芎（各壹兩）

右㕮咀每服五錢水煎服

海太陽頭痛有汗桂枝湯無汗麻黄湯 陽明頭痛白虎湯 少陽頭痛小柴胡湯 太陰頭痛脈浮桂枝湯脈浮理中湯俱加川芎細辛 少陰頭痛小柴胡湯麻黄附子細辛湯 厥陰頭痛外傷本經桂枝麻黄各半

湯　嘔而微吐苦水者吳茱萸湯
𤸷太陰頭痛者必有痰也少陰頭痛者足寒而氣逆也
蓋太陰少陰二經雖不至頭然痰與氣逆壅於膈中則
頭上氣不得暢降而爲痛也
雲如脉浮而頭痛過在手足太陽刺完骨京骨　如脉
浮而長過在手足陽明刺合谷衝陽　如脉浮而弦過
在手足少陽刺陽池丘墟風府風池此刺頭痛之法也
集傷寒頭痛刺合谷攢竹

項強

發熱惡風項強者爲太陽（方論見太陽病發熱）　太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之太陽病項背強几几無汗而惡風者葛根湯主之皆發散之劑也而有輕重不同者蓋發熱汗出惡風爲表虛表虛者可解肌無汗惡風者爲表實表實者可發汗是以爲治不同也　太陽傷寒項背強其或太陽中風加之寒濕而成痓者亦項強也經曰病者身熱足寒頸項強急惡風時頭熱面赤目脉赤獨頭面搖動卒口噤背反張者痓病也金匱曰太陽病項背強几几然脉反沉遲者此爲痓桂枝加括蔞湯主之　服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯（[illegible]）　傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯　若下後不能食身黃小便難者與柴胡湯必反重（方論俱見各條）　結胸者項強如柔痓狀下之則和大陷胸丸（結胸）　太陽與少陽併病頭項

頭痛或眩冒時如結胸心下痞鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞不可汗汗則譫語脉弦五六日譫語不止刺期門[illegible]

太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺俞慎勿下之心下痞鞕而眩者少陽也頸項強者太陽也刺大椎肺俞以瀉太陽之邪以太陽脉下項挾脊故爾肝俞以瀉少陽之邪以膽為肝之府故爾太陽為在表少陽為在半表半裏證兼兩經是半表半裏證[illegible]云不可發汗汗則譫語是發汗攻太陽之邪少陽之邪益甚干胃必發譫語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛入裏必作結胸經曰太陽少陽併病而反下之成結胸小柴胡加桂亦可

桂枝去桂加茯苓白术湯方

芍藥　生薑　白茯苓

白术各壹兩半　甘草壹兩　大棗陸枚

右㕮咀每服五錢水煎溫服小便利即愈

心下滿痛小便利者成結胸小便不利為停飲故加苓术以行之

項強卒口噤背反張為痓 方論見痓門

體痛

體痛乃六經俱有之證有表有裏有寒有熱有風有濕如太陽傷寒蓄血不利身疼者宜發汗若汗後脉沉遲體痛者又宜溫之中暍身疼者白虎湯解之裏寒外熱身疼者先當救裏而後攻表寒在三陰則脉沉身疼風在三陽則支節煩疼四逆柴胡之劑可不審哉　太陽身痛但拘急耳中濕身痛不可轉側陰毒身痛體勢沉重宛如被杖以此別之

太陽發熱惡寒身體痛者屬太陽病麻黃湯大青龍湯是也 方論並見太陽　若無心下支結者柴胡加桂枝湯

若兼下利清穀腹脹者先以四逆溫裏後以桂枝發表

若尺脉遲者血少榮氣不足活人先以黃芪建中湯養其血俟尺脉回却用柴胡等湯和解之

黃芪建中湯方

黃芪　桂枝各壹錢半　白芍藥貳錢　甘草壹錢

右四味以水壹鍾半薑五片棗二枚煎至八分去滓入稠餳一大匙再煎服舊有微溏或嘔者不用餳

按熱多寒少尺脉遲者榮血不足黃芪建中湯夫血不足而用黃芪者黃芪味甘加以甘草大能生血此仲景之妙法盖稼穡作甘甘能補胃胃為氣血之海

氣血所從以生又內經曰無陽則陰無以生以甘益胃而生血旨哉今人但知參芪爲氣藥故表而出之

發汗後身體痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑人參新加湯主之

桂枝　人參　芍藥

生薑　甘艸　大棗

右㕮咀每服五錢水煎溫服

成汗後身痛邪氣未盡也脈沉遲榮血不足也經云其脈沉者榮氣微也又云遲者榮氣不足血少故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生薑人參以益不足之血

張或云經言表邪盛脈浮而緊法當身疼痛宜以汗解之況身疼皆係表邪未盡此又加人參芍藥生薑以益血何也予曰表邪盛則身疼血虛則身亦疼其脈浮緊者邪盛也其脈沉微者血虛也盛者損之則安虛者益之則愈仲景凡言發汗後以外無表證裏無熱證止餘身疼一事而已若脈稍浮盛則爲表邪未盡解今言脈沉遲此血虛而致然也故加人參生薑芍藥以益血

病發熱頭痛脈反沉若不瘥身痛當救裏四逆湯（論見發熱）

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之

桂枝附子湯方

桂枝（去皮）　附子　生薑

甘草（炙）　大棗

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

若其人大便鞕小便自利者去桂枝加白朮湯主之

風濕相搏骨節煩疼掣痛不能屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘艸附子湯主之

甘草　白朮　桂枝　附子（壹枚炮）

右㕮咀作四劑水煎溫服

陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脈緊則愈（桂枝湯）

太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者為欲愈

少陰病身痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯　少陰病至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者有水氣真武湯

厥陰大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯

身體痛下利[illegible]　身體痛吐利為霍亂[illegible]

身體痛手足寒者脈沉但欲寐者附子湯[illegible]　若大汗出熱不去內拘急省利惡寒者四逆湯[illegible]

若夏月中暑脈虛而渴者白虎加人參湯[illegible]　身痛如被杖面目青咽痛者為陰毒升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯方論見[illegible]

垣風濕相搏一身盡痛者補中益氣湯加羌活防風升麻藁本蒼朮治之如病去勿再服以諸風藥損人元氣而益其病故也

海神朮湯治風濕惡寒脈緊無汗　白朮湯治風濕惡風脈緩有汗俱見傷寒發熱條

右二朮湯治風濕又當隨證加減其詳並見痙條及白朮神朮二湯後

活杏仁湯　治風濕身體疼痛惡風微腫

桂枝貳兩　麻黃去節[illegible]　芍藥

天門冬去心[illegible]　生薑[illegible]　杏仁[illegible]

右㕮咀每服五錢水煎溫服

垣麻黃復煎湯治陰室中汗出懶語四肢困倦乏力走疰疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁熱汗出一身疼痛蓋風濕相搏也以麻黃發汗漸漸發之在經者亦宜發汗況值季春之月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升困倦乃退血氣俱得生旺也

麻黃去節用水五盞先煎令沸去上沫渣再煎至三盞方入下藥

黃芪貳錢　白朮　人參

柴胡根　防風　生地黃各伍分

羌活　黃檗各壹錢　甘草叁分

杏仁五箇去皮尖

右㕮咀作一服入麻黃湯煎至一盞臨卧服勿飽服

當歸拈痛湯　治濕熱為病身體疼痛方見[illegible]身體痛門

傷寒證治準繩帙之二

傷寒證治準繩帙之三

金壇王肯堂輯　門人南昌張　綍校

陽明病　胃實不大便　自汗　不得卧　潮熱
譫語　狂亂　循衣摸牀　渴　嘔　乾嘔

黄陽明之爲病胃家實是也謂之正陽陽明屬下證輕則大柴胡重則大小承氣此邪自陽明經傳入府者經曰陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿有潮熱者此欲解可攻裏也手足濈然汗出者此是大便已鞕也大承氣主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下謂陽明亦有在經者未全入府猶宜解外縱有大滿大府不通亦不過小承氣微下之入胃在經猶宜兩審也其陽明一證少有自病多因太陽傳入兼與太陽陽明合病用葛根湯者是也少陽陽明合病用黄芩芍藥湯者是也自少陽傳入陽明及未合併病者亦然

陽明經治法有汗吐下温和解剌

汗

桂枝湯　麻黄湯　五苓散此亦作汗劑
麻黄連軺赤小豆湯

吐

梔子豉湯

下

調胃承氣湯　大承氣湯　抵當湯
麻仁丸　茵蔯蒿湯　小承氣湯

温

呉茱萸湯　四逆湯

和解

白虎湯　白虎加人參湯　猪苓湯
小柴胡湯　蜜導煎　猪膽汁

土瓜根　梔子蘗皮湯

剌

熱入血室剌期門

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也荅曰太陽陽明者脾約是也[illegible]脾約大便則難其脾為約[illegible]丸主之太陽[illegible]曰發汗不解[illegible]發熱[illegible]也[illegible]以承氣湯主之正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩熱大便難是也[illegible]不可下也[illegible]小承氣[illegible]微和之[illegible]少陽復[illegible]按本草大黄[illegible]浸入太陽經[illegible]入陽明經病之[illegible]下[illegible]已浸引之耳又按太陽陽明正陽陽明[illegible]承氣[illegible]中[illegible]用酒浸惟少陽陽明為下[illegible]故小承氣湯中不用[illegible]也以此[illegible]之劑入陽陽明當用調胃承氣湯蓋以調胃承氣既

[illegible]陽明篇中而大黃下證曰[illegible]二陽陽明當用大[illegible]氣二六大黃證[illegible]小承氣湯不[illegible]下故[illegible]書[illegible]太陽陽明[illegible]也[illegible]

問曰何緣得陽明病

答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣内實大便難者此名陽明也

成本太陽病寒不解因發汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明古人登廁必更衣不更衣者通為不大便不更衣則胃中物不得泄故為內實胃無津液加之畜熱大便則難為陽明裏實也

傷寒脉浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者為陽明病也

浮為陽邪緩為脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在太陰則手足溫邪在少陰厥陰則手

足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰土也為邪蒸之則色見於外當發身黃小便自利者熱不內蓄不能發黃至七八日大便鞕者即太陰之邪入府轉屬陽明也

陽明病若能食名中風不能食名中寒

成陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海風為陽邪陽氣殺穀故中風者能食寒為陰邪陰邪不殺穀故傷寒者不能食

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛

按目眩之眩其字从目从玄謂其眼中黑[illegible]也[illegible]之[illegible]當作苦藥不瞑眩之眩[illegible]皆當[illegible]不可拘執[illegible]陽明病身不重痛但頭眩而不惡寒者陽明中風而風氣上攻也經曰陽明病若能食名中風風邪攻胃胃氣上逆則欬咽門者胃之系欬甚則咽傷故必咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也[illegible]

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

以其人本虛故攻其熱必噦

不能食胃中本寒攻其熱復虛其胃虛寒相搏故令噦也經曰關脉弱胃氣虛有熱不可大攻之熱去則寒起此之謂也

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

[illegible]

陽明病欲解時從申至酉止

[illegible]

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也

[illegible]

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

成合通也陽明病面色通赤者熱在經也不可下之下之虛其胃氣耗其

津液經中之熱乘虛入胃必發熱色黃小便不利也

張氏夫陽明病理必近于可下但以面赤其熱猶在經故云不可攻若攻之則經中之熱悉入于胃鬱蓄而發黃色譬如下之太早成結胸之類

陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病腹滿者為邪氣入府可下之心下鞕滿則邪氣尚淺未全入府不可便下之得利止者為邪氣去正氣安正氣安則愈若利不止者為正氣脫而死

[illegible]

胃實不大便 大便秘 [illegible]

成不大便大便難大便鞕燥屎悉屬裏證宜下者多矣然而有表未罷風濕相搏尤宜先解表已而下之可也如經曰傷寒不大便六七日頭疼有熱者小便清知不在裏仍在表是也其證多見于陽明蓋胃土萬物所歸無所復傳自太陽少陽傳入者衆所共知而於三陰傳入者鮮或能識若能熟視其微則三陰有急下之證多矣豈非仲景之微意歟

胃實有表者先解表 傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯 [illegible]

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黄湯 陽明病脇下鞕滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解也 病腹滿不大便舌上胎黄者為邪熱入府可下若脇下鞕滿雖不大便而嘔舌上白胎者為邪未入府在表裏之間與小柴胡湯以和解之上焦得通則嘔止津液得下則胃氣以和汗出而解

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黄小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黄湯若不尿腹滿加噦者不治 [illegible]

六

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也 口苦咽乾脈浮緊宜和 [illegible]

陽明腹滿 [illegible]

陽明病脈浮而緊脈浮緊口苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗忌加燒針忌下 [illegible] 陽明病脈浮而緊者潮熱發作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲景之法雖有胃實證若表未解及有半表者亦先

用桂枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

胃實表解無證者忌攻大便鞕者導之陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬之稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捻作挺令頭銳大如指長二寸許乘熱急作之納穀道中用手急抱住欲大便時乃去之又猪膽汁方用大猪膽一筒瀉汁和醋少許和匀灌入穀道中如飯時頃大便自去

便鞕無所苦者俟之太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴此轉屬陽明也小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散 [illegible]此太陽[illegible]邪氣[illegible]在[illegible]無滿實雖不更衣十日無所苦也候津液還入胃中便數少大便必自出也渴欲飲水者少少與之以滋胃氣但當[illegible]所在以法救之如渴不止與五苓散[illegible]

○或問上條云小便數者大便必鞕不更衣十數日無所苦也當有四五日六七日不大便者即攻之今言雖十日不更衣而不用攻伐何也曰此非結熱乃津液不足[illegible]經曰陽明病本自汗出醫更重發汗[illegible]小便日三四行今日再行[illegible]津液當還入胃中故知不久必大便[illegible]若[illegible]不大便而無所苦者[illegible]下證者此津液不足當須自欲大便勿以日數久而攻下也

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

胃實表解有證者隨證攻之陽明病潮熱不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯轉失氣者有燥屎可攻若不轉失氣者無燥屎不可攻 [illegible] 陽明病汗出大便鞕而讝語者宜小承氣湯 [illegible] 不大便腹滿者宜下之若但繞臍痛者則為燥屎宜承氣湯 若心下至小腹滿痛者則為結胸宜陷胸湯 [illegible] 陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯 [illegible]陽明[illegible]不吐不下[illegible]胃[illegible]三陽[illegible]陽[illegible]太陽經[illegible]為多故雖引之於至高之分[illegible]必寄以取之也故仲景以調胃承氣收入太陽門而大[illegible]

又注云宜及許其用承湯一則曰少與小承氣湯服二劑門曰知胃氣與調胃承氣湯又詳本湯之證則曰不可又下心煩者又發汗不解蒸蒸發熱又吐後腹脹滿是一腹滿湯邪去表未遠其病在上不當攻下故宜緩劑以調和之也又至上焉陽明則皆用急下之與大承氣湯言大承氣湯中大黃[illegible]走下之性以[illegible]全其分為行故小承氣湯[illegible]下故又曰[illegible]也東垣[illegible]太陽不宜下故[illegible]氣台太陽[illegible]之證[illegible]不[illegible]無[illegible]

小便不利大便乍難乍易有微熱喘冒不臥者宜大承氣湯詳見不得臥　傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯成注諸脉皆屬于目傷寒六七日邪氣入裏之時目中不了了睛不和者邪熱內甚上熏於目也無表裏證大便難者裏實也身大熱者表熱也身微熱者裏熱也針經曰熱病目不明熱不已者死此目中不了了睛不和則證之急者也須大承氣湯下之○趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之[illegible]

麻仁丸方

麻子仁貳升　芍藥半斤　枳實半斤炒

大黃壹斤去皮　厚朴壹尺去皮炙　杏仁壹升去皮尖炒熬作脂

右六味為末煉蜜丸如桐子大飲服十丸日三服漸加以知為度成內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易去聲其色必黑宜抵當湯主之方見畜血　無表裏證下後脉數不解消穀易饑六七日不大便者有瘀血宜抵當湯

許有一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澀神昏而睡診其脉長大而實予用承氣下之而愈一則陽明自汗大便不通小便利津液少口乾燥其脉亦大而虛作蜜煎三易之下燥糞得溏利而解其家曰皆陽明不通何以治之異予曰二證雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五藏為無津液也然則傷寒大證相似兩證稍有不同宜子細斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時中有淺深故知不可不謹

便初鞕後溏仲景論中有四證內有二證不言小便一證言小便不利一證言小便少其二證不言小便者陽明病潮熱不大便六七日與小承氣湯不轉失氣者此但初鞕後必溏不可攻之此胃中邪熱未作

實者也又太陽病下之心中懊憹而煩腹滿者初鞕後必溏此虛煩熱在上胃中無燥屎者也其一證小便不利者陽明病中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作痼瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中水穀不別故也又一證言小便少者服承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之是知仲景測大便法皆以小便覘之如小便清知不在裏利不止者利其小便小便數少津液當還入胃中必大便皆可驗者然小便利屎定鞕固為可攻

亦有小便自利大便鞕而不可攻者何哉陽明病自汗或發汗小便自利此為津液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導蓋非裏實故不可攻也太陽病又一證云若吐若下若發汗微煩小便數大便鞕與小承氣湯和之此兩證汗後大便鞕小便利皆同而治法不同者後證為有傳邪故微煩又因發汗吐下後小便數內亡津液大便鞕是熱邪入裏故以小承氣利之至若前證小便自利以無傳邪故無煩證大便雖鞕不得為裏熱但腸頭乾燥止可用蜜導也讀仲景書者宜詳究焉

不得卧

不得眠陰陽皆有之正病於不得眠者陽明也若少陰當病於欲寐今乃不得眠緣陽氣入少陰經非少陰正病也有因汗下而然者有不因汗下而然者有因火逆而然者治見本條但不得眠皆為熱證其有太陽汗下之後晝日煩躁不得眠一證雖用乾薑附子湯蓋復其汗下所亡之陽非治其所感之寒病也不得眠為常證然少陰脈沉細自利煩躁不得眠者死傷寒發熱下利厥逆煩躁不得卧者亦死俱為正氣弱陽不能復故也

活人云汗為火之液汗多則神昏故不眠大熱則神

不清故不眠大下則動血心主血故不眠瘥後熱氣未散陰氣未復故不眠

太陽病二三日不得卧但欲起心下必結脈微弱者此有寒分也桂枝加厚朴杏子湯　傷寒脈浮以火劫之驚狂起卧不得安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯　下後復發汗晝日煩燥不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱乾薑附子湯　衄家不可汗汗則額上陷脈急緊直視不眴不得眠黃芩芍藥湯　傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯　發汗吐下後虛煩不得眠反覆顛倒心中懊憹梔子豆豉湯

太陽病發汗後胃中乾燥不得眠欲飲水者少與之則愈

陽明身熱目疼鼻乾不得卧尺寸脉俱長者陽明受病也病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯　陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若加燒針必怵惕煩躁不得眠梔子豉湯

少陰病欲寐二三日後心煩不得卧者黃連阿膠湯主之

黃連阿膠湯方

黃連 肆兩　黃芩 貳兩　芍藥 貳兩

阿膠 叁兩　雞子黃 貳枚

右五味以水五升先煮三物取二升去滓納膠烊盡小冷納雞子黃攪令相得溫服七合日三服

成 陽有餘以苦除之黃連黃芩之苦以除熱陰不足以甘補之雞子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱也○然服雞子黃其病有不愈者令議加當歸人參茯苓白朮各等分與前藥四味服之立效

少陰病下利欲寐六七日後欬而嘔渴心煩不得眠者宜猪苓湯 論見下利　少陰病但欲寐脉沉細不煩欲吐至五六日自利復煩躁不得寐者死　發熱下利厥逆煩躁不得卧者死

吳 太陽脉浮數身疼無汗煩躁不眠者宜汗之則愈

陽明標熱頭額痛目疼身熱鼻乾不得卧脉長者宜葛根解肌湯汗之若自汗脉洪數表裏俱熱煩渴舌燥飲水者白虎加人參湯主之若蒸蒸發熱大便秘鞕者調胃承氣湯下之外有傷寒已解或因食復劇煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯主之若表裏大熱舌燥飲水者人參白虎湯合解毒湯主之　凡少陽發熱口苦心煩不得眠脉弦數者小柴胡加黃連山梔子之類若虛弱人津液不足者加麥門冬酸棗仁之類　太陽病發汗後不得眠脉浮數微熱煩渴小便不利者五苓散主之脉數大者宜人參白虎湯或竹葉石膏湯不可用五苓也　凡汗下後虛煩不得眠者加味溫膽湯酸棗仁湯梔子烏梅湯朱砂安神丸之類選而用之

○附

酸棗仁湯治虛煩擾奔氣在胷中不得眠者

酸棗仁 炒　人參　茯苓 各壹錢半

桂心 伍分　石膏 貳錢半　知母

甘草 各壹錢　生薑 叁片

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓臨卧服

千金流水湯治虛煩不得眠

麥門冬去心 半夏 甘草
黃連 遠志 人參
萆薢以上各壹錢 茯神 酸棗仁各壹錢半
桂心伍分 生薑叁片 米壹合

右用長流水二鍾半先煮水令蟹目沸以杓揚萬徧取湯二鍾煎藥至一鍾去滓溫服

加味溫膽湯治太陽病後虛煩不得眠此膽寒也

半夏泡 酸棗仁炒各壹錢半 綠枳實
陳皮 甘草各壹錢 人參貳錢半
茯神貳錢 竹茹壹團 生薑叁片

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服若心煩內熱者倍加黃連麥門冬若口燥舌乾者去半夏加麥門冬五味子天花粉若有表熱未清加軟苗柴胡若內虛大便自利者去枳實加白朮茯苓若內實心煩顛倒者加山梔仁

酸棗湯治吐下後晝夜不得眠

酸棗仁炒貳錢半 麥門冬 茯神
當歸身各貳錢 甘草 知母
川芎以上各壹錢 乾薑叁分 生薑叁片

右煎法同前

梔子烏梅湯

梔子 黃芩 甘草
人參 麥門冬以上各壹錢 柴胡貳錢
烏梅壹箇 生薑叁片 竹葉拾片

右煎法同前

黃連解毒湯治大熱乾嘔錯語呻吟不得眠

黃連貳錢半 黃芩 黃檗各壹兩
梔子肆箇

水二盞半煎至一盞半去滓分二服

自汗 附盜汗 頭汗 手足汗 無汗 不得汗

衛氣者護衛皮膚肥實腠理禁固津液不得妄泄邪氣干之則不能衛固於外由是津液妄泄濈濈然潤漐漐然出不因發散而自汗出也傷風則發熱自汗中暍則汗出惡風而渴風濕甚者則汗多而濡是風與暑濕為邪皆令自汗惟寒邪傷榮而不傷衛是以膚腠閉密汗不出也始雖無汗及傳入裏而為熱則榮衛通腠理開亦令汗自出矣自汗又有表裏之別虛實之異若汗出惡風及微惡寒者皆表未解宜發散至于漏不止而惡風及發汗後惡寒者表虛也宜溫之此皆邪氣在表若

汗出不惡風寒者此表解裏病下之則愈如陽明發熱汗出此為熱越及陽明發熱汗多急下之者是也自汗雖常證或汗出髮潤如油如貫珠着身不流皆為不治必手足俱周徧身悉潤漐漐然一時汗出熱已身凉乃為佳兆

身熱汗出惡寒屬表病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯 風則傷衛寒則傷榮衛受風邪而榮不病者為榮氣和也衛氣客邪則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮膚是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則愈○餘詳見前太陽病條　無項強痛者桂枝加葛根湯 [illegible]　無骨節煩疼不得屈伸小便不利者甘草附子湯 [illegible]　若發汗後遂漏不止惡風者桂枝附子湯 [illegible]　汗出而渴者五苓散　不渴者茯苓甘草湯

活人云傷風自汗桂枝湯雖用須子細消息之假令傷風自汗若脉浮而弱設當行桂枝服湯後無桂枝脉息證候而煩者即不可再服也若傷風自汗出而小便數者切不可與桂枝也又太陽病自汗四肢拘急難以屈伸若小便難者可桂枝湯內加附子服之若小便數者慎不可與桂枝附子湯宜服芍藥甘草湯若誤行桂枝附子攻表便咽乾煩躁厥逆嘔吐作

甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸

趙有發汗漏風小便難與自汗小便數二證相近似溫仲景亦恐後人誤認故重出一章問荅以明之前一證云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝附子湯主之蓋是因邪發汗遂漏不止乃服汗藥太過非自汗也惡風者餘邪未盡也小便難四肢急為亡津液筋失所養也乃汗多亡陽外虛經氣病帶表邪不在裏也故宜附子溫經桂枝解表芍藥益血舒筋也此又一證云蓋是脉浮

為虛也汗自出微惡寒者陽虛無以衛外也小便數
為下焦虛寒不能制水也心煩為陰虛血少也脚攣
急乃血為汗奪筋無以潤養也此初得病便自表裏
俱虛外無陽證病不在表固不得與桂枝同法設若
誤用桂枝攻表重發其汗是虛虛也固得之便厥咽
乾煩躁吐逆厥為亡陽不能與陰相順接咽乾為津
液寡煩躁吐逆為寒格而上也故宜乾薑以溫裏復
陽甘草芍藥益其汗奪之血然後可以復陰陽不足
之氣得脚伸後或譫語者由自汗小便數胃家先自
津液乾少又服乾薑性燥之藥以致陽明內結譫語

雖然非邪實大滿故但用調胃承氣以調之仍少與
之也原其芍藥甘草湯乃是厥愈足溫後專治兩脛
攣急之藥非正治脉浮自汗出小便數之藥也今活
人書却云芍藥甘草湯主脉浮自汗出小便數者何
也又云通治誤服桂枝湯後病證仍存者愚不知芍
證何似可用如上仲景藥法蓋嘗復玩味而紬繹焉
自常人觀之豈不曰自汗小便數譫又無自利遽用
乾薑溫之因而以致結燥譫語後却用芒硝大黃寒
藥以解其熱似若失次病家遇此必咎醫者以為誤
用乾薑熱燥之失後藥解先之差矣殊不知仲景之

意不患乎乾薑之熱燥惟患乎正氣之虛正氣之長
邪氣之所由消也且自汗小便數等證為表裏俱虛
治法必先復其陰陽不足之正氣然非乾薑芍藥甘
草不可至於正氣陰陽已復而內有所主則雖胃燥
譫語不過大便內結大黃芒硝潤滑而去之而正氣
內強不至下脫結燥而正氣安矣以上用藥次第先
熱後寒先補後瀉似逆而實順非仲景之妙孰能至
是哉後之學者可不以此推廣而應變又何暇辯病
家之謗訕也耶

若夏月中暑自汗身熱惡寒脉微弱口渴足冷者白虎

加人參湯主之 方法詳見雜病中暑門

身熱汗出不惡寒屬裏為陽明本證問曰陽明外證云
何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也 大承氣湯 問曰病
有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一日惡
寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自能罷
曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日
自止此為陽明病也 傷寒轉屬陽明者其人濈然微
汗出也 中風則有汗傷寒無汗惟入陽明乃有汗故曰陽明病法多汗
熱便鞕譫語者下之 汗出身熱不惡寒便鞕譫語者宜
承氣湯 方見譫語 陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣

湯

〔許〕有人患傷寒目痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱大已數日一夕汗出予謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明自汗津液已渴法當用蜜煎何須苦用下藥予謂曰子雖知蜜煎爲穩當還用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能知之予力爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能讀也予謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之說凡稱急者有三變謂纔覺汗未至津液乾燥便速下之則爲精捷免致用蜜煎也若胸中識得了了自無可疑若未能了誤用之反不若蜜煎之爲穩也

〔無〕脈浮緊口苦者忌汗下針宜和解陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則心憒憒反譫語若加燒針必怵惕躁不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之 [illegible]

[illegible]

〔無〕小便不利者分欲食不欲食陽明欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解此水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈桂枝湯羌活湯

[illegible] 陽明病若中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作痼瘕必大便初鞕後溏以胃中冷水穀不別故也 [illegible]

〔無〕心下痞汗出心下痞滿有二證其痞按之濡輭不痛而惡寒者宜附子瀉心湯其痞按之鞕引脇痛而身體不惡寒者宜十棗湯方論見痞門

〔無〕下利汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯　下利清穀者通脈四逆湯　汗出下利有微熱者其脈數自愈脈緊未愈　六七日後發熱而利其人汗出不止者死條見下利

〔無〕吐利脈緊反汗出而咽痛吐利者少陰病亡陽　吐利汗出手足厥冷脈微欲絕者四逆湯　吐利止汗出而厥脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯俱見吐利

〔海〕太陽自汗桂枝湯　陽明自汗白虎湯　少陰自汗四逆湯

陽明證身熱目痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡熱而尺寸俱浮者白虎湯主之　傷寒尺寸脉俱長自汗大出身表如氷石脉傳至於裏細而小及瘧疾但寒不熱其人動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加桂枝主之然脉雖細小當以遲疾別之此瘧脉疾而非遲故用此法[illegible]

[illegible]

活傷寒病發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白术牡蠣散次服建中湯

防風白术牡蠣散　治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風　牡蠣炒成粉　白术各等分

右為細末每服貳錢以酒調下米飲亦得日二三服汗止後服小建中湯

集傷寒汗多不止　內庭穴　合谷穴　復溜穴

似陽明外證太陽病吐後汗出不惡寒發熱關上脉細數曰小逆此吐後似陽明證而關脉細　太陽病發熱汗出不惡寒者為柔痓[illegible]而身反張　發汗已身灼熱者名風溫風溫為病脉浮汗出身重多眠

汗吐下後自汗二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也[illegible]

發汗則愈內經曰諸過者切之濇者陽氣有餘為身熱無汗是以脉濇知陽氣擁鬱而汗出不徹○况經文言或言若言設言假令者皆更端之詞即成氏所謂或為之證也[illegible]不徹不足言正與可小字相反○因太陽故當汗因併陽明故當小發先子最有次第仲景之[illegible]也

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者與麻黃杏仁甘草石膏湯　發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草石膏湯　服桂枝大汗出脉洪大者仍與桂枝若形如瘧日再發者汗出必解桂枝二麻黃一湯　太陽病發汗後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之胃和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散

傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之柴胡

證仍在者復與柴胡湯雖下之不為逆必蒸蒸而振發熱汗出而解　太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之仲景[illegible]

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈[illegible]

也是當汗出愈若下之身重心悸者獨其津液虛其胃氣若身重心悸而尺脈實者則下後裏虛邪氣乘虛傳裏也今尺脈微身重心悸者知下後裏虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則不可發汗須裏氣實津液足便自汗出而愈　宜麻黃湯桂枝加白朮茯苓甘草湯下後桂枝加芍藥湯

太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也詳發　太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如不因下病人不惡寒而渴者此轉屬陽明渴欲飲水少少與之宜五苓散　傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也詳噦

亡陽　傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之　太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之　發汗多若重發汗亡其陽譫語脈短者死脈自和者不死[illegible]譫語者脈短[illegible]不可復治脈自和為正氣未衰猶可生也　脈陽微而汗出少者為自和也汗出多者為太過陽脈實因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕于裏亡津液大便因鞕也　少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之脈微為亡陽表虛不可發汗脈弱濇為亡血裏虛不可下宜桂枝[illegible]四逆湯

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利或用桂枝加乾薑湯四逆湯

盜汗　盜汗者謂睡而汗出也方其睡熟湊湊然出覺則止而不復出矣睡則胃氣行裏表中陽氣不致故津液得泄覺則氣行于表而汗止矣　雜病盜汗責其陰虛傷寒盜汗由邪氣在半表半裏使然也若邪氣在表則又謂之自汗矣經曰微盜汗出反惡寒者表未解也又陽明當作裏實而脈浮者云必盜汗是猶有表邪也又三陽合病目合則汗是知盜汗邪在表裏之間而悉屬和解明矣非若自汗有表裏虛實之別也　太陽病脈浮動數頭痛發熱微盜汗出反惡寒

者表未解也[illegible] 陽明病脈浮而緊必潮熱發作有
時但浮者必盜汗出[illegible]
三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗[illegible]
[illegible]
頭汗頭乃諸陽之會熱蒸于陽故但頭汗出也三陰無
頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

而身無汗者熱不得越而上達也如瘀熱在裏身必發
黃及熱入血室與其虛煩或陽明被火及水結胸數者
皆但頭汗出俱是熱不得越故或吐或下以除其熱也
且邪但在表則無頭汗之證必也寒濕相搏與邪在半
表半裏乃有頭汗也如傷寒五六日已發汗而復下之
胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱
心煩及傷寒五六日頭汗微惡寒手足冷心下滿口不
欲食大便鞕脈細者此皆邪在表裏兩間令頭汗出也
濕家但頭汗出欲得被覆向火者寒濕相搏故頭汗也
此皆不得謂之逆然小便不利而成關格若頭汗者陽

脫也經云關格不通不得尿頭無汗者生有汗者死又
濕家下後頭額汗出而微喘者亦陽脫也經云濕家下
之額上汗出小便不利者死下利不止者亦死二者乃
頭汗之逆 [太陽傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱
大柴胡湯但結胸無大熱者此水結胸但頭微汗者大
陷胸湯 傷寒五六日已汗復下胸脇滿微結小便不
利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也
柴胡桂枝乾薑湯 太陽病中風以火劫發汗邪風被
火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛
則欲衄陰盛則小便難陰陽俱虛竭則身體枯燥但頭

汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫
語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治
[illegible]

太陽病脈浮動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲陽氣內陷心中因鞕則爲結胸若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃[illegible]

傷寒頭汗　卷之三

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿此爲瘀熱在裏身必發黃茵蔯湯主之或用茵蔯五苓散　三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯

陽明病被火額上微汗出小便不利必發黃[illegible]

陽明病下之其外有熱手足溫者不結胸心中懊憹饑不能食但頭汗出梔子豉湯　陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈濈然汗出而愈[illegible]

迫血下行使下血譫語陽明病法多汗以奪血故但頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除陽明之邪熱散邪除則榮衛得通津液得復濈然汗出而解

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也頭汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯若不了了者得屎而解[illegible]

傷寒頭汗　卷之三　三十

[illegible]知非少陰也與小柴胡湯以除半表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者爲裏熱未除與湯取其微利則愈故云得屎而解

孫　凡水結胸脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活　病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五藏乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂重虛

海　頭汗出劑頸而還血證也額上偏多者屬心部爲血證也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

手足汗　胃主四肢爲津液之主故病則手足汗出也手足汗出爲熱聚于胃是津液之傍達也經曰手足濈然

汗出大便已鞕又曰手足漐漐汗出大便難而譫語二者俱宜下之又陽明中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作痼瘕不下為宜二者俱手足汗出一則大便初鞕後溏胃中冷水穀不別故不可下一則大便難譫語為陽明證具故宜下也　二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語下之則愈大承氣湯　陽明病脉遲雖汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然而汗出此大便已鞕也大承氣湯主之[illegible]　陽明病若中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作痼瘕必大便初鞕

後溏以胃中冷水穀不別故也（厚朴生薑甘草半夏人參湯　吳茱萸湯　中湯）

無汗有數種寒邪在表而無汗者　邪氣行於裏而無汗者　水飲內蓄而無汗者　陽虛無汗者　經謂太陽病無汗而喘及脉浮緊無汗發熱及不出汗而煩躁陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥若頭痛及鼻乾不得汗脉浮無汗而喘與其剛痓無汗是數者皆寒邪在表而無汗者也經謂陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃及傷寒發熱無汗渴欲飲水無表證者白虎加人參湯與夫三陰為病不得有汗（惟少陰亡陽一證有得汗是[illegible]少陰者也）是數者皆邪行于裏而無汗者也其水飲內蓄無汗者經謂服桂枝湯或下之仍頭痛項強翕翕發熱無汗心滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮是也其陽虛無汗者經謂脉浮而遲遲為無陽不能作汗其身必痒是也　太陽發熱惡寒身疼無汗而喘麻黃湯證　發熱惡寒身疼不汗出而煩躁大青龍湯證　服桂枝或下之仍頭項強痛發熱無汗心下微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯證　項背強几几無汗惡風葛根湯證　陽明脉浮無汗而喘麻黃湯證[illegible]　傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯　陽明病法

多汗反無汗身如蟲行皮中狀者久虛故也（胃為津液之主病人久虛津液不能為汗胃主肌肉實則為痛虛則為痒宜用黃芪建中湯得津液和而陽明證除以小柴胡湯仍解之）　陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛　陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃（茵陳湯　陽明病無汗而小便不利[illegible]熱不得越心中懊憹者熱氣鬱蒸欲發于外而為黃也[illegible]茵陳[illegible]）　少陰病但厥無汗強發之必動其血或從口鼻或從目出名下厥上竭為難治（少陰但厥無汗若強發之是迫其經絡熱乘經虛迫血妄行或從虛而出或從口鼻或從目出而厥為下厥血亡于上為上竭陽氣[illegible]邪甚正虛故為難治也）

不得汗太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必清血名為火邪[illegible]

太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈脈微惡寒者此陰陽俱虛不可更汗吐下也面色反有熱色者以未得小汗出身必痒宜桂麻各半湯　太陽病二日反燥凡熨其背而大汗出大熱入胃胃中水竭躁煩必發讝語十餘日振慄自下利者為欲解從腰已下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞕

小便當數反不數及多大便已頭卓然痛足心必熱穀氣下流故也或云汗多先服桂枝湯後用調胃承氣湯穀氣下流小和之小承氣湯

陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身面目悉黃小便難有潮熱時時噦者柴胡湯但脈浮無餘證者麻黃湯　或當汗而汗之服湯至三劑而不得汗者死病也　或熱病脈躁盛而不得汗者黃帝謂陽脈之極也死此二者為真病不治　然有當和解之證汗之而不得汗者和解之力到汗自出而解矣慎莫錯會作死證也

潮熱

潮熱者若潮汛之來不失其時一日一發按時而發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱屬陽明陽明旺于未申必於日晡時發乃為潮熱

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹硬滿而痛不可近者大陷胸湯主之因重發汗而復下之則內外重亡津液而熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃心下至少腹硬痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱盛也宜陷胸湯以下其邪○愚按太陽病已重發表則虛矣而復下之裏又虛矣不大便五六日可見表之耗矣若前章之未曾發汗而但下之傷于早今雖有硬痛而可以徑攻之乎若日潮熱于申酉屬陽明胃承氣證既又曰小有潮熱者可疑待之辭無此法以緩取之乎○潮熱本屬陽明也太陽潮熱一證耳雖病太陽潮熱固在巳午更此一小字則知邪太陽為多陽明為少

陽明病潮熱大便微鞕可與大承氣湯不鞕者不與之若不大便六七日恐有燥糞欲知之可少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥糞乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與之則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也　陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已

鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下　陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞕爾宜大承氣湯下之譫語潮熱當消穀引食今反不能食者胃中有燥屎而胃中實也若能食者胃中虛熱[illegible]

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語者下之則愈宜大承氣湯成本太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是無表證但發潮熱是熱并陽明一身汗出為熱越今手足漐漐汗出是熱聚于胃也必大便難而譫語經曰手足漐然而汗出者必大便已鞕也與大承氣湯以下胃中實熱

陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之與湯一升腹中轉失氣者更服一升不轉失氣勿更與之明日不大便脈反微濇者裏虛也為難治不可更與承氣湯也成陽明病譫語發潮熱若脈沉實者內實者也則可下若脈滑疾為裏熱未實未可下先與小承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小承氣湯一升以除之若不轉失氣者是無燥屎不可更與小承氣湯至明日邪氣傳時脈得沉實緊牢之類是裏實也反得微濇者裏氣大虛也若大便利後脈微濇者止為裏虛而猶可此不曾大便脈反微濇是正氣內衰為邪氣所勝也故曰難治

大承氣湯方 海藏云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃治實必痞滿燥實四證全者方可用之

大黃肆兩酒洗　厚朴半斤炙去皮　枳實伍枚炙

芒硝柒錢半

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微煎一二沸分溫再服得下餘勿服

成承順也傷寒邪入胃者謂之入府府之為言聚也胃為水穀之海榮衛之原水穀會聚於胃變化為榮衛邪氣入胃胃氣鬱滯糟粕秘結壅而為實是正氣不得舒順也本草云通可去滯泄可去閉塞而不利閉而不通以湯蕩滌使塞者利而閉者通正氣得以舒順故曰承氣也王冰曰宜下必以苦宜補必以酸潰堅破結苦寒為主是以枳實為君內經曰燥淫於

內治以苦溫泄滿除燥苦溫為輔是以厚朴為臣內經曰熱淫于內治以鹹寒人傷于寒則為病熱熱氣聚于胃則謂之實鹹寒之物以消實熱故以芒硝鹹寒為佐內經曰燥淫所勝以苦下之熱氣內勝則津液消而腸胃燥苦寒之物以蕩滌其燥熱故以大黃為使是以大黃有將軍之號也承氣湯下藥也用之尤宜審如大滿大實有燥屎乃可投也如非大滿則生寒證而結胸痞氣之屬由是而生矣

小承氣湯方 海藏云大黃治實厚朴去痞必痞實全者可用

大黃肆兩　厚朴貳兩炙去皮　枳實參枚大者炙

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿再服[illegible]

吴或問承氣湯仲景有大小調胃之名何也然傷寒邪熱傳變入裏謂之入府府者聚也蓋邪熱與糟粕蘊而為實也實則潮熱譫語手心濈濈汗出者此燥屎所為也如人壯大熱大實者宜大承氣湯下之小熱小實者與小承氣湯下之又熱結不堅滿者故減去厚朴枳實加甘草而和緩之故曰調胃承氣也若病大而以小承氣攻之則邪氣不伏病小而以大承氣攻之則過傷正氣且不及還可再攻過則不能復救可不謹哉仲景曰凡欲行大承氣先與小承氣一鍾服之腹中轉失氣乃有燥屎也可以大承氣攻之若不轉失氣慎不可攻攻之則腹脹不能食而難治又曰服承氣湯得利慎勿再服此諄諄告戒也凡用攻法必須妙筭料量合宜則應手而効若不料量孟浪攻之必且殺人

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死但發熱譫語者大承氣湯主之一服利止後服詳見衣

陽明病發潮熱大便溏小便自利胸脇滿不去者小柴胡湯主之[illegible]

陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜卧身黄小便難時時噦而潮熱者小柴胡加茯苓主之　傷寒十三日不解胷脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

柴胡加芒硝湯方

柴胡壹兩　黄芩　人參　甘草炙

生薑各伍錢　半夏湯泡　太棗叁枚　芒硝壹兩

每服伍錢水一盞半煎至八分去滓納芒硝更微沸溫服

陽明病脉浮而緊必潮熱發作有時但浮者必盜汗出[illegible]

活人書云陽明潮熱脉浮而緊者發作有時但脉浮者必盜汗黄芩湯主之方見下利

譫語

成譫者謂呢喃而語也又作讝謂妄有所見而言也斯皆胃中熱盛上乘於心心為熱冒則神識昏亂而語言謬妄也輕者睡中呢喃重者不睡亦譫語或謂譫語獨語狂語及語言不休與言亂者由其熱之有輕重也

譫語之由又自不同有火劫有汗出有下利有下血有燥屎在胃有三陽合病有過經有亡陽等譫語者俱已條具于後茲不及贅譫如此者脈短則死脈自和則愈又身微熱脈浮大者生逆冷脈沉不過一日死或氣上逆而喘滿或氣下奪而自利皆為逆也

陽明胃實潮熱宜下 陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一盞腹中轉失氣者更服一盞若不轉失氣勿更與之明日不大便脈反微澀者裏虛也為難治不可更與承氣湯 陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚若能食者但鞕爾宜大承氣湯下之 二陽併病太陽病罷但發熱手足漐漐汗出大便難而譫語者下之則愈宜大承氣湯

陽明病其人多汗以津液出胃中燥大便必鞕鞕則譫語小承氣湯主之若一服譫語止勿更服

胃實汗多宜下 汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故下之則愈宜大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲

傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

火後形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脈浮解之當汗出愈 太陽病火劫汗

後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘或不大便久則譫語見論頭汗 太陽病二日反躁乃熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此為欲解 少陰病欬而下利譫語小便難者被火氣劫汗故也 吐下汗溫鍼後譫語柴胡證罷者此為壞病知犯何逆以法治之詳見壞證

汗後傷寒脈浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯方論見脚 三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足

逆冷若自汗出者白虎湯主之（見合病重） 傷寒四五日脈
沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難
表虛裏實久則譫語大承氣湯（見不大便） 傷寒脈弦頭痛
發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃
和則愈胃不和則煩而悸（見少陽病） 發汗多亡陽譫語者
不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈發
汗多又重發汗者亡其陽譫語脈短者死脈自和者不
死 譫逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩者死
下後傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身
盡痛不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯（見煩驚）

熱入血室陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗
出者刺期門隨其實瀉之濈然汗出則愈（腹滿譫語脈浮緊者亦刺期門 太陽少陽併病發汗則譫語脈弦五六日譫語不止者宜刺期門） 婦人中風發熱
惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸滿如
結胸狀者刺期門若晝則明了暮則譫語者無犯胃氣
及上二焦必自愈活人以小柴胡湯主之（論見婦人傷寒）
傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之
若小便利者大便當鞕而反下利脈調和者知醫以丸
藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此
為內實也調胃承氣湯主之（下後傷寒十三日再傳經盡謂之過經譫語者陽明證）

熱也當以湯承氣湯下之若小便利者津液偏滲大便
當鞕反下利者知醫以丸藥下之也下利脈微而厥者
虛寒也今脈調和則非虛寒由腸虛胃熱協熱而利也
與調胃承氣湯以下胃熱○經文內實之實當作熱蛀
偏滲偏當作漏○此段有五反一對熱與厥反湯與丸
反便鞕與下利反脈微與脈和反藥下與自利反小便
與大便鞕為一對
尊旨宜細詳之

右下利譫語其曰脈調和而手足和小便利者陽也
故用承氣下之其脈當微厥及少陰但欲寐被火氣
劫汗譫語小便難者陰也故當用補劑和之

（許）有人病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或
者見下利便以譫語為陰虛證予曰此亦小承氣證

衆駭曰下利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景
之法也仲景云下利而譫語者有燥糞也屬小承氣
湯而得解予嘗讀素問云微者逆之甚者從之逆者
正治從者反治從多從少視其事也帝曰何謂反治
岐伯曰塞因塞用通因通用王冰註云大熱內結注
瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下之結散利止則
通因通用也正合於此又何疑焉

（活）大便秘小便赤手足溫脈洪數者必譫語也調胃
承氣湯 譫語不惡寒反惡熱白虎湯 已得汗身
和譫語者柴胡桂枝湯 火迫而致譫語亦白虎湯

〔海〕治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起臥無度或煩而不得眠並宜白虎湯加山梔一錢

〔王〕治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癲癇言語不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入罐內泥封固武火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋半日許研如麵新汲水調下三錢或未退再服愈（人中黃即糞也）

〔吳〕治傷寒熱甚心煩有痰神昏譫語者以竹瀝一盞生天花粉汁一盞服之或加好金子三五錢同煎妙

按此諸方內熱不禁下者可用

〔補〕虛素問云譫語者氣虛獨言也（婁全善云余用參芪歸朮等劑治譫語得愈者百十數豈可不分虛實一槩用黃連解毒大小承氣等湯以治之乎）難經云脫陽者見鬼（此言脫陽也譫語亦此義）

〔海〕黃芪湯治傷寒或時悲哭或時嬉笑或時太息或語言錯亂失次世疑作譫語狂言者非也神不守室耳兩手脈浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也甚者用調中丸或理中丸（方見前補養條）

〔丹〕浦江鄭兄年二十歲九月間發熱頭痛妄言見鬼醫與小柴胡湯數貼熱愈甚予視之形肥面亦帶白却喜筋骨稍露診其脈弦大而數實脈本不實涼藥所致此因勞倦成病與溫補藥自安遂以參朮為君苓芍為臣黃芪為佐附子一片為使與二貼而證不減或曰脈既數大狂熱而又大渴用附子誤矣予曰此虛證而誤投寒涼之藥人肥而脈左大於右事急矣非加附子參朮焉能有急効再與一貼乃去附子作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後又補養兩月氣體方始平復　一人五月內患譫語大發熱肢體不能舉喜冷飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃煎如膏却用涼水調與之三四服後病者昏睡如死狀但顏色不改氣息如常至次早方醒諸證悉退而安　盧兄汗後再發熱妄言呂仲修汗後熱不退亦妄言陶明節熱退後不識人言語謬妄皆用參芪朮歸等補劑而愈信哉譫語屬虛者十居八九

〔陰證〕手足冷脈細微而譫語用四逆湯活人用白通湯海藏用黃芪加乾薑湯

候輔之脈極沉細外熱內寒肩背胸脇斑出十數點語言狂亂或曰發斑譫語非熱乎予曰非也陽為陰逼上入于肺傳之皮毛故斑出神不守舍故錯語如狂非譫語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如冰與

薑附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發脉又沉遲三四日不大便與理中丸三日內約半斤其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂卽陰虛也

【診】直視譫語喘滿者死下利者亦死　譫語妄言身微熱脉浮大手足温者生逆冷脉沉細者不過一日死矣

【鄭聲】鄭字書曰鄭重頻煩也又曰殷懃也鄭聲謂止將一事頻煩殷勤言之蓋神氣不足不能更易而但守一聲與譫語之錯出不倫者異矣此虛實之分也成氏以爲鄭衛之聲迂而鑿矣治法於前補虛條求之

【吳】大抵鄭聲乃因內虛正氣將脫而言皆不足之貌如手足竝冷脉息沉細口鼻氣息短少所說言語輕微無力氣少難以應息者皆正氣將脫也或吃逆不止神昏氣促不知人事者死如氣息不促手足頗温其脉沉細而微者急以附子湯倍人參主之或以接氣丹黑錫丹兼進一二服以助其眞氣也或濃煎人參徐徐與之或未可用附子者以三白湯倍人參主之

【戴】譫語屬陽鄭聲屬陰經云實則讝語虛則鄭聲讝語者顚倒錯亂言出無倫常對空獨語如見鬼狀鄭聲者鄭重頻煩語雖謬而諄諄不已老年人遇事則誶語不休以陽氣虛故也此讝語鄭聲虛實之所以不同也二者本不難辨但陽盛裏實與陰盛隔陽皆能錯語須以他證別之大便祕小便赤身熱煩渴而妄言者乃裏實之讝語也小便如常大便洞下或發躁或反發熱而妄言者乃陰隔陽之讝語也裏實宜下調胃承氣湯熱躁甚而妄言不休大渴喜飲宜理中湯陰隔陽宜溫膽湯四逆湯附子理中湯　又有不係正陽明似困非困間有一二聲譫語者當隨證施治　外有已得汗身和而言妄者此是汗出後

津液不和愼不可下乃非陽非陰者宜小柴胡湯和建中湯各半貼和榮衛通津液若陽傳入陰自利手足厥逆語或錯亂此雖已自利其中必有燥屎猶當下之陰中之陽宜調胃承氣湯瘀血在裏大便黑小便利小腹痛其人如狂譫語者桃核承氣湯婦人傷寒發熱經水適斷此熱入血室其血必結亦能譫語宜小柴胡湯病後血氣未復精神未全多於夢寐中不覺失聲如魘此不係讝語鄭聲宜溫膽湯去竹茹入人參半錢或用六君子湯

狂亂

經曰邪入于陽則狂又曰重陽則狂諸經之狂爲陽盛也傷寒熱毒在胃併於心至於發狂爲邪熱極矣狂之發作少卧不饑妄語笑妄起行棄衣而走登高而歌甚則踰垣上屋皆獨陽亢極使之非吐下不能已亦有當汗不汗瘀熱在裏下焦蓄血而如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或熏熨迫汗灼艾燒針令人煩躁臥起不安則謂之火邪驚狂凡是數者各有條例其或狂言目反直視爲腎絶汗出輒復熱狂言不能食皆死證也非藥石所能及矣

陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈 [illegible]

以陽爲主水不勝穀乃陰不勝陽病漸向安故陰氣與汗共併而散附見脉緊緊者陰寒脉也此則變熱入府何以脉緊蓋由陰氣與汗共併然也且緊亦與長類長爲陽明本脉成氏所註汗出陽氣[illegible]則陰陽不平矣下文乃云陰陽氣平兩無偏勝不知何耶　太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之 [illegible]　太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯

張氏云上二條證俱係下焦蓄血中間雖有輕重表

審緣何而致此也此皆發汗未得其宜或當汗不汗或汗遲或脉盛汗微或覆蓋不周而不汗其太陽之邪無從而出故隨經入府結于膀胱今小腹鞕滿者小便不利者血不蓄若小便利者乃蓄血證也血或不蓄爲熱迫之血則自下血下則熱隨血出而愈若蓄血而不下其外不解者尚未可攻當先解外外已解但少腹急結者乃用桃仁承氣湯攻之此如狂者之所處也其發狂者則不然表證雖在脉已沉微邪氣傳裏其可已乎下之則愈故以抵當湯主之

太陽病身黄脉沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小

便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

傷寒脈浮以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝湯去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方見 汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰痛與禹餘糧丸方見

〇附

陽毒活人云凡病人煩躁狂走妄言叫罵面赤咽痛身如錦紋或身斑如錦或下利赤黃此陽毒也表者陽毒升麻湯黑奴丸裏者大黃散楊仁齋用葶藶苦酒湯梔子仁湯三黃湯大黃散升麻葛根湯加大黃狂走者水調瓜蒂末吐痰

本治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連　寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連　大黃　防風

遠志　茯神各半兩

右為細末每服一兩水煎服

海黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭譫言妄語方見發熱

陳志仁傷寒狂妄每欲狂走四五人扶捉不定脈虛數用柴胡湯反劇以參芪歸朮甘草陳皮煎湯一服狂定

再服安睡

脫陽者見鬼脫陰者發狂宜峻補其陰天地煎之類是也

陰證乃是病發于少陰不當正發汗醫見其惡寒遂強發之汗因漏不止其人亡陽故狂大與陰極發躁同當用陰躁之藥加以斂汗之劑玉屏風散人參附子一錢乃外以溫粉傳之或冷汗自出手足逆冷其人狂不止者宜四逆湯冷進

發狂而脈表雖或熱以手按之則冷透手或有背胸膈有斑十數點脈極沉細用乾薑附子湯以人參冷進

循衣摸牀

循衣摸牀危惡之候也有二證其一由太陽中風以火劫汗因成壞病捻衣摸牀小便利者生不利者死其一由陽明裏熱之極循衣摸牀脈弦者生濇者死

太陽中風以火發汗邪風被火雨陽相熏其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難但頭汗出口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治[illegible]

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服成若吐若下皆傷胃氣不大便五六日上至十餘日者亡津液胃氣虛邪熱內結也陽明王于申酉戌日晡所發潮熱者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以為熱氣有餘若劇者是熱氣太甚也熱大甚于內昏冒正氣使不識人至於循衣摸牀惕而不安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽絕者死熱劇者為陽勝脈弦為陰有餘濇為陰不足陽熱雖劇脈弦知陰未絕而猶可生脈濇則絕陰故不可治其邪熱微而未至於劇者但發熱譫語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中病則止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則止後服已過此段當分作三截看自傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀止為上一截是將辨熱譫語不惡寒不大便對為死證下文又分作一截以辨劇者微者之殊微者但發熱譫語但字為義以發熱譫語之外別無他證其用承氣湯曰一服利止後服見其熱輕猶恐下之太過也至于劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死此熱極證危不可不決其死生以附之以微者尚可如此脈弦者生濇者死此為熱已極若脈弦為陰未絕猶可下之以復其陰若脈濇為陰已絕不可藥而必死矣今活人書但言劇者而去其微者二字混兩證通作一證總曰用承氣湯又將脈弦者生濇者死本劇者語移而著于微者服藥之後豈有但發熱譫語無別惡候遽然脈濇而致于死耶仲景論中辨別有潮熱譫語脈濇難治一證乃是服承氣湯後未曾得大便並毒不泄脈反當濇為正衰邪盛故難治此論中有微者服湯得利後則邪熱因泄而解矣尚何生死之議耶又云弦者陽也濇者陰也陽病見陰脈者死在仲景上中浸壽若當全不言乎真去手

許有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得之者十中九死仲景雖有證而無法但云脈弦者生濇者死已經吐下難以下藥謾且救之若大便得通而脈弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半月愈或問曰下之而脈弦者生此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋衣領及捻物者肝熱也此證在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許學士作循衣撮空是肝熱[illegible]此論誠當然莫若以為肺熱之邪其[illegible]經云肺邪入心為譫語

○附

萬嘗治循衣摸床數人皆用大補氣虛之劑惟一人兼瞤振脉代遂於補劑中略加桂二分亦振止脉和而愈

渴〔[illegible]〕

成傷寒邪傳裏則渴邪在表則不渴夫三陽雖或有渴不如三陰之甚也故太陰腹滿嗌乾少陰口燥舌乾而渴厥陰則消渴消渴者飲水多而小便少謂其熱能消水也蓋初傳則熱微而渴微傳深則熱甚而渴甚也凡渴與水勿令極意三陽微渴者五苓散大渴者白虎湯三陰熱甚而渴者須下之其或渴微而強多飲之則成悸動支結喘咳飼噎乾嘔腫滿下利小便不利皆由此也

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者

少少與之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散（渴煩渴用白虎湯宜也其用五苓散滲津液何哉曰白虎乃表證已解邪傳裏而煩渴者用之今脉尚浮身有微熱而渴乃表邪未全解故用桂枝之辛和肌表白朮茯苓之甘淡以潤虛燥也○按此蓋亦未全太陽經也膀胱腑也膀胱者溺之室也五苓散者利溺藥也膀胱者津液之府故東垣以渴為膀胱經本病然則治渴者當瀉膀胱之熱瀉膀胱之熱者利小便而已矣） 發汗已脉浮數煩渴者五苓散 本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散 中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散

五苓散方

豬苓去皮拾捌銖 澤瀉壹兩陸銖半 茯苓拾捌銖

桂半兩去皮 白术拾捌銖

右五味爲末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

[illegible]

服桂枝湯大汗後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯

傷寒論 卷之三 王注

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病柴胡白虎桂枝去桂加人參湯 傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒白虎加人參湯 傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之 渴欲飲水無表證者太陽證罷轉屬陽明也下條意亦同皆太陽轉屬陽明故渴也 傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之 王注云若純在表則惡風無時今表裏無熱故時時惡風也

白虎加人參湯 治渴而脉洪小便利者

石膏碎肆兩 知母壹兩半 甘草壹兩

粳米五合 人參叁錢

右㕮咀每服壹兩水煎溫服

許有人初病嘔吐俄爲醫者下之已七八日而內外發熱予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在胃脘而脉至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐若下後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之

傷寒論 卷之三 王注

國朝林億校正謂張仲景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒中渴表裏發熱故前後二證或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之一種脉浮無汗其表不解全是麻黃與葛根證安可行白虎也林億見所稱表裏不同便謂之差是亦不思之過也

張用藥有遲速之弊故設法以關防法有關防不盡者則著方以拯治也假如上二條前條乃仲景設法以關防也後條及傷寒病若吐若下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴口舌乾燥而煩

欲水數升者以白虎加人參湯主之此二條則著方以救治也夫白虎湯專治大煩大渴古人設法之意惟恐表證未罷而輒用之治有太速之辭若背微惡寒及時時惡風二證其中煩渴已甚非白虎不能遏也必候表邪俱盡未免有太遲之悞也此乃法之關防不盡者故著方以救治也苟不著方必然違法此方法之妙所以不可偏廢也

吳或問白虎湯仲景以表不解者不可與又時時惡風背上惡寒者此有表也又以白虎主之何也蓋石膏辛寒解足陽明經本熱蒸蒸發熱潮熱表裏俱熱

舌燥煩渴之聖藥也且時時者有時或惡風而不常也背上惡者但覺微惡而不甚也所有盛熱燥渴而用則無疑矣若夫表證惡寒常在背上惡寒而不燥渴者切不可用也又太陽經發熱而渴無汗者不可與之但汗後脈洪大而渴者則可與也如陰傷寒面赤煩躁身熱與其胃虛惡心大便不實脈弱食少無大熱者切不可用也如悞用之則傾危可立而待矣

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯　傷寒發熱惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥復利其小便故也 [illegible]　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之　若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

少陽傷寒中風往來寒熱胸脇滿默默不欲飲食心煩喜嘔或渴或欬者小柴胡湯若渴者去半夏加人參栝蔞根　傷寒四五日身熱惡風項強脇下滿手足溫而

渴者小柴胡湯　得病六七日脈遲浮弱惡風手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡不中與也 或云下重渴欲飲水嘔者五苓加茵蔯湯

少陰渴而下利屬少陰其病但欲寐小便白者四逆湯無咳嘔不得眠小便不白者猪苓湯無自利純青色水者大承氣湯有熱者白頭翁湯 方論見下利

厥陰消渴氣上衝心心疼飢不欲食食則吐蛔若下之則利不止若欲飲水少少與之愈 邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太陰則腹滿而嗌乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也至厥陰而消渴者熱甚能消水故也飲水

多[illegible]

隨病治例渴而頭汗小便不利兼脇滿往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯兼發黃者茵蔯蒿湯[illegible]

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘小青龍湯　又心下有水氣咳而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯[illegible]

夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者為中暑白虎加人參湯及酒黃連主之[方見中暑惡寒身熱者為汲表也足冷者不可表]

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門

表解不惡寒而渴者宜白虎湯

渴而脇滿及往來寒熱其證未經汗者小柴胡去半夏加人參瓜蔞湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯[詳見脇滿并往來寒熱]

渴而心下鞕痛日晡潮熱不大便者為結胸宜大陷胸湯若但鞕不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不利者宜五苓散[詳見結胸痞二門]

病在陽明應汗之反以冷水潠之灌之其熱益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與五苓湯[illegible]

文蛤散方

文蛤[illegible]

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胸中有寒[illegible]

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥陰病氣起衝心心疼吐蚘者少少與之愈[illegible]

凡得時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之何者以腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之忽然大汗出是為自愈也[活人云凡病非大渴不可飲水若小渴咽乾者少少呷潤之令其胃中和乃佳]

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者亦強與之飲因成其禍不可復救[活人云強飲水致飲停心下滿結喘者當以五苓散或[illegible]]

下利脈弱脈數而渴者自愈[論見下利]

渴而發熱其脈不弦緊而浮弱者汗出愈[論見[illegible]]

〔婁〕活人云切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯陽明證汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不可與白虎耶太陽證得汗後脉洪大而渴者方可與之也陽明渴終不可與五苓散耶陽明證小便不利汗少脉浮而渴者方可與之也

〔趙〕活人切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯陽明證汗多而渴者不可與五苓散愚詳仲景論治渴藥有不可與之戒有二傷寒脉浮發熱無汗渴欲飲水無表證者白虎加人參湯表不解不可與活人不云表不解但云無汗不可與則誤矣經云陽明汗多而渴不可與猪苓湯活人改作五苓散蓋猪苓專滲泄五苓兼汗利安得而改之經既云汗多而渴者不可與猪苓湯而太陽傷寒汗出而渴復用五苓散者蓋責雖同汗之多寡則異太陽屬表未至汗多胃躁故用五苓滲熱和表非若陽明屬裏汗多而胃躁也經云陽明發熱汗多急下之均是陽明汗多前證戒利小便此證不戒利大便何也蓋渴者邪氣散漫在經未收歛入胃作實此證不渴則內已作實外又發熱恐熱內竭津液故急下之且猪苓五苓又有可疑者太陽病脉浮小便不利微熱消渴者五苓散陽

明脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯脉證皆同何故用藥之不同耶然太陽邪在表發汗不解故用五苓和表行津液陽明邪已入裏熱客下焦故用猪苓滲瀉其熱噫白虎猪苓五苓等藥若能證察于機微治明于權變則可與不可與庶得仲景之妙外有自利而渴條下註云傷寒熱入于藏流于少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲註用猪苓湯白頭翁湯又後下利問中重出自利而渴條下却云腎虛故引水自救通用白通四逆猪苓等湯一問以渴為熱一問以渴為虛氷炭不侔何憑分别又且分隸兩門設使後人臨病檢閱前後兩不相聞疑誤豈小今詳定少陰病欬而下利嘔渴心煩不得眠及厥陰證下利欲飲水是皆傳經之邪熱脉必沉細數仲景故以滑石黄連等清利之其或少陰自利而渴欲吐不吐心煩但欲寐是直入本經之陰邪也脉必沉微仲景故以附子乾薑溫之本問何不如此明示脉證合為一門而明辨之庶一見而兩得為清之溫之隨其攸利又何疑誤之有

〔吳〕凡渴當分六經而治太陽經標熱在表則不渴若熱傳入膀胱之本則煩渴脉浮數小便不利也五苓

散切不可與白虎湯凡陽明病脉浮標熱無汗而渴者葛根解肌湯或六神通解散倍葛根以汗解之若陽明熱傳于胃中本熱惡熱濈濈汗出而渴脉浮洪數者人參白虎湯五苓不中與也若陽明本熱或蒸蒸而熱潮熱煩渴舌燥口乾飲水大便實者大柴胡湯或調胃承氣湯下之若內未實尚未可下宜小柴胡增損用之少陽脉弦數口苦咽乾發熱而渴者小柴胡去半夏加瓜蔞根餘見本條太陰自利則不渴惟少陰有口苦飲水小便色白者此下有寒也脉沉者附子湯若身寒厥逆脉滑而口渴者此裏有熱也人參白虎湯凡陰證煩躁口渴不能用水脉沉足冷者宜四逆湯冷飲之凡傷寒時氣等證欲飲水者爲欲愈蓋得水則能和其胃氣汗出而解不與水則乾燥無由而作汗遂致悶亂而死也凡與水須察病人勇怯邪熱輕重多少與之寧從不及不可太過恐水多不能滲化停畜爲害多矣其水須用新汲井中者爲良凡熱病熱甚大便實者以玄明粉一二錢加入水中飲之最妙凡中暑煩渴者加辰砂天水散調水中飲之尤良如虛人煩渴不飲水以燈心煎湯浸水中與之凡口渴細茶湯白梅湯菉豆湯皆可飲香水梨雪梨嫩藕西瓜皆可食凡用冰須以京水洗去鹽味方可

戴凡渴問其所飲欲冷欲熱欲多欲少若飲多而欲冷者陽渴也更須審其有何證在經也其太陽證小便不利而渴者五苓散其陽明證大便不利而渴者宜於前本經求之已利猶渴宜白虎湯其少陽證寒熱往來而渴者小柴胡湯去半夏加括蔞根如其數陰亦有自利而渴各已見本經但陰有渴古人多用冷劑以其皆挾陽氣耳經雖陰而病則陽也然亦有下清穀不係熱利純是陰證而反見渴者此是陰在下陽隔於上無因洩瀉津液既去枯燥而渴其人雖引飲所飲自少而常喜溫不可投冷劑宜理中湯或四逆湯加人參一錢渴甚連理湯　有陽證不渴陰證反渴者陽明不甚渴太陰乃大渴不可不知治渴一也有堅腎水而渴止者有利小便而渴愈者堅腎水則用天花粉之屬利小便則用茯苓猪苓之類蓋太陰以利小便爲先陽明以利小便爲戒少陽以膽經半表半裏未可下之其人或大渴不止當以小柴胡湯加天花粉之屬堅其腎水腎水既堅自還滲入大腸大便微通熱去而渴解若病在太陽太陽在膀

胱經非利小便則熱無從去渴何由愈外有非太陽證煩躁發渴此乃陰盛隔陽不當潤其渴惟當治其陰

（附）

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止之也恐復損胃氣愈不能食白朮茯苓是也

海泰二母病太陰證三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊無表裏病證中夫熱發渴引飲皆曰陽證欲飲之水予反與薑附等藥緊脈反沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸與百丸接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也又以前丸接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小便始通下瘀血一盆如豬肝然用胃風湯加桂附三服血止其寒甚如此亦世所未見也

少陰證口燥舌乾而渴尺寸脈俱沉沉遲則四逆湯沉疾則大承氣湯　少陰口燥舌乾而渴身表涼脈沉細而虛者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯　治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參　黃芩　柴胡

葛根　山梔　甘草　炙各半兩

右為麤末每服五錢薑棗煎溫服

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之　風溫加渴甚者宜瓜蔞湯　中暑伏熱累治不瘥其人發渴不已酒蒸黃連丸主之

脾熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

嘔 [illegible]

成嘔者聲物兼出也俗謂之哯非也夫哯與噦蓋亦復而音義俱同吐者但吐出其物而無聲故有乾嘔而無乾吐嘔有責為熱者責為寒者至於吐家則悉言虛冷也嘔又有停飲者有胃脘有膿者皆當明辨之嘔而發熱者柴胡湯證具與其嘔不止心下急鬱鬱微煩大柴胡湯主之者是邪熱為嘔也膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之與其乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之是寒邪為嘔也先嘔後渴者此為欲解先渴後嘔者為水停心下此屬飲家是停飲嘔者嘔家有癰膿不須治

膿盡自愈是胃脘有膿而嘔也諸如此者雖有殊別大抵傷寒表邪欲傳裏裏氣上逆則為嘔也是以半表半裏證多云嘔也傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪是知邪氣傳裏者必致嘔也至於乾薑附子湯證云不嘔不渴為裏無熱十棗湯證云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也即此觀之其嘔為裏熱明矣嘔家之為病氣逆者必散之痰飲者必下之千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥是要散其逆氣也金匱要略曰嘔家用半夏以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明證不可攻也謂其氣逆而未收斂為實也其嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者已為難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實并證之逆順為施藥劑治則當矣

太陽病或已發熱未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒麻黃湯　太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈 [illegible]

傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大柴胡　太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也 [illegible]

嘔而發熱者小柴胡湯主之　傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之　太陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根加半夏湯主之[illegible]

葛根半夏湯方

葛根　半夏[illegible]　麻黄　生薑[illegible]

甘草　芍藥　桂枝[illegible]　大棗[illegible]

右㕮咀以水一斗先煎麻黄葛根減二升去白沫納
諸藥煎取三升温服一升覆取微汗

陽明傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也[illegible]　食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也[illegible]　傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之黄芩生薑半夏湯小柴胡湯[illegible]

陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯　陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛[illegible]

少陽嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太陽少陽合病宜黄芩加半夏生薑湯[illegible]　傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯　血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結于脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之[illegible]　渴而飲水嘔者柴胡不中與也[illegible]

太陰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕

少陰少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之　少陰病下利脈微澁嘔而汗出必數更衣反少者當温其上灸之　少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯去附子加生薑

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血黄芩芍藥湯抵當湯　嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯　傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黄連黄芩人參湯傷寒邪自傳表為本自寒下醫反吐下損傷上氣寒氣內為格拒經曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重虛而死是更逆吐下與乾薑黄芩黄連人參湯以通寒格○[illegible]之意以本因寒下醫復吐下因此寒格吐逆若更復吐下治之為逆故用乾薑以温裏黄[illegible]

言苦參反佐以取之人參補正氣也今治人却言胸脇
逆故用此藥何耶蓋然謂逆為胃中虛冷而吐者宜也
又有脈數為胃中虛冷之行也治之云有人脈
數熱客之所熱而不消者以發汗令陽氣
微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛
冷故吐也又以其脈數當消穀引食以發汗陽微之故

蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩此為藏寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘烏梅丸主之

渴先渴却嘔者為水停心下此屬飲家活人云亦茯苓湯主之　先嘔却渴者此為欲解候也金匱道一云後思水者急與之

下利嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無熱者為陰宜猪苓湯眞武湯並見吐利門

煩嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑豉湯若未曾吐汗下後無欲而渴者宜猪苓湯詳見不渴

嘔家有癰膿者不必治膿盡自愈　服桂枝嘔者酒客病

〔戴〕陽明證具雖顯然有可下證者兼之嘔多猶屬上焦未可遽下宜小柴胡湯若太陽不與少陽陽明合病而獨見太陽證或吐瀉者恐病人膈間素有痰飲停飲傷滯且以二陳湯定之候嘔吐定徐進解太陽經藥若先嘔却渴者宜猪苓湯先渴却嘔者宜治膈間之水小半夏茯苓湯渴欲飲水水入即吐吐已復渴名曰水逆由心經受熱而小腸不利也宜五苓散若少陰不渴而吐或乾嘔者理中湯去白朮加生薑嘔而吐涎沫者吳茱萸湯　太陰厥陰間有嘔吐太陰宜理中湯厥陰宜四逆湯並加生薑煎已上陰證乃陰中之陰宜用熱劑陽入陰者能為利而不為嘔嘔屬上而近於外也陽之所入者深故利也　又有陽證病新瘥後見嘔別無所因此餘熱在胃脘也宜竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯　大凡得之太陽而嘔者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人初得病太陽證有嘔吐不住藥投暖劑莫能治之知

太陽已汗解因當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則合少陽其嘔為熱用暖劑非矣　又記有人初病具太陽證而嘔一家少長患狀悉類與養胃湯入服無不立效此時行之氣適然如此是為傷寒雜病又非可以正經傷寒律之也

〔吳〕初得之嘔逆嘔噦清水嘔吐飲食者皆着寒傷胃也如惡寒拘急未發熱而嘔逆或吐食者宜加減藿香正氣散或人參養胃湯若已發熱者十味芎蘇散發散或葛根湯加生薑半夏若自汗者不可發汗宜正氣散去紫蘇以和之凡發熱口苦脈弦數而嘔心

煩而嘔胸脇滿而嘔往來寒熱而嘔日晡發熱而嘔皆屬少陽並小柴胡倍加半夏生薑主之熱少去黃芩口乾加葛根括蔞根心煩加薑汁炒黃連心下痞滿加枳實若潮熱內實不大便嘔不止心下鬱鬱微煩者大柴胡下凡嘔吐胃家有熱脈弦數口苦煩渴胃有寒脈弦遲逆冷不食有水氣先渴後嘔腹滿怔忡有膿血喉中腥氣奔逆上衝不煩治之嘔膿盡自愈此四者不可不辨凡太陰腹滿吐食不下或腹痛嘔吐脈沉者理中湯加半夏陳皮藿香厚朴生薑之類寒甚加附子凡少陰飲食入口卽吐心下溫溫欲

吐復不能吐手足寒脈沉細者四逆湯加半夏生薑橘皮之類凡厥陰嘔吐涎沫逆冷脈沉微者吳茱萸四逆湯加半夏生薑陳皮之類

乾嘔欲吐　太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯　傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯

張或問小青龍與小柴胡證皆有嘔發汗表裏之證大柴彷彿何故二方用藥之不同曰夫傷寒表不解裏熱未甚而渴欲飲水不能多不當與之以腹中熱尚少而不能消水飲停蓄故作諸證然水寒作病非溫熱之劑不能解故用小青龍湯發汗散水原其理初無裏證因水寒以致然也夫小柴胡證係傷寒發熱熱邪傳裏在于半表半裏之間熱氣內攻故生諸證緣二證雖曰表裏俱病其中寒熱不同故用藥有薑桂柴芩之異也

傷寒中風醫反下之其人下利日十數行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非熱結但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯　傷寒一日太陽受之脈

若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脈數急者為傳也宜與麻黃湯表罷小柴胡白虎湯　傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯　太陽中風下利嘔逆表解者可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯　太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯

愚或云乾嘔發熱小柴胡十棗湯皆有之一和解一攻何也盖小柴胡病在半表半裏外有寒熱往來內有乾嘔諸病所以不可攻下宜和解以散表裏之邪夫十棗湯證外無寒熱其人漐漐汗出此表已解也但頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣者邪熱內畜而有伏飲是裏未和也與十棗湯以下熱逐飲已上二證宜

[illegible]食穀
欲吐者屬陽明也吳茱萸湯得湯反劇者屬上焦也小
柴胡湯梔子豉湯黃芩湯[illegible]
[illegible]少陰病飲食入口即吐心中嗢嗢欲吐不能
吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下當吐之
若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯
少陰病下利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁
湯　少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥冷脉微欲絕
身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利

正脉不出者通脉四逆湯　少陰病欲吐不吐心煩但
欲寐五六日自利而渴者屬少陰也　太陰病脉微細
沉但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不
得卧者死　病解後虛羸少氣欲吐者竹葉石膏湯

○附

赤茯苓湯　治傷寒嘔噦心下滿胷膈有停水頭眩心
悸

赤茯苓　人參各壹兩　半夏薑製
橘紅　芎藭　白术各半兩

右㕮咀每服四錢薑五片水煎服

葛根湯　治傷寒乾嘔不止

葛根　人參　麥門冬去心
炙甘草各壹兩　半夏薑製　黃芪各柒錢半
白茯苓　白术各半兩

右㕮咀每服三錢生薑三片棗一枚同煎服

少陽病　口苦咽乾　眩　往來寒熱　胸脇痛

胸滿　胸痛　耳聾

少陽經治法雖悉屬和解然有誤汗譫語屬胃一證宜調胃下之少陽雖無汗解之法然有小柴胡加桂枝者亦温解微汗之意又此經本證胸脅痛耳聾寒熱往來乾嘔或嘔苦水宜小柴胡湯和解之倘不解者却宜大柴胡湯下之若胸脇多痰瓜蒂散吐之斯仲景之微旨也

和解　小柴胡湯　小柴胡加桂湯

吐　瓜蒂散

下　調胃承氣湯　大柴胡湯

少陽之病口苦咽乾目眩也足少陽者膽經也內經曰有病口苦者名曰膽癉甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽為之使少陽之脉起於目銳眥少陽受邪故口苦咽乾目眩　活人云宜小柴胡湯　尺寸俱弦者少陽受病也以其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾李氏少陽篇有胸脇滿而無痛證或云少陽病耳聾目赤胸滿而煩為中風口苦咽乾目眩為傷寒　少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚誤吐氣虛者悸誤下血虛者驚　傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸成氏經曰三部俱弦者少陽受病脉細者邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以脉弦細知邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少陽之邪因傳入胃必發譫語當與調胃承氣湯下之胃和則愈不和則胃為少陽木邪干之故煩而悸○凡頭痛俱為在表惟此頭痛為少陽者何以脉弦細也可汗不可汗宜以此法○此少陽陽明宜重則小承氣輕則大柴胡[illegible]不可下陽明不可下故以小承氣湯少少與之以微利也成氏以調胃承氣主之[illegible]爭矣太陽陽明[illegible]　傷寒三日少陽脉小者欲已也[illegible]　少陽病欲解時從寅至辰上[illegible]之時

海藏表裏中三說假令少陽證頭痛往來寒熱脉浮此三證但有其一即為表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有其一即為裏也如無上下表裏證餘皆虛熱也是病在其中矣

張或謂少陽膽經縈紆盤屈皆多于各經及觀少陽篇中治證至簡又不聞何樂為本經之正法何也夫經絡所據太陽在後以為表陽明在前以為裏少陽在側夾于表裏之間故曰半表半裏治法在表者宜汗在裏者宜下既居兩陽非汗下所宜故治療無正法也經曰少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚一條又云不可發汗似此其汗下吐三法皆少陽所忌其劑不過和解而已所以仲景止以小柴胡湯而為屏至當也然而經絡支別雖多所行非由正道故為病亦不能多矣

口苦咽乾（[illegible]）

或咽乾口燥舌澀俱為熱證但有微甚耳惟太陽中寒桂枝附子湯證由誤汗咽乾作甘草乾薑湯以復其陽者隨其逆治壞病者也非治其本寒也然咽乾之由有由汗下後而得者有不因汗下而得者其間治法或和解或微汗或急下或微下當考兼有之證而施輕重之治然其為熱則一也蓋經謂咽喉乾燥亦不可汗以其多有裏證故也實無寒病善治者尤宜互考渴條乃獲全功

太陽咽喉乾燥者不可發汗（[illegible]） 傷寒脈浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急本桂枝附子湯證反與桂枝湯攻表得之便厥咽乾煩躁吐逆者甘草乾薑湯

傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩者白虎加人參湯 本下之心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散

太陽病重發汗復下之不大便五六日舌上燥渴日晡小有潮熱從心下至小腹硬滿而痛者大陷胸湯

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒誤下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤下之則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒針則不得眠（[illegible]宜小柴胡湯） 陽明病口燥漱水不欲嚥者必衄或用黃芩芍藥湯犀角地黃湯 陽明病汗若下後渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯 脈浮發熱口乾鼻燥能食者必衄或用黃芩湯 陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊或用麻黃小柴胡湯

少陽口苦咽乾目眩宜小柴胡湯

少陰病自利清水色純青心下痛口乾燥者急下之宜大承氣湯 少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之大承氣湯（成傷寒傳經五六日邪傳少陰則口燥舌乾而渴為邪熱深也今少陰病得之二三日邪氣未深入之時便作口燥咽乾者是邪熱已甚腎水乾也急與大承氣湯下之以全腎也[illegible]）

（下之若燥則乾腎水乾燥故也〇張氏云承氣湯陽明當下之證宜用今少陰病亦用何也蓋胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳之入胃其胃土燥則腎水乾以二三日則口燥咽乾是熱之深傳之速也故曰急下之以全腎水夫土實則水清謂水穀不相混故自利清水而口乾燥此胃土實熱所致然也下利色青青肝也乃邪傳腎深腎之經脈從肺出絡心注胸中由是而心下痛故急下以去實熱逐腎邪其六七日腹脹不大便以入府之邪壅甚胃土勝則腎涸故急下以逐胃熱滋腎水蓋陽明與少陰皆有急下之條然而證雖不同其入府之理則一是以皆用大承氣也〇按舌乾得乾重者蓋咽舌雖皆通于少陰之絡而舌又為心之苗也傷寒喜湯而惡[illegible]故舌乾為輕也）

厥陰傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥冷下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者難治麻黃升麻湯 傷寒一二日至四五日而厥者必發熱應下之反

發其汗必口傷爛赤
〔吳〕少陰脉疾可下脉沉附子湯加知母黄蘗麥門冬五味子天花粉若虛熱病後有熱不解者以竹葉石膏湯須去半夏加天花粉潤之凡發汗吐下後口燥咽乾此津液衰少腎水不升虛火上炎也宜生津益氣湯或竹葉石膏湯若脉沉微足冷舌燥者多難治其少陰有急下以救腎水之例若虛人水竭火燥不可下者以補中益氣湯倍加人參五味麥門冬天花粉黄蘗知母以滋水也

狐惑病亦咽乾默默不欲眠目不能閉聲嗄咽乾為狐

惑但蟲蝕下部者為狐其咽乾下唇有瘡黄連犀角湯

〔趙〕活人謂脾藏有熱則津液枯少故令口燥而咽乾津液枯少固也然非獨脾藏有熱脾主太陰太陰腹滿而咽乾此可言脾熱特一證耳餘皆非也如白虎加人參湯證口舌乾燥者表裏俱熱也口苦咽乾者少陽經熱或陽明中風也口燥咽乾急下之自利清水色純青心下痛口乾燥者少陰經熱也咽乾煩躁吐逆者誤汗津液少而欲作陽明內熱者也如上數證豈亦脾藏有熱哉

眩

凡傷寒頭眩者莫不因汗吐下虛其上焦元氣之所致也眩者目無常主頭眩者俗謂頭旋眼花是也眩冒者昏冒是也少陽口苦咽乾目眩者少陽居表裏之間以表邪漸入于裏表中陽虛故目眩也太陽少陽併病或眩者責其虛也傷寒有起則頭眩與眩冒者皆汗吐下後所致是知其陽虛也故針經曰上虛則眩下虛則厥眩雖為虛又陽明中風但頭眩不惡寒者此又風主眩也凡此皆非逆候及其諸逆發汗劇者言亂目眩者死噫病勢已成可得半愈及病已劇神醫莫為也

〔太陽〕傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之吐下後裏虛氣上逆心下逆滿氣上衝胸表虛陽不足起則頭眩脉浮緊邪在表當發汗脉沉緊邪在裏不可汗汗則外動經損傷陽氣則不能主持諸脉身為振振搖也與此湯以和經益陽氣真武湯主之汗後補不足以密腠理不能止汗　傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿傷寒吐下後發汗則表裏之氣俱虛煩脉甚微為正氣內虛邪氣獨在至七八日正氣當復邪氣當罷而心下痞脇下滿氣上衝咽喉眩冒是正氣未復而邪氣留也經脉動惕者經絡之氣虛極久則熱氣還經必成痿弱或用真武湯桂枝茯苓白朮甘草湯

太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺俞

禁下　太陽少陽併病頭項強痛眩冒時如結胸心下痞鞕刺大椎第一間肺俞肝俞禁發汗汗則譫語脈弦五六日譫語不止刺期門

陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難欲作穀疸須下之腹滿如故所以然者脈遲故也[illegible]

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛[illegible]

少陽少陽之病口苦咽乾目眩也[illegible]天麻川芎

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死下利則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤方論見動氣活人云宜小建中湯

諸逆誤汗而言亂目眩者死詳見譫語

吳太陽中風頭眩頭搖者脈浮弦而急也羌活神术湯加防風天麻之類若血虛頭眩者以四物湯加人參天麻之類若痰火上攻者加酒芩竹瀝之類若內傷勞役陰虛頭眩者宜補中益氣湯加川芎天麻防風蔓荊子之類若下焦元氣虛脫者宜人參養榮湯或大建中湯加天麻曾治一婦人服藿香正氣散二劑汗出過多頭眩身搖發熱脈虛數遂用人參養榮湯倍加人參為主加天麻少佐酒炒黃蘗二服而愈易老曰頭旋目黑非天麻不能除故加之少加黃蘗以救腎水也

往來寒熱

成無己曰往來寒熱者寒已而熱作熱已而寒起蓋寒為陰熱為陽裏為陰表為陽邪客于表與陽爭則發寒矣邪入于裏與陰爭則發熱矣表邪多則寒多而熱少裏邪多則熱多而寒少邪在半表半裏之間外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱表裏之不拘內外之無定由是寒熱往來而無常也故以小柴胡立諸加減法以和解之又寒熱如瘧與夫往來寒熱似是而非也如瘧者止作有時正氣與邪爭則作分則止矣往來寒熱則止作無時或往或來日有三五發或者十數發此其與瘧異也雖

然往來寒熱屬半表半裏當和解之又有病至十餘日熱結在裏復往來寒熱亦宜大柴胡下而愈 趙傷寒百問歌第五十九問中以陰陽相勝陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒此特論陰陽雜病二氣自相乘勝然也非可以語傷寒

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳者與小柴胡湯主之成無己曰病有在表者有在裏者有在表裏之間者此邪氣在表裏之間謂之半表半裏證五六日邪氣自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日也玉函曰中風五六日傷寒往來寒熱即是或中風或是傷寒非是傷寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂或中風或傷寒也邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表半裏之間未有定處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今止言胸脇苦滿知邪氣在表裏之間未至於心腹滿言胸脇苦滿知邪氣在表裏也默默靜也邪在表則呻吟不安邪在裏則煩悶亂內經曰陽入之陰則靜默默者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏則不能食不欲食者邪在表裏之間未至於必不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔煩喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未有定處則所傳不一故有或為之證有柴胡證但見一證便是即是此或為之證

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯成無己曰太陽轉入少陽是表邪入於裏脇下鞕滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脈沉緊者邪陷入府為裏實尚未經吐下而脈沉緊為傳裏雖深未全入府外猶未解也與小柴胡湯以和解之

若已吐下發汗溫針譫語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之成無己曰少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫針損耗津液胃中乾燥木邪干胃必發譫語若柴胡證不罷者則不為逆柴胡證罷者壞病也詳其因何治之逆以法救之 救壞病助榮衛生津液桂枝湯[illegible]

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之難知曰若用柴胡而移時于早晚氣移于血血移于氣是邪無所容之地故知其欲自解也○傷寒五六日已經汗下之後則邪當解今胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者則邪氣猶在半表半裏之間為未解也胸脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出餘處無汗者

血弱氣盡[illegible]乾腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之[illegible]也

小柴胡湯方

柴胡半斤　半夏半升洗　人參

甘草　黃芩　生薑各三兩

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服內經曰熱淫于內以苦發之柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱裏不足者以甘緩之人參甘草之甘以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆辛以散之半夏以除煩嘔邪半在表則榮衛爭之辛甘解之薑棗以和榮衛

加減法[illegible]此加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚胸中煩而不嘔者熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛温熱宜寒療聚宜苦括蔞實苦寒以泄胸中蘊熱若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根肆兩半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤括蔞根苦而涼徹熱生津二物為當若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩去黃芩恐寒中加芍藥以[illegible]功大若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩甘令人中滿痞者去大棗之甘鹹以軟之痞鞕者加牡蠣之鹹若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩飲而水蓄不行為悸小便不利內經曰腎欲堅急食苦以堅腎則水益堅故去黃芩淡味滲泄為陽茯苓甘淡以泄伏水若不渴外有微熱者去人參加桂三兩温覆取微汗愈不渴者裏和也故去人參外有微熱表未解也加桂以發汗若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩欬者氣逆也甘則壅氣故去人參大棗內經曰肺欲收急食酸以收之五味子之酸以收逆氣肺寒則欬散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也

傷寒邪氣在表者必漬形以為汗邪氣在裏者必蕩滌以取利其於不外不內半表半裏是當和解則可也小柴胡和解表裏之劑內經曰熱淫于內以苦發之邪在半表半裏則半成熱矣熱氣內傳變不可測須迎而奪之必先散熱是以苦寒為主故以柴胡為君黃芩為臣以成徹熱發表之劑邪氣傳裏則裏氣不治故用人參甘草為主以扶正氣而復之也邪初入裏氣必逆也是以辛散之物為之助故用半夏為佐以順逆氣而散邪也裏氣平正則邪氣不得深入是以三味佐柴胡以和裏內經曰辛甘發散為陽表邪未已迤邐內傳既未作實宜當兩解其在外者必以辛甘發散故用生薑大棗為使輔柴胡以和表也

七物相合兩解之劑當矣邪氣自表未斂爲實乘虛而湊則所傳不一故有增損以禦之胸中煩而不嘔煩者熱也嘔者氣逆也煩而不嘔則熱聚而氣不逆邪氣欲漸成實也人參甘補去之使不助熱也半夏辛散去之以無逆氣也除熱必以寒泄熱必以苦加括蔞實以通胸中之鬱熱若渴者津液不足半夏味辛性燥滲津液物也去之則津液易生人參味甘而潤括蔞根味苦而堅堅潤相合津液生而渴自已邪氣入裏裏氣不足則寒寒而腹中痛黃芩苦寒而寒中去之則氣易和芍藥酸泄而利中加之則裏氣得

通而痛自已內經曰甘者令人中滿大棗甘溫去之則鞕滿散鹹以耎堅牡蠣味酸鹹寒加之則痞者消而鞕者耎若心下悸小便不利水畜而不行也內經曰腎欲堅急食苦以堅之堅腎則水益堅黃芩苦寒去之則畜水浸行內經曰淡味滲泄爲陽茯苓甘淡加之則津液通流若不渴外有微熱不渴則津液足去人參以人參爲主內之物也外有微熱則表證多加桂枝以取汗發散表邪也若咳者肺氣逆也甘補中則氣愈逆故去人參大棗之甘肺欲收急食酸以收之氣逆不收故加五味子之酸蓋咳本於寒寒氣

內淫則散以乾薑之辛熱生薑乾薑一物也生者溫乾者熱故以乾易生也

【吳】或問小柴胡湯近世治傷寒發熱不分陰陽而用之何也然柴胡之苦平乃足少陽經傷寒發熱之藥半表半裏之熱除往來寒熱小有日晡潮熱也佐以黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛以退寒人參大棗之甘溫以助正氣解渴生津液則陰陽和而邪氣解矣但太陽經之表熱陽明經之標熱皆不能解也如用之豈曰無害若夫今陽寒面赤發熱脉沉足冷者服之立至危殆可不慎哉及內虛有寒大便不實

脉息小弱與婦人新產發熱皆不可用也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解【成】邪在半表半裏之間爲柴胡證即未作裏實醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不爲逆可復與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱先經下裏虛邪氣欲出內則振振然也正氣勝陽氣生却復發熱汗出而解也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具柴胡證是邪氣在表裏之間也或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳但見一證便宜與柴胡湯治或爲證以法治之不必待其證候全具也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出大陷

胸湯主之

大柴胡湯方

柴胡　半夏　黄芩

芍藥　生薑　大棗

枳實

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎溫服一升日三服一方有大黄二兩　若不加大黄恐不為大柴胡湯也

〔成〕方有峻緩輕重劑當臨時斟酌如大滿大實堅有燥屎者非駛劑則不能泄是以有大小承氣湯之峻也如不至大堅滿惟邪熱甚而須攻下者又非承氣湯之可投必也輕緩之劑乃大柴胡湯用以逐邪熱也經曰傷寒發熱七八日雖脉浮數可下之宜大柴胡湯又曰太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解可與大柴胡下之則愈是知大柴胡為下劑之緩也傷寒主于可下則為熱有餘應火而歸心苦先入心折熱必以苦為主故以柴胡苦平微寒為君黄芩苦寒為臣内經曰酸苦涌泄為陰泄實折熱必以酸苦故以芍藥枳實為佐辛者散也散逆氣者必以辛甘者緩也緩正氣者必以甘故用半夏生薑之辛溫大棗之甘溫為之使也一方加大黄以大黄有將軍之號而功專蕩滌必應以大黄為使

〔許〕有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不除予曰脉洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除盖大黄蕩滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黄恐不名大柴胡須酒洗生用有力

〔張〕或問大柴胡若内煩裏實者固宜用也其嘔而下利者亦用之何也夫治病節目虚實二者而已裏虚者雖便難而勿攻裏實者雖吐利而可下經曰汗多則便難脉遲尚未可攻以遲為不足即裏氣未實故也此以大柴胡主之凡吐利心腹濡軟為裏虚嘔吐而下利心下痞鞕者是裏實也下之當然況太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先以小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈然嘔不止而微煩裏熱已甚結于胃中故下之則愈二節病證雖有參差其裏實同一機耳皆與大柴胡者宜也

傷寒五六日已發汗而復下之胷脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之[illegible]

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡 半斤　栝蔞根 四兩　桂枝 三兩去皮

牡蠣 熬　乾薑　黃芩 各三兩

甘草 二兩炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服初服微煩再服汗出便愈

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳表之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在表之邪鹹以軟之牡蠣之鹹以消胸脇之滿辛以潤之乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而為渴苦以堅之栝蔞之[illegible]生津液

病人脉微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知血亡也

右脉微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦欲著複衣脉濇因大下所致故病當惡寒後發熱之時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝冷勝熱非是盛夏至延至盛冬也

脇滿痛

邪氣傳裏必先自胸而脇以次經心腹而入胃也是以胸滿多帶表證脇滿多帶半表半裏證如下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯又太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯二者屬表須汗之蓋胸中至表猶近也及脇則更不言發汗但和解而已經曰設胸滿脇痛者及胸脇滿不去者與夫本太陽病不解傳入少陽脇下鞕滿乾嘔往來寒熱脈沉緊者俱宜小柴胡和解之也大抵邪初入裏尚未停留爲實但鬱積生滿者和解斯可矣若留于胸中聚而爲實者又非吐下之不可已

如發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯若胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此胸中有寒瓜蒂散二者均是吐劑又當知梔子吐虛煩客熱瓜蒂吐痰實宿寒也

太陽病十日已去脈浮細而嗜卧者外已解也若胸滿脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯　傷寒四五日身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參栝蔞根主之　傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中滿或脇下痞鞕或心中悸小便不利或不渴身有微熱或欬小柴胡湯主之　傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫數下之不能食脇滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯必下重　傳經熱邪脇滿乾嘔大柴胡湯　太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也宜十棗湯

十棗湯方

芫花炒黑　甘遂　大戟各等分

右爲細末和合之再入臼中杵二三百下先以水一升煑肥棗十枚取五六合去査納藥末強人一錢虛人半錢單飲棗湯送下平旦服若下少病不除者明日更服加五分利後米粥調養若合下不下令人脹滿徧身浮腫也昔杜壬問孫兆曰十棗湯畢竟治甚病孫曰治太陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言病證而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰其嘗於此未決願聽開喻杜曰裏未和

者蓋痰與燥氣壅於中焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰膈也非十棗不治但此湯不宜輕用恐損人於倏忽用藥者慎之

陽明病潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之　陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者小柴胡湯　陽明中風脈弦浮大短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黄小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯脈但浮無餘證者麻黄湯　本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者噦（[illegible]水停心下也）

少陽脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽（方論見往來寒熱）

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者熱除也欲得食爲病愈若厥而嘔胸脇煩滿者必便血（黄芩芍藥湯小柴胡湯武當湯）

吳綬治脇下痛加枳殻青皮桔梗芍藥脇下硬加牡蠣粉若增寒拘急往來寒熱而胸脇滿者加桂枝白芍藥俱小柴胡湯内加之

婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼脇滿如結胸狀譫語者刺期門（論見譫語）

吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩冒經脈動惕者成痿（論見痿）　下後脈弦者必兩脇拘急　脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者名藏結死（左右皆陰陽之道路脇之部也宿痞在臍則陰陽之道路不通故邪不得傳經而直入于藏是以死也）

胸滿　[illegible]

太陽太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯 [illegible]

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯 [illegible]

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散 [illegible]

太陽病下之脈促胸滿者桂枝去芍藥湯 方論見惡寒

若脈促不結胸者欲解也

下後胸滿小便不利若無煩驚譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯 方論[illegible]

若熱暖而舌胎者為濕痺 [illegible]

陽明潮熱大便溏小便可胸脇滿屬陽明 見脇滿

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者若吐下之則悸而驚救逆小柴胡去黃芩加茯苓湯 少陽之脈起於目[illegible]耳中其支者下胸中貫膈風傷氣風則為熱少陽中風氣壅而熱故耳聾目赤胸滿而煩邪在少陽為半表半裏[illegible]吐則傷氣氣虛者悸[illegible]

太陰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕 [illegible]

少陰病下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯 [illegible]

厥陰病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿而煩飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散 手足厥冷者邪氣內陷也脈緊牢者為實邪氣入府則脈沈今脈乍緊知邪結在胸中為實故心下滿而煩胃中無邪則喜飢以病在胸中雖飢而不能食與瓜蒂散以吐胸中之[illegible]

熱少厥微胸脇煩滿一證已前見

〇吳 胸滿多用吐法實者宜瓜蒂散虛者宜人參蘆或以香蘇散飲下一甌以手探喉中吐之亦可凡傷寒三四日已傳少陽經脈弦口苦發熱而胸滿宜小柴胡湯若胸中滿悶者加枳殼桔梗各二錢以利之若胸脇滿而煩者加瓜蔞實三錢黃連一錢半　活人

治胸滿氣痞不寬只用枳殼桔梗各二錢生薑五片名曰枳殼湯　凡心之上胸之分宜枳殼心之下胃之分宜枳實盖枳殼能泄至高之氣枳實能泄至低之氣其瓜蔞仁能瀉肺洗滌胸中痰垢之要藥也故胸滿而煩必加之一法治氣痞胸滿用小麥麩一二升以生枳殼切半同炒令熱去枳殼以帛包熱麩熨胸中頻易熱之則氣易散而愈矣

胸痛

胸脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見大法活人云柴胡湯主之

病胸中諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之利則止

吐下後温温欲吐胸中痛大便溏腹滿而煩者宜調胃承氣湯[illegible]

耳聾

耳聾有二一由重發汗虛一由少陽中風　胷脇痛耳聾尺寸脉俱弦者少陽受病也

未持脉時病人叉手自冒心試教令欬而不欬者此必耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此[illegible]

少陽中風兩耳無聞目赤胸滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚[illegible]

少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥者此兩感證　厥陰榮衛不通耳聾囊縮不知人危矣　濕溫證治在太陰不可汗汗則不能言耳聾不知病處身青面色變名曰重暍 白虎加蒼朮湯

陽毒

陽毒之證初受病時所加邪毒深重加以當汗失汗當下失下或吐下後邪熱乘虛而入誤服熱藥使毒熱散漫如抱薪救火無不延燎至於六脉沉實舌卷焦黑鼻中如烟煤身面錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌棄衣而走皆其證也五日可治六七日不可治

升麻鱉甲湯　治陽毒為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血

升麻[illegible]　當歸　蜀椒[illegible]

甘草[illegible]　鱉甲[illegible]　雄黃[illegible]

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金方陽毒升麻湯有桂無鱉甲陰毒甘草湯無雄黃

〇附

活陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或下利脉浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血五日可治七日不可治

升麻　犀角鎊　射干

黄芩　人參　甘草各等分

右㕮咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗解不解重

作

陽毒梔子湯 治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻 黄芩 杏仁 石膏 各壹錢

梔子 赤芍藥 知母 大青 各壹錢

甘草 [illegible] 柴胡 壹錢半

右㕮咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黄散治陽毒傷寒未解熱在内恍惚如狂

大黄 [illegible] 桂心 [illegible] 甘草 [illegible] 芒硝

大腹皮 木通 [illegible] 桃仁 [illegible]

右㕮咀水煎服以利為度

葛根散 治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根 [illegible]錢半 黄芩 大黄 醋炒

甘草 梔子 朴硝 各半兩

右㕮咀水煎服

活 黑奴丸 治時行病六七日未得汗脉洪大或數面赤目痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不解熱在胸中口噤不能言為壞傷寒醫所不治或人精魄已竭心下尚煖撥開其口灌藥下咽即

活 無治陽毒及發斑

麻黄 去節泡 叁兩 大黄 貳兩 釜底煤 研

黄芩 芒硝 竈突墨 研

梁上塵 小麥奴 各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服一丸須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者乃可與之若不渴者服之反為禍耳

脉洪大内外結熱舌卷焦黑鼻中如煙煤以水漬布薄之壓布數重新水漬之稍捘去水搭於胸上須臾蒸熱又漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於

水中勢纔退則已亦一良法也

丹砂丸 治傷寒陰陽二毒危惡形證

舶上硫黄 水銀 太陰玄精石

太陽石 各壹兩 硝石 半兩

右為末用無油銚子以文武火炒上項藥令匀如灰色研極細生薑自然汁浸炊餅丸如菉豆大每服五丸龍腦生薑蜜水下壓其躁也若陽毒蜜湯下陰毒白湯下不許於屋底炒

白虎加人參名化斑湯 斑盛者青黛一物湯 咽痛玄參升麻湯

青黛一物湯

青黛(如棗大)用新汲水研服

玄參升麻湯

升麻 玄參 甘草(各半兩)

水三盞煎一盞半去滓服

陶陽毒傷寒服藥不效斑爛皮膚手足皮俱脫身如塗硃眼珠如火躁渴欲死脉洪大而有力昏不知人宜三黃石膏湯主之或升麻梔子湯吐之 若熱甚時狂時昏口噤咬牙藥不可下者用水漬法候牙寬狂亂稍定投藥亦良如黑奴丸不可輕用

活陽氣獨勝陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛發斑或下下利赤黃脉洪實或滑促宜酸苦之藥救陰 陽毒輕者桔梗大黃湯 陽毒升麻湯 梔子仁湯 又龍膽草一物湯

趙陽根于陰陰根於陽無陽則陰無以化無陰則陽無以生可見兩者不能相無也又仲景云陽氣先絕陰氣後絕此人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭此人死身色必赤則知陰陽二氣在人身中不可偏絕絕則無復生之理今活人書論陰毒而曰陽氣絕論陽毒而曰陰氣絕既絕矣是為不治之證又何藥焉蓋陰陽二證之深重也又挾毒氣是為陰毒陽毒故其藥皆用升麻犀角雄黃大青葦以解其毒然後陽毒泄而陰氣復陰毒泄而陽氣復大汗出而解矣活人書何不曰陽氣極盛陰氣極微為陽毒陰氣極盛陽氣極微為陰毒庶不為極絕之證

傷寒證治準繩帙之四

金壇王肯堂輯　門人南昌張　綍校

三陰總論

黄三陰有傳經之邪有內感之邪傳經者自太陽傳入者是也內感者直中三陰非自陽經次第流傳而來由形寒飲冷而得損動胃氣之所致也其脈證略與傷寒外感之證相似細辨之特異耳然止係雜病非傷寒熱病受寒之證也夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒仲景云發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒

者發於陰也此三陰內感之證首尾無熱縱有熱者亦仲景所謂反發熱也又當考始得之三字則見矣內感之證始終只在一經不復傳變不傳者何陽動而陰靜故陽傳而陰不傳也若以傷寒之三陰三陽言之則所傳者表裏經絡而已況風寒六氣之邪中人或中於陽經或入於陰絡孰爲之先孰爲之後烏可舉以太陽爲受邪之始故各經皆能受邪然邪自太陽始者比各經居多蓋始雖自三陰中熱者亦漫衍經絡周遍而後已也三陰經自中寒決無復傳變三陰之證與合併病者以此王肯堂讀張仲景傷寒論於太陰有曰自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩於少陰有曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之少陰病下利白通湯主之少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯於厥陰有曰手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之觀仲景

此論則傷寒三陰必有寒證而宜用溫熱之劑也及讀劉守真之書有曰傷寒邪熱在表府病爲陽邪熱在裏藏病爲陰俗妄謂有寒熱陰陽異證誤人久矣寒病有矣非汗病之謂也寒病止爲雜病終莫能爲汗病且造化汗液之氣者乃陽熱之氣非陰寒之所能也雖仲景有四逆湯證是治表熱裏和誤以寒藥下之太早表熱入裏下利不止及或表熱裏寒自利急以四逆溫裏利止裏和急解其表也故仲景四逆湯證復有承氣湯下之者由是傷寒汗病經直言熱病而不言寒也經言三陰證者邪熱在藏在裏以藏與裏爲陰當下熱者也素

問論傷寒熱病有二篇名曰熱竟無寒理兼素問并靈樞諸篇運氣造化之理推之則為熱病誠非寒也觀守眞此論則傷寒無問在表在裏與夫三陽三陰皆一於為熱而决無或寒者矣兩說不同其是非之判必有一居此者由是彼此反覆究詰其義而久不能得雖至神疲氣耗不舍置者自謂此是傷寒大綱領此義不明則千言萬語皆未足以為後學式況戕賊民生何有窮極也哉意可成無已之註必有所發明者遂因而求之然亦止是隨文而略釋之竟不明言何由為熱何由為寒

之故此非其不欲言也蓋止知傷寒皆是傳經故疑於六經所傳俱為熱證而熱無變寒之理遂不敢別白耳以寒為本藏之寒歟安得當熱邪傳裏入深之時反獨見寒而不見熱者且所用溫熱藥能不助傳經之熱邪乎以寒為外邪之寒歟則在三陽以成熱矣豈有傳至三陰而反為寒哉成氏能潜心乎此則必悟其所以然矣自仲景作傷寒論已來靡或遺之而弗宗至於異同之論興而漁者走淵木者走山矣宜乎後之人不能决於似是而非之際故或謂今世並無眞傷寒病又或以為今人所得之病俱是內傷又昧者至謂傷寒論中諸溫藥悉為傳經熱邪而用者以三陰經屬陰故也又其太

誤者則曰凡論中有寒字皆當作熱字看嗚呼末流之弊一至此乎於是澄心靜慮以涵泳之一旦豁然若有所悟者然亦未敢必其當否也姑陳之以從有道之正夫三陽之病其寒邪之在太陽也寒鬱其陽陽不暢而成熱陽雖人身之正氣既鬱則為邪矣用麻黃發表以逐其寒則腠理通而鬱熱泄故汗而愈苟或不汗不解其熱不得外泄則必裏入故傳陽明傳少陽而或入府也若夫三陰之病則或寒或熱者何哉蓋寒邪之傷人也或有在太陽經鬱熱然後以次而傳至陰經者或有太陽不傳陽明少陽而便傳三陰經者或有寒邪不從

陽經而始直傷陰經者或有雖從太陽而始不及鬱熱即入少陰而獨見少陰證者或有始自太陽即入少陰而太陽不能以無傷者或有直傷即入而寒便變熱及始寒而終熱者其鬱熱傳陰與變熱則為熱證其直傷陰經及從太陽即入少陰則為寒證其太陽不能無傷則少陰脉證而兼見太陽標病其始為寒而終變熱則先見寒證而後見熱證此三陰之病所以或寒或熱也苟即三陰經篇諸條展轉玩繹以求之理斯出矣夫其或傳經或直傷或即入或先寒後熱者何也邪氣暴卒本無定情而傳變不常故耳故經曰邪之中人也

經有嘗或中于陽或中于陰夫守真者絕類離倫之士也豈好為異說以駭人哉蓋由其以溫暑為傷寒而仲景之方每不與溫暑對故略乎溫熱之劑而例用寒涼由其以傷寒一例為熱而無寒故謂仲景四逆湯為寒藥誤下表熱裏和之證及為表熱裏寒自利之證而立又謂溫裏止利急解其表又謂寒病止為雜病嗟乎仲景傷寒論專為中而即病之傷寒作不兼為不即病之溫暑作故每有三陰之寒證而溫熱之劑之所以用也以病則寒以時則寒其用之也固宜後人不知此意是以愈求愈遠愈說愈鑿若知此意則猶庖丁解牛動中

肯綮矣且如寒藥誤下而成裏寒者固不為不無矣不因寒藥誤下而自為裏寒者其可謂之必無乎殊不知陰經之每見寒證者本因寒邪不由陽經直傷於此與夫雖由太陽而始不及鬱熱即入於此而致也雖或有因寒藥誤下而致者蓋亦甚少仲景所用諸溫熱之劑何嘗每為寒藥誤下而立況表裏寒之證亦何嘗每有急解其表之文乎夫裏寒外熱之證乃是寒邪入客於內迫陽於外或是虛陽之氣自作外熱之狀耳非真熱邪所為也觀仲景於裏寒外熱之證但以溫藥治裏寒而不治外熱則知其所以為治之意矣若果當急解其

表豈不於裏和之後然後言之乎且三陰寒病既是雜病何故亦載於傷寒論以惑後人乎其厥陰病篇諸條之上又何故每以傷寒二字冠之乎夫內經所叙三陰病一於為熱者言其常也仲景所叙三陰病兼乎寒熱者言其變也並行而不相悖耳後人謂傷寒本無寒證得非知常而不知變歟然世之恪守局方好用溫熱劑者乃反能每全於寒證無他其守彼雖偏治此則是故者能知三陰固有寒邪所為之證則仲景創法之本意可以了然於心目之間而不為他說所奪矣或曰傷寒之病必從陽經鬱熱而傳三陰今子謂直傷陰經即入陰

經而為寒證其何據乎予曰據夫仲景耳仲景曰病發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈夫謂之無熱惡寒則知其非陽經之鬱熱矣謂之發於陰則知其不從陽經傳至此矣謂之六日愈則知其不始太陽而止自陰經發病之日為始數之矣仲景又曰傷寒一二日至四五日而厥者必發熱傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進夫得傷寒未為熱即為厥者豈亦由傳經入深之熱邪而致此乎今世人多有始得病時便見諸寒證而並無

或熱者此則直傷陰經即入陰經者也苟不能究夫仲景之心但執凡傷於寒則為病熱之語以為治其不夭人天年者幾希矣

太陰病　腹滿　腹痛　黄　[illegible]入少陰[illegible]蓋此

[illegible]

黄太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛者宜理中也陰經少有用桂枝湯者如此證若脉浮即用桂枝湯微汗之若惡寒甚不已者非理中四逆不可也三陰俱有惡寒但喜厚衣即惡寒也前證若下之必胸下結鞕又宜瀉心湯也雖然用瀉心者由誤下而致

非傳經熱邪也三陰雖皆有傳經熱邪故自有熱證與此陰證不同大宜詳究太陰經治法有汗下温和解

汗　桂枝湯　桂枝加芍藥湯

下　桂枝加大黄湯

温　四逆湯　理中湯

和解　梔子蘗皮湯　茵蔯五苓散

經云尺寸俱沉細者太陰受病也以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾今查太陰篇無嗌乾證　太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕氣盛太陰為病腸邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣壅而為腹滿上不得降者逆吐而食不下[illegible]

[illegible]下之因作痞　自利不渴者屬太陰　脉浮而緩手足自温者繫在太陰　下後腹滿時痛者屬太陰　太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯在太[illegible]

[illegible]

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黄湯主之[illegible]

[illegible]

桂枝加芍藥湯方

桂枝　生薑各叁兩半　甘草貳兩炙

芍藥陸兩　大棗拾貳枚

右五味以水七升煮取三升去滓分温三服

桂枝加大黄湯方

桂枝壹兩　芍藥壹兩半　甘草炙半兩

大黄半兩大便實痛者加壹兩虚者照本方

右㕮咀大棗二枚生薑四片水煎温服

張或謂太陰病用四逆輩固當然復用桂枝大黄夫大黄至寒何為用之於陰經又兼桂枝大黄寒熱相

雖兩用何也曰夫自利而渴者屬少陰爲寒在下焦自利不渴者屬太陰爲寒在中焦以四逆等湯温其藏此本經當用之藥也其太陽病反下之表邪未解乘虛傳於太陰因而腹滿時痛用桂枝芍藥湯若大實痛者桂枝加大黃以除表裏之邪已上二節雖下後而利已此無有滿痛形證故用芍藥大黃爲宜若脉浮弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱故易動也

韓活人書第四問太陰經病證中云腹滿時痛屬太陰也又云腹痛桂枝加芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯

愚詳太陰病腹滿證有二有次第傳經之邪有直入本經之邪有下後內陷之邪不可不辨也如腹滿咽乾者此非傳經之陽邪者乎法當下之腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕此非直入本經之陰邪者乎法當温之如太陽病醫反下之因爾腹滿時痛此誤下內陷之邪也法當用桂枝加芍藥湯大實痛者桂枝加大黃湯今此問中不言桂枝加芍藥加大黃二湯爲治誤下後之劑又不曰大實痛但曰痛甚設遇本經直入陰邪腹滿時痛而脉沉細者依此用桂枝加芍藥大黃輩下之豈不貽胸下結鞕之悔又所謂大實痛者乃胃中邪實結燥而痛則痛甚與大實證全別以是知本經陰邪腹滿者宜理中加青皮陳皮傳經之邪腹滿咽乾者屬大柴胡誤下後腹滿痛方見上

太陰病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也　太陰中風四肢煩疼脉陽微陰濇而長者爲欲愈[illegible]

太陽病欲解時從亥至丑上[illegible]

活古人以四日太陰證乃在胸中可吐而愈何也答曰不然有太陰證脉大胸滿多痰者可吐之脉大而無吐證者可汗而已大抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄之瓜蔞梔豉隨證施用不可拘以日數也

趙活人五十六問云陰證有發熱者乎太陰厥陰皆不發熱只少陰有發熱證愚詳仲景論中三陰皆有發熱如少陰二證外又有吐利手足不逆冷反發熱者不死少陰病一身手足盡熱以熱在膀胱必便血少陰病四逆散中用柴胡亦有發熱又厥陰病先厥

後發熱而利者必自止下利脈數有微熱汗出令欲愈面赤身微熱為鬱冒嘔而發熱小柴胡與夫太陰病中風四肢煩疼是三陰皆有發熱何其言之拘耶又云太陰篇無吐法如虛煩膈實等證可吐者皆屬他經獨華佗云四日在胸可吐之亦不曰太陰今活人傷寒問中云太陰病在胸膈可吐何耶況胸中本非太陰經部分仲景雖有下之則胸結鞕是誤下後壞病也而胸下乃近心腹處亦非吐藥可治也至于論脈仲景但云太陰尺寸皆沉細亦未嘗言脈大

腹滿

腹滿俗云肚脹有屬熱者有屬寒者陽熱則腹滿咽乾或大小便祕澀或潮熱譫語等證陰則腹滿吐食不下自利益甚時腹自痛雖然腹滿為裏證又有淺深之別經曰表已解內不消非大滿猶生寒熱則病不除是未全入府邪猶淺也若大滿大實堅有燥屎可除下之雖四五日不能為禍是已入府邪已深也腹滿固多可下又有虛實之殊經曰腹滿不減為實可下去之若腹滿時減為虛則不可下又曰腹滿不減減不足言當下之要略曰腹滿時減復如故此虛寒從下上也當以溫藥

和之蓋虛氣留滯亦為之脹但比實者不至堅痛爾諸經皆有腹滿但太陰屬脾土位中央又專主腹滿之候腹滿之證二十餘條治法有汗吐下溫刺之異又有汗吐下後成腹脹者治法亦各不同蓋胃為津液之主發汗亡陽則胃氣虛而不能敷布諸氣壅滯而為脹滿是當溫散厚朴生薑甘草半夏人參湯可也吐後邪氣不去加之腹脹滿者胸中之邪下傳入胃壅而為實故生脹滿當須下之調胃承氣湯可也邪未入府而妄下之表邪乘虛入鬱胸中有虛煩氣上下不得通利腹為之滿故當吐之梔子厚朴湯可也醫者能審邪氣所起之

由來眞知邪氣所在之虛實發汗吐下之不差溫補針艾之適當則十全之功可得也　又結胸從心下起至少腹鞕滿而痛與腹滿類也然結胸按之則痛手不可近腹痛舉按常痛手近不甚也又痞亦從心下起至少腹亦與滿類也然痞或止留心下腹滿但在腹之中也有此爲異臨證宜審

太陽發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之 成[illegible]發汗後[illegible]外已解也腹脹滿[illegible]實[illegible] 傷寒[illegible]曰凡言發汗後者以外無表證裏無別證止有腹脹一事而已除此之外即獲全安夫傷寒二字豈可易言哉其傳變吉凶猶反掌耳可與所謂一證而並例哉其諸汗後條目不殊此意

厚朴生薑人參甘草半夏湯方

厚朴炙去皮　生薑各半斤　人參壹兩

半夏洗半升　甘草貳兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

傷寒下後心煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯主之 成下後但腹滿而不心煩則邪氣入裏爲裏實但心煩而不腹滿則邪氣在胸中爲虛煩既煩且滿則邪氣壅于胸腹之間也滿者不能坐煩者不能臥故令臥起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿　太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者調胃承氣湯若不愈不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔知極吐下也 吳茱萸湯 半夏瀉心湯　太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸床小便利者可治　傷寒腹滿譫語寸口脈浮而緊此肝乘脾名曰縱刺期門 [illegible] 傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴引飲腹滿自汗小便利病欲愈此肝乘肺也名曰橫刺期門 按傷寒發熱惡寒表病也至於自汗出則表已解矣大渴腹滿裏病也至于小便利則裏自和矣故曰其病欲解欲解則當俟其自愈矣刺期門三字疑衍

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也 麻黃湯　三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者白虎湯　陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者以脈遲故也 梔子蘗皮湯　傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯 成內經云諸腹脹大皆屬于熱熱在上焦則吐吐後不解復腹脹

[illegible]

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯　腹滿時減減不足言當下之宜大承氣湯滿痛皆是實若時減者非實也下條是發明上文之義且言若但滿而不減雖未可以爲實若滿而不減者亦可下也○張氏[illegible]不足言復曰當下之何也古之文法如是也言腹滿不減當下之宜大承氣湯是此滿而不減之謂也若時滿時減者不可以當下而論減不足言也[illegible]或不足言之下也[illegible]頭痛有熱者與承氣湯[illegible]也當須發汗若頭痛者必衄[illegible]而發非爲治衄而用也[illegible]足言之說亦不必爭是理　陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者大承氣湯腹微滿必初硬後溏不可攻下後心中懊憹而煩者[illegible]胃中有燥屎者非虛煩也可與大承氣湯下之其腹微滿初鞕後溏是無燥屎此熱不在胃而在上也故不可攻　傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯蒿湯　陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也大承氣湯若汗多微發熱惡寒者表未解也其熱不潮未可與承氣若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下　陽明病脉浮而緊口苦咽乾腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重五苓散白虎湯　陽明病潮熱大便微鞕者大承氣湯若不大便六七日恐有燥屎少與承氣湯湯入腹中不轉失氣者此但初鞕後溏不可攻攻之必脹滿不能食欲飲水者飲水則噦後發熱者必大便復鞕宜小承氣湯　陽明中風脉弦浮大短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥身及面目悉黃小便難潮熱時噦者與小柴胡湯脉但浮無餘證者麻黃湯

太陰爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕[illegible]桂枝加芍藥桂枝加大黃二證已見前條

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯[illegible]少陰入府也六七日少陰之邪入府之時陽明內熱壅甚腹滿不大便也陽明病土勝腎水則乾急與大承氣湯以救腎水

厥陰下利清穀不可汗汗出必腹滿四逆湯　下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏四逆湯乃攻其表桂枝湯下利腹滿者裏有虛寒先與四逆湯溫裏身疼痛爲表未解利止裏和與桂枝湯攻表　傷寒噦而腹滿視其前後何部不利利之則愈成噦而腹滿氣上而不下也視其前後部有不利者則利之以降其氣前部小便也後部大便也或用五苓散小承氣湯

禁忌不大便六七日少與小承氣湯不轉失氣者不可

攻攻之則腹滿不能食（論見不大實） 腹滿吐利者忌下（論見大陰）
腹滿脉浮緊口苦咽乾者忌汗下鍼（論見自汗） 腹滿脉遲者忌下（論見脉遲條） 腹滿脉弱自利設用大黃芍藥宜減之（論見太陰病條）

○附

（活）若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足冷脉沉細少情緒或腹痛急作理中湯加青皮每服一二劑胷即快矣枳實理中丸五積散尤妙 腹脹滿者宜桔梗半夏湯

桔梗半夏湯 治傷寒心腹痞滿時發疼痛

桔梗（微炒） 半夏（薑製） 橘紅（各壹兩）

右㕮咀每服四錢生薑三片水煎服

（海）少陰證小便遺灕大便遺失其人病六七日靜重如山目不覩體如氷腹脹滿與物則咽不與則不求其脉沉細而微疾按之有力宜急下之與大承氣湯

腹痛

邪氣入裏與正氣搏則為腹痛所以痛者有異焉腹痛屬裏正太陽經腹不痛少陽有胸脇痛而無腹痛若有陽明腹滿急而痛此為裏實宜下之大柴胡湯小承氣湯三陰下利清穀而又腹痛者裏寒故也此總論太陽經陽中之陰四逆湯附子理中湯陽氣傳太陰經腹滿而痛其證有二有實痛有虛痛腸鳴泄利而痛者虛痛也此獨論太陰經陰中之陽小建中湯即桂枝加芍藥湯但桂有厚薄爾不瘥則小柴胡湯去芩加芍藥如數腹滿大便秘按之痛者實痛也桂枝加大黃一錢此之

虛痛實痛乃是以陽邪漸消為虛陽氣正大為實

（太）陽傷寒陽脉澀陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差與小柴胡湯（成氏脉陽澀陰弦而腹中急痛者當作裏有虛寒治之與小建中湯温中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣自表之裏裏氣不利所致與小柴胡湯去黃芩加芍藥以除傳裏之邪）

小建中湯方

桂枝（去麄皮） 生薑（切各叁兩） 芍藥（陸兩）
甘艸（炙貳兩） 大棗（擘拾貳枚） 膠飴（壹升）

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解温服一升日三嘔家不可用建中湯以甜故也（內經曰肝生於左肺藏於右心位在上腎處在下脾為土也應中央居四藏之中為中州生育榮衛通行）

津液一有不調則榮衛失所育津液失所行必以此湯溫建中藏是以建中名焉膠飴味甘溫甘草味甘平脾欲緩急食甘以緩之建脾者必以甘為主故以膠飴為君甘草為臣為桂辛熱辛散也潤也榮衛不足潤而散之芍藥味酸微寒酸收也泄也津液不逮收而行之是以芍藥桂為佐生薑味辛溫大棗味甘溫胃者衛之源脾者榮之本針經曰榮出中焦衛出上焦是矣衛為陽不足者益之必以辛榮為陰不足者補之必以甘辛甘相合脾胃健而榮衛通是以薑棗為使或謂桂枝湯解表而芍藥數少建中湯溫裏而芍藥數多何也[illegible]

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為胸中熱欲嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣

黃連湯方

黃連 甘草炙 乾薑炮 桂枝去皮各叁兩

人參貳兩 半夏洗半升 大棗擘拾貳枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂薑半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小柴胡湯

二陽併病太陽初得病時發汗不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹其人煩躁不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹更發汗則愈以脈濇知之[illegible]

陽明病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時此有燥屎故使不大便也[illegible]

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也大承氣湯主之大下之後則胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食已結不消故使煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也與大承氣湯以下除之

發汗不解腹滿痛者急下之

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或嘔或下利或小便利真武湯或少陰病二三日則邪氣猶淺至四五日邪氣已深腎主水腎病不能制水水飲停為水氣腹痛者寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者濕勝而水穀不別也內經曰濕勝則濡泄與真武湯益陽散寒濕

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕反不惡寒面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之下利清穀手足厥冷脈微欲絕為裏寒身熱不惡寒面赤色為外熱此陰甚於內格陽於外不相通也與通脈四逆湯散陰通陽

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之（四逆者四肢不溫也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不溫也及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆與四逆散以散傳陰之熱也）　少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之（二三日至四五日寒邪入裏也小便不利者水穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛寒乃下焦不固也與桃花湯固下散寒也）

〔太陰〕為病腹滿吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕（或用理中湯主之或加四逆湯）　本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛屬太陰也桂枝加芍藥湯大實痛者桂枝加大黃湯（方見）

〔厥陰〕傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲下利也（傷寒四五日邪氣傳裏之時腹中痛轉氣下趨少腹者裏虛遇寒寒氣下行欲作自利也○或用附子乾薑湯四逆湯）

〔雲岐〕傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹如脈弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵如脈沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵如脈沉細而痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

〔吳〕凡腹中痛可按可揉者內虛也不可按不可揉者內實也王海藏言中脘痛者屬脾土脈沉遲內寒者理中湯或用附子理中丸主之若陽脈濇陰脈弦小建中湯主之若小腹痛屬厥陰經分宜當歸四逆湯加吳茱萸主之厥逆者四逆湯加吳茱萸主之若大實腹滿而痛或繞臍刺痛不大便脈實者以大承氣湯下之凡潮熱不大便從心下至少腹鞕滿而痛手不可近者大陷胸湯下之若脈弦腹痛無熱無寒者芍藥甘草湯主之凡脈弦口苦發熱腹中痛者小柴胡去人參加炒白芍湯主之若寒熱交作腹中痛者加肉桂芍藥主之若寒多而痛者去黃芩倍肉桂芍藥也凡少陰發熱手足冷腹中痛者四逆散加附子

湯肉桂炒芍藥吳茱萸主之也凡發熱脈洪弦而腹痛者芍藥黃芩湯主之大抵腹痛有虛有實有冷有熱要在脈證辨而用之凡畜血亦令人腹痛手不可近自有本條　若自利腹痛小便清白便當溫也理中四逆看微甚用輕者五積散重者四逆湯無脈者通脈四逆湯使陰退而陽復也　腹痛欲吐利而煩躁者多有痧毒世俗括刺委中穴　凡脈微弦少腹痛厥陰也宜刺大衝大淵大陵灸歸來關元脈沉臍腹痛少陰也宜刺太白神門三陰交灸中脘

闕傷寒腹中痛用涼水飲之其痛稍可者屬熱當用涼藥不已而或繞臍硬痛大便結實煩渴屬燥屎痛急用寒藥下之或食積痛治亦如之若小腹硬痛小便自利大便黑身目黃者屬畜血痛治亦如之加行血藥下盡黑物自愈此三者痛隨利減之法也若飲水愈痛屬寒當用溫藥不已而或四肢厥冷腹痛嘔吐泄利急用熱藥須詳脉來有力無力方可

劉氏用灰包熨腹痛

龍合灸不灸久則冷結氣上衝心而死

活身無大熱煩渴大便實或腹痛滿及生赤癍疹者

調胃承氣湯黃連橘皮湯

腹痛無頭痛發熱身痛吐利爲霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉爲乾霍亂治法詳雜病霍亂門

黃 三陽合入陽明篇 海藏云色如烟熏黃乃濕病也一身盡痛色如橘黃乃黃病也一身不痛

成濕熱俱甚則發身黃傷寒至于發黃爲病亦已甚矣邪風被火兩陽相薰其身必黃陽明病被火額上汗出小便不利必發身黃此皆由內有熱而被火攻發黃者也陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃者由陽明熱盛而發黃也傷寒汗已身目爲黃以寒濕在裏不解故也此不可下宜于寒濕中求之是知非特濕熱發黃而寒濕亦發黃也但寒濕之黃身如薰黃色暗而不明也熱盛之黃黃如橘色出染着衣正黃如蘗也大抵黃家屬太陰太陰爲濕熱蒸之而致經曰太陰當發身黃

是也一或脉沉結少腹鞕小便自利其人如狂者又爲畜血在下焦使之黃也發黃非止寸口近掌無脉鼻氣出冷爲不治之證又若形體如烟熏直視搖頭爲心絕環口黧黑柔汗發黃爲脾絕是皆不治之證也

太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便自利其人如狂者血也抵當湯 詳畜血 得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫數下之不能食脇下滿痛項強小便難面目及身黃 茵蔯五苓散 詳脇痛 太陽病脉浮動數頭痛發熱微盜汗出反惡寒表未解也醫反下之客氣動膈若不結胸但頭汗出小便不利身必發黃 梔子蘗皮湯 詳頭汗 太陽中風

以火劫汗兩陽相薰其身發黃陽盛欲衄陰虛小便難陰陽俱虛身體枯燥[illegible]

梔子蘗皮湯方

梔子 甘草 黃蘗

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被火者微發黃色 太陽病已汗遂發熱惡寒復下之表裏俱虛復加燒鍼因胸煩面青膚瞤者難治色微黃手足溫者易愈[illegible]

陽明傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軺赤小豆湯

麻黃連軺赤小豆湯方

麻黃去節 生薑切 連軺連翹根也

甘草炙各貳兩 杏仁肆拾箇去皮尖 大棗拾貳枚擘

生梓白皮切壹升 赤小豆壹升

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服半日服盡

內經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故正此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄則不助濕氣

陽明病發熱但頭汗出小便不利渴飲水漿此瘀熱在裏身必發黃茵蔯蒿湯 傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯蒿湯主之當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄于外內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣小便不利小腹滿者熱氣甚於外而津液不得下行也與茵蔯蒿湯利小便退黃逐熱

茵蔯蒿湯方

茵蔯陸兩 大黃貳兩去皮 肥梔子拾肆枚擘

右三味以水一斗先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之發黃者熱之極也非大寒之劑則不能徹其熱茵蔯蒿酸苦寒為

陰酸以湧之苦以泄之故以茵蔯蒿酸苦為君心法南方火而主熱大熱之氣必以苦寒勝之故以梔子為臣宜補必以酸宜下必以苦蕩滌邪熱必假將軍攻之故以大黃為佐雖苦寒大毒必祛除分泄前後復得利而腹得減矣

陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃 陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治 陽明病面合赤色不可攻必發熱色黃者小便不利也梔子蘗皮湯 陽明病被火額上微汗小便不利者必發黃五苓散梔子蘗皮湯 傷寒發

汗已身[illegible]為黄所以然者以寒濕在裏不解故也不可下于寒濕中求之[illegible]

[illegible]

太陰傷寒脉浮而緩手足自温繫在太陰太陰當發身黄若小便自利者不能發黄以脾家實腐穢當去故也

[illegible]

〔要〕右身黄小便自利小腹鞕而狂大便黑者為畜血則宜抵當湯下之若小腹不鞕其人不狂大便不黑者雖小便利非畜血也其為證有三一者梔子蘗皮湯二者麻黄連翹赤小豆湯皆治身黄小便利而身不疼者海藏所謂乾黄是也三者桂枝附子湯去桂加白术湯皆治身黄小便利而一身盡痛者活人所謂中濕是也

張或謂傷寒發黄惟陽明與太陰兩經有之俱言小便利者不能發黄何也蓋黄者土之正色以太陰與陽明俱屬土故發黄也其黄之理外不能汗裏不得小便脾胃之土為熱所蒸故色見于外為黄也若小便利者熱不内蓄故不能變黄也其有别經發黄者亦由脾胃之土受邪故也

趙明瘀熱發黄與瘀血發黄外證及脉未嘗相似且如頭汗出劑頸而還腹微滿小便不利渴飲水漿為瘀熱證小腹急結其人如狂小腹鞕滿小便自利大便黑為瘀血證此外證之不似也瘀血脉微而沉或沉結瘀熱脉則浮滑緊數此脉狀之又不相似也然則相似者但色黄耳若論黄色之相似非特瘀熱與瘀血又如風温被火微發黄色太陽火劫發汗兩陽相薰灼其身發黄陽明被火額上微汗必發黄者是又挾火邪所致者外此亦有黄色之不相似者乎曰濕家之薰黄則異矣可不各以其似不似而明辨歟

附五苓茵蔯散方

以茵蔯濃煎湯調五苓散二錢服之日三四黄從小便下以小便清為度

橘皮湯方

橘皮壹兩　生薑貳兩

細剉水一升半煎七合去滓分二服稍熱呷之未差再作服

茵蔯蒿大黄湯治傷寒發黄面目悉黄小便赤宜服

茵蔯蒿　山梔仁　柴胡

黄蘗蜜塗炙　龍膽草各半兩　黄芩去黑心

升麻　大黃（各五兩）
右㕮咀每服五錢水壹盞半煎至一盞去滓早晚食
後溫服
茅根湯治傷寒發黃徧身如金色者
茅根（洗淨）　山梔仁　茵蔯蒿
地骨皮　甘草（炙各二兩）
右㕮咀每服五錢用水一盞半生薑三片豆豉六七
粒同煎至一盞去滓早晚食遠溫服

（附）陰黃身冷汗出脈沉而黃爲陰黃乃太陰經中濕亦有
體痛發熱者身如熏黃終不如陽黃之明如橘子色也
當叩其小便之利與不利小便自利朮附湯小便不利
大便反快者五苓散

（海）傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰
黃一則寒水太過水來犯土一則土氣不及木來侵之
多變此疾一則茵蔯茯苓湯加當歸桂枝二則茵蔯橘
皮湯加薑朮半夏三則茵蔯附子湯四則茵蔯四逆湯
五則茵蔯薑附湯六則茵蔯吳茱萸湯方見如左　發
黃小便不利煩躁而渴茵蔯湯加茯苓猪苓滑石當歸
官桂主之（韓氏名茵蔯茯苓湯）　發黃煩躁喘嘔不渴茵蔯湯加
陳皮白朮生薑半夏茯苓主之（韓氏名茵蔯陳皮湯）　發黃四肢
徧身冷者茵蔯湯加附子甘草主之（韓氏名茵蔯附子湯）　發黃
肢體逆冷腰上自汗茵蔯湯加附子乾薑甘草主之（韓氏名茵蔯四逆湯）
發黃冷汗不止者茵蔯湯加附子乾薑主之（韓氏名茵蔯薑附湯）
發黃前服薑附諸藥未已脈尚遲者茵蔯
加吳茱萸附子乾薑木通當歸主之（韓氏名茵蔯茱萸湯）　趙宗
顏因下之太過生黃脈沉細遲無力次第用藥至茵蔯
附子湯大效
按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵蔯茯苓湯次投
茵蔯陳皮湯又次投茵蔯附子湯後趙秀才次第做
此

趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至
茵蔯四逆湯大效　傷冷中寒脈弱氣虛變爲陰黃仲
景理中湯加茵蔯服之
（海）往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之
（治）一僧傷寒發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不
愈醫作食黃治之不對病不去問之食不減尋與此
藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病
悉去方用茵蔯梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每
用三錢水四合煎及二合去查食後溫服以知爲度

活　五苓加茵蔯蒿湯治發黃而渴小便不利

茵蔯蒿湯十分　五苓湯五分

右二劑拌勻每服叁錢日三服水調下

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻中出黃水甚驗即用茵蔯湯調五苓散服之甚效

本治頭中濕熱發黃疸瓜蒂散

瓜蒂二七个　赤小豆　黍米各拾肆粒

右爲細末如大豆許一粒納鼻中縮入當出黃水愼不可吹入

雲結胸發黃太陽附本也以陷胸治之　痞氣發黃太陰附本也以痞治之

活問曰白虎證亦有身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃答曰白虎與發黃證相近遍身汗出此爲熱越白虎證也頭面汗出頸已下無汗發黃證也

少陰病　但欲寐嗜卧　口燥咽乾　咽痛

吐　吐利　下利

少陰之爲病但欲寐也又欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者理中四逆輩陰證雖云不用麻黃如少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃細辛附子湯於六經中但少陰證難辨本經但云脈沉細欲寐小便數而白背惡寒四肢厥者可不審而知之或雖有惡寒甚者不覺寒或但喜厚衣近火善嗑睡問之則不言怕寒殊不知厚衣即惡寒也善嗑睡即但欲寐也其脈微細或沉澀雖有陰陽俱緊者盖其人素有熱爲表寒外襲故如此但當察其外證爲主必以溫藥逐之其陽邪傳入及夫少陰自受熱證宜下宜吐宜和解者多矣仲景雖不言脈滑實沉數諸可下之脈然於證則可知矣脈必相符雖或有反沉微細遲脈不應證者爲不可下亦宜涼劑滋陰退陽而愈者其不愈者必待脈有力而後下之可也其有證惡寒急下之者倘反有脈不應病亦宜微下之雖不敢大下亦不可緩也臨病應變之術妙自神會非俗工之所知良醫之所自得六經同法惟少陰傳變與太陽相同如通脈四逆湯四逆散眞武湯證俱有加減法謂有或爲之證亦猶太陽小青龍小柴胡之類

是也少人知斯妙也

少陰經治法有汗下吐溫和解灸刺

汗　麻黃附子細辛湯　麻黃附子甘草湯

下　大承氣湯　抵當湯

吐　瓜蔕散

溫　四逆湯　桂枝芍藥湯　附子湯

桃花湯　吳茱萸湯　白通湯

白通加猪膽汁湯　真武湯

通脉四逆湯

和解　桂枝甘草龍骨牡蠣湯　黃連阿膠湯

猪膚湯　甘草湯　桔梗湯　苦酒湯

半夏散　猪苓湯　四逆散

灸　灸少陰

經云尺寸俱沉者少陰受病也以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴　少陰之為病脉微細但欲寐也　少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也　病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利　少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之[illegible]

少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗[illegible]　少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可下之[illegible]　少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也少陰初得病二三日常見少陰證以邪未深故須汗以無陽證故微發之而已

麻黃附子甘草湯方

麻黃去節　甘草炙各二兩　附子壹枚炮去皮破捌片

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫寒氣

少陰病脉沉不知何沉也且沉緊發汗則動經細沉數為病在裏不可發汗詳此脉或沉而喘或沉而微不甚小是表中寒而裏不消脉應裏而發熱在表故以小辛之藥溫散而微微取汗也

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之（背者胸中之府諸陽受氣於胸中而轉行於背內經曰人身之陰陽者背為陽腹為陰陽氣不足陰寒氣盛則背為之惡寒若風寒在表而惡寒者則一身盡寒矣但背惡寒者陰寒氣盛可知如此條是也又或乘陰氣不足陽氣內陷入陰中表陽新虛有背微惡寒者經所謂傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之是也[illegible]以明之[illegible]少陰病[illegible]口中和[illegible]太陽[illegible]故於[illegible]當於[illegible]口[illegible]詳之）

附子湯方

附子（二枚去皮破八片） 白朮（四兩） 茯苓

芍藥（各三兩） 人參（二兩）

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之（方見不得臥）

少陰病六七日腹脹不大便者急下之大承氣湯

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

四逆散方

甘草（炙） 枳實（破水漬炙乾） 柴胡 芍藥（各等分）

右四味各十分擣篩白飲和服方寸匕日三服 欬者加五味子乾薑各五分并主下利 悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一枚炮令坼 泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升半分溫再服

少陰病手足逆冷其人若下利後重者此條四逆散加薤白湯若下利脈絕及無脈者通脈四逆湯白通加豬膽汁湯（方見下利） 若身體骨節痛脈沉者宜附子湯

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯（方見下利） 少陰病身體

痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之 少陰病脈沉發熱者宜麻黃附子細辛湯 少陰病欲解時從子至寅上 少陰病惡寒而踡時自煩欲去衣被者可治

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死 少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈 少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

少陰病六七日息高者死 少陰病脈緊至七八日自利脈緊變暴微厥手足反溫者欲解也（論見下利） 少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也 少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或

從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治　少陰病四
逆惡寒而身踡脉不至不煩而躁者死　少陰病惡寒
身踡而利手足逆冷者不可治
［欬］若兀兀欲吐心煩喜寐或自利口燥而渴或口中
和而背惡寒此屬少陰經但少陰用藥有陰陽之分
自利而渴者宜猪苓湯蓋陽熱傳入腎少陰經腎係
舌本故自利口燥而渴以猪苓湯利腎中之熱不愈
則當自大便去之古法合用大承氣湯若難用大承
氣湯則用小承氣湯或且進白頭翁湯上項諸藥為
陰中涵陽者也　泄利下重其人四逆先以水盞半

葱白二根煎一盞去葱煎四逆散至七分咳加北五
味子乾薑各半錢悸加桂枝一錢小便不利加茯苓
一錢腹痛加熟附半錢　若審是下利清穀手足四
逆其人面戴赤或腹痛或乾嘔或咽痛四逆湯倍乾
薑面赤者加葱一根腹痛加芍藥一錢半嘔加生薑
咽痛加桔梗一錢　若口中和而背惡寒宜正方四
逆湯不必加減四逆散四逆湯俱治少陰下利四肢
逆冷泄利下重者與下利清穀者一凉一溫又自有
陰有陽之別　若初得病便見少陰證其人發熱惡
寒身疼頭不痛者宜麻黃細辛附子湯微汗之或五

積散加熟附半錢或五積散加以順元散

但欲寐嗜臥

衛氣寤則行陽寐則行陰而寐也必從足少陰始故少陰之為病脈微細但欲寐　太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也胸滿脇痛者小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯 [illegible]

口燥咽乾但欲寐 [illegible]　欲吐不吐但欲寐 [illegible]　吐利但欲寐 [illegible]　下利但欲寐 [illegible]　脈浮汗出多眠若身重息鼾者風溫 [illegible]　若合目則盜汗出此三陽合病 [illegible]

狐惑病默默欲眠目不得閉不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白其聲嗄者甘草瀉心湯咽乾者苦參湯　其肛虫蝕雄黃薰之其脈數無熱目赤皆黑者當歸赤小豆散 詳狐惑

口燥咽乾 已附見口苦咽乾條內

咽痛

太陽陽明咽痛各一證悉爲熱也太陽治以半夏散陽明治以四逆散加桔梗少陰咽痛有六證熱證者四寒證者二熱者治以猪膚湯甘草湯桔梗湯苦酒湯半夏散寒者治以桂枝乾薑湯真武湯四逆湯厥陰咽痛一法亦熱也治以桔梗湯咽痛皆熱證何獨少陰二證寒耶其一以汗多亡陽故用乾薑附子以復陽溫經逆其一以陰盛格陽故用通脉四逆以散陰通陽也

太陽病下之脈緊者必咽喉痛半夏湯

半夏散及湯方

半夏製　桂枝　甘草炙 各等分

右㕮咀水煎服少少咽之爲散白湯調服方寸匕亦效日三服 仲景湯爲散調服不㕮咀

成 甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛 詳欬

少陰厥陰少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不瘥者與桔梗湯 陽邪傳於少陰爲咽痛服甘草湯則差若寒熱相搏爲咽痛者服甘草湯不差與桔梗湯

以和少陰之氣

甘草湯方　甘草貳兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日二服

桔梗湯方　桔梗壹兩　甘草貳兩

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

桔梗味辛温以散寒甘草味甘平以除熱甘梗相合以調寒熱

少陰病咽中痛半夏散及湯主之　少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

苦酒湯方

半夏洗破如棗核大十四枚　雞子一枚去黄内上苦酒著雞子殼中

傷寒咽痛[illegible]之劑　[illegible]

右二味内半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

按苦酒本草注曰醯也而成氏復云苦酒之酸子則以爲名義俱乖安知酒之味苦者不可以已咽瘡耶若醯酒之性熱則下半夏湯更辛況此味苦哉下文緊字與歛字自相反

脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利　傷寒先厥後熱者下利必自止止而反汗出者其喉爲痺

厥而利發熱則利必止反汗出者亡陽也咽中痛熱上衝也亡陽則陰獨會于嚥則陰陽結而爲喉痺也內經曰一陰一陽結爲喉痺○痺下利

咽痛下利無胸痛者猪膚湯　手足厥冷脈微欲絕不惡寒面赤者通脈四逆湯　下後復厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯並見下利

陽毒咽痛面赤斑斑如錦紋唾膿血五日可治七日不可治宜升麻鱉甲湯活人云陽毒升麻湯方主之論見陽毒條下

陰毒咽痛面目青身痛如被杖五日可治七日不可治升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯活人云陰毒甘草湯方主之論見陰毒條下

禁忌咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得踡卧不能自溫　咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下卧則欲踡身急頭眩下利日數十行

張或云六經傷寒皆不言咽痛惟少陰篇中有咽痛咽傷之證何也夫少陰咽痛乃經絡所繫盖少陰之脈上貫肝膈入肺循喉嚨繫舌本故有咽傷痛之患

傷寒咽痛[illegible]之劑　[illegible]

内經曰所生病者咽腫上氣嗌乾及痛此經脈所繫邪氣循行而致然也

○附

活半夏桂枝甘草湯治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈更微弱先發咽痛似傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂枝甘草湯主之此病只二日便瘥古方謂之腎傷寒也次用四逆主之

半夏桂枝甘草湯

半夏湯洗　甘草炙　桂心各等分

右㕮咀每服四錢水煎候冷少少細呷之
趙活人書近來見四樣印本皆是四逆散然四逆散不主咽痛恐刊者之誤不能無疑仲景論云四逆散治少陰病傳邪作熱四肢逆而不溫者今此證蓋是伏寒於少陰經而脉微弱法當溫散既先用半夏桂甘湯溫劑何復用柴胡寒劑攙之此必是四逆湯也何况通脉四逆湯方後有咽痛加桔梗之例用此又何疑焉

吳凡咽痛有陰陽二毒凡陽毒咽喉腫痛乃熱極也陰毒咽喉不利乃冷極也陽毒脉浮數而大咽痛吐膿血千金外臺用烏扇膏治之活人用黑奴丸又陽氣獨勝狂躁咽痛脉洪實滑促活人用葶藶苦酒湯治傷寒咽痛用生甘草濃煎湯與之　水浸山豆根苦水含之或用鶴虱草擣汁入米醋漱喉中亦妙

劉咽痛有瘡黃蘗細辛末吹之　凡傷寒腮頰紅腫并咽喉腫痛者刺少商委中出血少商穴在手大指端内側去爪甲角如韭葉以三稜針刺血出愈

戴亦有初得病頭痛發熱無陽毒少陰諸證而咽喉自痛者此因感冒後頓用厚衣被堆壅或用蠻法服生薑熱酒即卧遂成上壅或先有壅熱欲取凉快致

爲外邪所襲既有風寒又有熱壅宜參蘇飲倍桔梗加木香半錢或消風百解散或敗毒散或五積散敗毒散各半貼名交加散

吐 吐證已見□□內□吐亦附此□□內宜參考

腹滿時痛而吐者太陰病宜理中湯主之

少陰病飲食入口則吐心中嗢嗢欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯方見傷寒

[illegible]

少陰病但欲臥不煩而吐五日變自利煩躁不得寐者死

乾嘔吐涎沫頭痛者宜吳茱萸湯

吳茱萸湯 治吐利手足厥冷煩躁欲死

吳茱萸湯泡洗 生薑各壹兩半 人參柒錢半

大棗叁枚

右㕮咀水煎去滓分二服

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

發熱渴欲飲水水入則吐者宜五苓散

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下脈經作更遂吐食入即出若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之按本自寒下恐是本自吐下玩復字可見蓋胃寒則吐下寒則利胃寒者不宜吐醫反吐之則傷胃氣遂成寒格下文氣不

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑 黃連 黃芩 人參各叁錢

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

[illegible]

太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數欲食冷食朝食暮吐此為小逆

病人脈數為熱當消穀引食而反吐者此因發汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛冷故也 凡服桂枝湯而吐者必吐膿血也

服桂枝湯則吐如酒客之類是也 吐厥逆者甘草乾薑湯

○附

活吐有冷熱二證寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在胃脘五苓散主之 寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生薑主之

陰證喘促及吐逆者返陰丹入口便住

大橘皮湯 治動氣在下不可發汗發又無汗心煩骨節疼痛目暈惡寒食則反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後宜服建中湯

橘皮壹兩半 生薑壹兩 棗子拾枚

甘草炙半兩 人參二錢 竹茹半升

右水三大盞煮取一盞分二服

病人直患嘔吐而脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之方見雜病脚氣門

吐利

腹滿時痛吐利不渴者太陰病[illegible] 病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利注見汗論 少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者呉茱萸湯主之 少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯[illegible] 少陰病吐利煩躁四逆者死 少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之論見下利 少陰病腹痛小便不利四肢重痛自下利或嘔者真武去附子加生薑湯論見下利 少陰病下利脉微濇嘔而汗出者當温其上灸之論見欲寒當温其上謂下有寒氣當温其上以助陽氣也

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀内寒外熱脉微欲絶者四逆湯主之王叔和入霍亂篇

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黄芩加半夏生薑湯論見合病 發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐下利者宜大柴胡湯論見痞 發汗後水漿不得入口者爲逆 若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂 病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下又利止復更發熱也 霍亂頭疼發熱身疼痛熱多飲

水者五苓散主之　寒多不飲水者宜理中湯
理中湯方
人參　乾薑炮　甘草炙各三兩　白朮去蘆兩
右剉每服四錢水煎去滓溫服如寒甚者加乾薑一兩半　湯欲得水者加白朮一兩半　臍上築者腎氣動也去白朮加桂枝二兩　吐多者去白朮加生薑四兩　下利多者倍用白朮　悸者加茯苓二兩　腹滿者去白朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許自溫勿發揭衣被吉人云或四肢拘急或轉筋者亦去朮加附子

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之
吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯
惡寒脈微利止者四逆加人參湯方論見惡寒
吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆湯加猪膽汁主之
甘草炙二兩　乾薑參兩　附子大者壹枚去皮破八片
猪膽汁半合
右三味㕮咀水三盞煎至一盞去滓納猪膽汁分作二次溫服其脈即來
吐利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也　乾嘔而利兼腸痛而表解者宜十棗湯心下痞鞕而煩者宜甘草瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯詳見霍亂門
診脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解
霍亂證治已詳雜病茲不贅

下利

（成）自利者，不因攻下而自泄瀉也。有表邪傳裏，裏虛協熱而利者；有不因攻下而下之，遂利者，是皆協熱也。又三陽合病皆作自利，有發表、攻裏、和解之不同。（太陽陽明合病為在表，故與葛根湯以汗之；太陽少陽合病為在半表半裏，故與黃芩湯以和解之；陽明少陽合病為少陽邪氣入裏，故與承氣湯下之。）且自利不渴者，屬太陰，藏寒故也。下利欲飲水者，有熱故也。故大便溏，小便自可，與夫發熱後重，泄色黃赤者，皆為熱也。自利，小便色白，少陰病形悉具，與夫惡寒脈微，自利清穀者，皆有寒也。夫自利固多可溫，然腸胃有積結與下焦客邪，又非溫劑所能止，必也或分利之，或攻泄之，乃可也。（經曰：理中者，理中焦，此利在下焦，宜赤石脂禹餘粮湯。不差，當利其小便，是也。與夫下利三部皆平，按之心下硬，或脈沉而滑，或不欲食而譫語，或差後至年月復發，此皆腸胃有積結而須攻泄者也，此則謂之通因通用。）又下利雖有表證，不可發汗，以下利為邪氣內攻，走津液而胃虛也。經曰：下利不可攻表，汗出必脹滿，是也。蓋三陰自利居多，然自利家身涼脈靜為順，身熱脈大為逆。大抵下利脫氣，又為難治，蓋邪盛正虛，邪壅正氣下脫，多下利而死。（經曰：少陰病自利，復煩躁不得臥寐者死；直視譫語下利者死；下利日十餘行，脈反實者死；下利，手足厥冷，無脈，灸之不溫，脈不還者死；發熱下利至甚，厥不止者死。此數者，皆邪氣壅正氣下脫故死。）要略曰：六府氣絕于外，手足寒；五藏氣絕于內，利下不禁。噫，疾成而後藥，雖神醫莫能為，氣已脫矣，孰能為之。六經俱有下利之病，表裏寒熱治各不同，學者宜審。

（汗）太陽傷寒，表不解，心下有水氣，乾嘔發熱而欬，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹滿，或喘者，小青龍湯。（和解）

太陽與陽明合病，必自下利，葛根湯。（[illegible]傷寒有合病有併病，本太陽病不解，併於陽明者，謂之併病；二經俱受邪，相合病者，謂之合病。[illegible]邪氣其[illegible]太陽陽明合病[illegible]陽明少陽合病[illegible]必[illegible]裏[illegible]實[illegible]二陽[illegible]以[illegible]也。）

太陽病外證未除而數下之，遂協熱而利，利不止，心下痞硬，表裏不解者，桂枝人參湯。（張氏云：仲景論中太陽病桂枝證，醫反下之，利遂不止，與葛根黃連黃芩湯；上條又與桂枝人參湯，且二證俱係表不解而下之，成利者，何故用藥有溫涼之異？夫二證俱係內虛熱入，協熱遂利，但脈證不同，故用藥有殊耳。經言：脈促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黃連黃芩湯注之。夫脈促為陽盛，喘而汗出為裏熱，其陽盛裏熱與葛根黃連黃芩者，理所宜也。）

太陽與少陽合病，自下利者，與黃芩湯；若嘔者，黃芩加半夏生薑湯。（下利而頭疼，胸滿，或口苦咽乾，或往來寒熱，其脈或大而弦，是也。）

黃芩湯方

黃芩（參兩）　芍藥　甘草（各貳兩）　大棗（拾貳枚，擘）

右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日再夜一服。

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯內加半夏半升洗生薑叁兩切

太陽少陽并病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩[illegible] 太陽病桂枝證反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤 甘草炙 黃芩各貳兩 黃連叁兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

內經曰甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

太陽病下之脈促不結胸者為欲解脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血黃芩湯 太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也黃芩湯 傷寒中風反下之利遂不止穀不化腹中雷鳴心下鞕滿乾嘔心煩不安醫見其痞復下之痞益甚此非結熱以胃中空虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯 傷寒汗解後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯 太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯 傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯 傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯 太陽病二日反躁反熨其背而大汗出大熱入胃水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者為欲解也 傷寒醫下之續得下利清穀不止身痛者急當救裏四逆湯身痛清便自調者急當救表桂枝湯成傷寒下之續得下利清穀不止身痛急當救裏以裏氣不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼者表邪也內經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本此以寒為本也

四逆湯方

甘草炙貳兩 乾薑壹兩半 附子壹枚去皮破捌片

一用附子去皮臍先滷鹽水搗汁各半盞用砂礶煮七沸後入甘草黃連各半兩再加童便半盞再煮七沸任火良久撈起入瓷器盛貯受地氣一晝夜取出晒乾以備後用無毒害頂圓臍正一兩一枚者佳

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩

成四肢者諸陽之本陽氣不足陰寒加之陽氣不相順接是致手足不溫而成四逆此湯中發陽氣走散陰寒溫經暖肌故以四逆名也內經曰寒淫於內治以甘熱却陰扶陽必以甘為主是以甘草為君內經曰寒淫所勝平以辛熱逐寒正氣必先辛熱是以乾薑為臣內經曰辛以潤之開發腠理致津液通氣也

煖肌溫經必憑大熱是以附子為使此奇制之大劑也四逆屬少陰少陰者腎也腎肝位遠非大劑不能達內經曰遠而奇偶制大其服此之謂也

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心已復以他藥下之利不止治以理中利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯復利不止當利小便或用豬苓湯

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂壹斤碎 禹餘糧壹斤碎

已上二味以水六升煮取二升去滓分三服

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡潮熱已而微利此本柴胡證下之不利今反利者誤以丸藥下之也潮熱者實也先宜柴胡以解外後以柴胡加芒硝 太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者調胃承氣湯

陽明病潮熱大便溏小便自可胸脇滿者小柴胡湯

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下下之脈數不解而下利不止必便膿血也表裏共二十湯實與虛實易 陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯黑

陽明土少陽木二經合病氣不相和則必下利少陽脈不勝陽明不負是不相尅為順也若少陽脈勝陽明脈負

者是鬼賊相尅為正氣失也脈經曰脈滑者為病食也又曰滑數則胃氣實下利者脈當微厥今反滑數知胃有宿食與大承氣湯以下除之

臟結如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊舌上白胎滑者難治

太陰 太陰為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕 自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜服四逆輩戒經言輩字者謂藥性同類惟輕重優劣不同耳凡

太陰自利不渴師言有用理中而愈者甚則理中加附子而獲安者凡言輩者蓋如此夫四逆湯甘辛相合乃大熱之劑苟輕用之恐有過度之失所以仲景不為定擬也真若以理中循循而用之至為平穩如不得已者四逆方可為用也

太陰為病脈弱其人續自便利設當行芍藥大黃者宜減之以其人胃氣弱易動故也戒腹滿者太陰病

也脉弱其人續自便利設雖在裏未成大實欲用大黄芍藥攻除裏滿者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰當發身黄若小便自利者不發黄至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也[illegible]

少陰病欲吐不吐但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虚故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虚有寒不能制水故令色白也[illegible]

[illegible]

傷寒下利　卷之四

又曰下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯

猪膚湯方

猪膚壹斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

少陰病四逆或泄利下重者四逆散方見前條

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯方見渴

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

孫賓大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢實氏親故相謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不決之疾投不明之醫乎召孫至曰明日不可下明日正當下投小承氣湯遂大便通得睡明日平復衆皆曰此證緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰證乎少陰證固不可下豈不知少陰一證自利清水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服

傷寒下利　卷之四

少陰病下利惡寒而踡手足溫者可治四逆湯

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之詳腹痛

桃花湯方

赤石脂壹斤一半全用一半篩末　乾薑壹兩

粳米壹升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合内赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

澀可去脫赤石脂之澀以固腸胃辛以散之乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼

痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯主之詳腹痛

真武湯方

茯苓叁兩　生薑切　芍藥各叁兩

白术貳兩　附子壹枚炮去皮破捌片

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服脾惡濕甘先入脾茯苓白术之甘以益脾逐水寒淫所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平附子芍藥生薑之酸辛以溫經散濕

加減法　若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩氣逆咳者五味子之酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛乾薑之辛以散水寒　若小便利

者去茯苓小便利無失水故去茯苓　若下利去芍藥加乾薑二兩芍藥之酸泄氣乾薑之辛散寒　若嘔者去附子加生薑足前成半斤氣逆則嘔附子補氣生薑散氣千金曰嘔家多服生薑此為嘔家聖藥

成真武北方水神也水氣在心下外帶表而屬陽必應發散故治以真武湯青龍湯主太陽病真武湯主少陰病少陰腎水也此湯可以和之脾惡濕腹有水氣則脾不治脾欲緩急食甘以緩之滲水緩脾以甘為主故以茯苓甘平為君白术甘溫為臣內經曰濕淫所勝佐以酸辛除濕正氣是用芍藥酸寒生薑辛溫為佐也內經曰寒淫所勝平以辛熱溫經散濕是以附子辛熱為使也水氣內漬散行不一故有加減之方焉欬者水寒射肺也肺氣逆者以酸收之五味子酸而收也肺惡寒以辛潤之細辛乾薑辛而潤也若小便利者去茯苓茯苓專滲泄也小便不利者去芍藥以酸澀也加乾薑以散寒也氣上逆則嘔附子補氣故去之生薑散氣故加之則氣順嘔止矣

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之

通脉四逆湯方此方與四逆湯[illegible]乾薑耳

甘草炙貳兩　附子大者壹枚生用去皮破捌片

乾薑叁兩強人可肆兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脉即出者愈

面色赤者加葱九莖葱味辛以通陽氣　腹中痛者去葱加芍藥二兩芍藥之酸通寒利腹中痛為氣不通也　嘔者加生薑二兩辛以散之嘔為氣不散也　咽痛者去芍藥加桔梗一兩咽中如結加桔梗則能散之　利止脉不出者去桔梗加人參二兩利止脉不出者亡血也加人參以補之經曰脉微而利亡血也四逆加人參主之脉病皆與方相應者乃可服之

少陰病下利白通湯主之少陰主水少陰客寒不能制水故自利也白通湯溫裏散

案 少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生少陰病下利脈微為寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者寒氣太甚內為格拒陽氣逆亂也與白通湯加猪膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰逆者正治從者反治此之謂也服湯脈暴出者正氣因發泄而脫也故死脈微續者陽氣漸復也故生

白通湯方

葱白 肆莖　乾薑 壹兩　附子 壹枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

內經曰腎苦燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣薑附之辛以散陰寒

白通加猪膽汁湯方

葱白 肆莖　乾薑 壹兩　附子 壹枚生去皮破八片

人尿 伍合　猪膽汁 壹合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服如無猪膽亦可用

內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益此和人尿猪膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從則可以去格拒之寒也

張或問白通湯及白通加猪膽湯真武湯與通脈四逆湯皆為少陰下利而設除用薑附相同其餘之藥俱各殊異何也蓋病殊則藥異夫少陰下利寒氣已甚非薑附則不能治然下利之理無殊而兼有之證不一用藥故不同耳亦各從其宜也如白通湯用薑附以散寒止利加葱白以通調陽氣若利而乾嘔煩者寒氣太甚內為格拒薑附非煩者之所宜薑附必嘔而不納加人尿猪膽汁於白通湯中候溫冷而服之人尿猪膽汁皆鹹苦性寒之物是以納而不阻至其所則冷體既消熱性便發真武湯治少陰病二三日不已至四五日腹滿小便不利四肢沉重疼痛自下利者為有水氣故多或為之證夫水氣者則寒濕也腎主之腎病不能制水水飲停蓄為水氣腹痛寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自

下利者濕甚而水穀不能別也經曰脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾逐水寒濕所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸辛附子芍藥生薑之酸辛以溫經散濕太陽篇中小青龍湯證亦為有水氣故多或為之證如真武湯者不殊此理也通脈四逆治少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕者為裏寒身熱惡寒而面色赤為外熱此陰甚于內格陽于外不相通與通脈四逆湯以散陰通陽其或為之證依法加減而治之已上四證俱云下利而兼有或為之證不一是以用藥大同而小異也　又曰或云白通湯

用附子凡四證惟真武湯一證熟用餘皆生用何也凡附子生用則溫經散寒非乾薑佐之則不可炮熟則益陽除濕用生薑相輔以為宜矣乾薑辛熱故佐生附為用生薑辛溫少資熟附之功原佐使之玄無出此理然白通等湯以下利為重其真武湯證以寒濕為先故用藥有輕重之殊耳蓋寒濕風濕大體頗同如太陽下篇桂枝附子湯治寒濕相搏附子亦用炮熟仍用生薑以佐之其生熟之用輕重之分無過此理也

少陰病欬而下利讝語者被火氣劫故也小便必難以

強責少陰汗也（成曰欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰汗者津液內竭加火氣煩之故讝語小便難也）

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病下利脈微澀嘔而汗出必數更衣反少者當其上灸之

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者為欲解也雖煩下利必自愈

少陰病脈微沉細欲臥汗出而煩欲吐自下利復煩燥不得寐者死

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死（[illegible]此合是少陽胃[illegible]汗[illegible]然出脈句小弱者生少陰氣竭冒之證）

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治

厥陰傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發癰膿也

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺

下利寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血（[illegible]）

熱利下重者白頭翁湯主之（[illegible]）

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之（[illegible]）

白頭翁湯方

白頭翁（二兩）　黃蘗　秦皮　黃連（各三兩）

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服一升（內經曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之）

下利脈數有微熱汗出今自愈設復緊為未解（[illegible]）

下利脈數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也（黃連湯）　下利脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死（沉為在裏弦為拘急裏氣不足是主下重大則病進此利未止脈微弱數者邪氣微而陽氣復為欲自止雖發熱止由陽勝非大逆也[illegible]白頭翁[illegible]黃芩黃連湯）　傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之（[illegible]傷寒六七日邪傳厥陰之時大下之後下焦氣虛陽氣內陷寸脈遲而手足厥逆下部脈不至厥陰之脈貫膈上注肺循喉嚨在厥陰隨經射肺因亡津液遂成肺痿咽喉不利而唾膿血也金匱要略曰肺痿之病從何得之被快藥下利重亡津液故得之若泄利不止者為裏氣太虛故云難治與麻黃升麻湯以調肝肺之氣）

麻黃升麻湯方

麻黃（去節貳兩半）　升麻　當歸（各壹兩貳錢半）

知母　黃芩　萎蕤（各拾捌銖）

石膏（碎綿裹）　白朮　乾薑

芍藥　天門冬（去心）　桂枝

茯苓　甘草（炙各六銖）

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫内諸藥煮取三升去滓分温三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈（玉函曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛者以辛潤之當歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩之苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮之甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥之酸以斂逆氣萎蕤門冬石膏甘草之甘潤肺除熱）

厥陰病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐蚘下之利不止（詳厥陰病）　傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也（詳腹痛）　脈浮而遲表熱裏寒下利清穀四逆湯　大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯　大汗若大下利而厥冷者四逆湯　下利清穀不可攻表汗出必脹滿四逆湯　傷寒下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯　傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利四逆湯　下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥下虛故也四逆湯　下利後脈絕手足厥冷晬時（周時也）脈還手足溫者生脈不還者死（或白通湯通脈四逆湯）　下利後更煩按之心下濡者虛煩也梔子豉湯　下利譫語有燥屎也宜小承氣湯　下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死　少陰負趺陽者為順也（少陰腎水趺陽脾土下利為腎邪干脾水不勝土則為微邪故為順也）　下利有微熱而渴脈弱者今自愈　傷寒發熱下利厥逆躁不得卧者死　傷寒發熱下利至甚厥不止者死（金匱要略曰六府氣絕於外者手足寒五藏氣絕於內者利下不禁）　傷寒六七日

不利復發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也傷寒六七日為邪正相爭之時正勝則生邪勝則死始不下利而暴忽發熱下利汗出不止者邪氣勝正陽氣脫也故死　傷寒下利日十餘行脈反實者死下利者裏虛也脈當微弱反實者邪氣勝也故死難經曰脈不應病病不應脈是為死病　發熱而厥七日下利者為難治發熱而厥邪傳裏也至七日傳經盡則正氣勝邪當汗出而解反下利則邪氣勝裏氣虛故為難治

〔截〕自利須辨陰陽三陽自利各已本經見之太陽與陽明合病下利頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾宜葛根湯太陽與少陽合病下利身熱胸脇痞滿而嘔或往來寒熱目疼鼻乾宜大柴胡湯　大抵陽熱之利與陰

寒之利自不同陽利糞色必焦黃熱臭出作聲臍下必熱得涼藥則止得熱藥愈增陰利必洞下清穀糞色或白或淡黃臍下多寒宜溫中止瀉之劑此陰利陽利指陰陽二氣而言非曰陰陽二經也緣陰中亦自有陽利不可因下利便以為陰也　又有內不大滿猶生寒熱未可下而便下之內虛熱入挾熱自利臍下必熱大便赤黃色及下腸間津汁垢膩名曰利腸宜白頭翁湯黃芩湯　要知均為自利身不熱手足自溫者太陰身體四逆者少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽經然陰利有反發熱或初病無熱利後却熱或初得病即身熱繼而自利此陰非陽傳陰經之利詳見前段發熱證　又有大便五六日以藥利之利遂不止用極熱劑方瘥陽有利陽有祕當更以他證別之　外熱內煩下利上渴或痞或痛或嘔常法多用黃芩湯半夏瀉心湯亦可不若生薑瀉心湯之當或溫膽湯加入黃連其中枳殼去取在人

〔要〕凡自利者不因攻下而自瀉利俗言漏底傷寒是也有協熱有協寒俱宜詳辨原病式曰瀉白為寒青黃紅黑皆為熱也大抵瀉利完穀不化色不變有如鶩溏或吐利腥臭小便澄澈清冷口無燥渴其脈或

沉細或遲微無力或身雖熱手足逆冷惡寒踡臥此皆為寒也凡熱證則口中燥渴小便或黃赤或澀而不利或所下如垢膩之狀其脈多數或浮或滑或弦或大或洪或有邪熱不殺穀其物不消化者當以脈證別之凡胃虛內熱煩渴瀉利脈弱者七味人參白术散若發熱者參胡三白湯去黃芩加炒黃連若腹滿小便不利者五苓散合理中湯若嘔者加藿香半夏生薑陳皮如濕多而瀉不止者加蒼术白术如腹脹者加厚朴腹疼不止加炒白芍肉桂木香溫之凡傷寒作利脈浮表未解者仲景以小青龍湯去麻黃

加蕘花二錢炒令赤色蓋散表邪兼治水也若小便不利大便水瀉不止者宜五苓散水甚不解亦加蕘花一錢以行水水行利自止也凡下利不可發汗當先治利止內實正氣得復邪氣得解則汗出而愈也蓋利下由內虛若加發汗則內外皆虛變證爲難治也

（附）

活寒毒入胃者臍下必寒腹脹滿大便黃白或青黑或下利清穀宜四逆湯理中湯白通加附子湯四逆加薤白散挾熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津液垢膩宜黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂丸

三黃熟艾湯治傷寒四日而大下熱利時作白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩 黃連 黃蘗 熟艾半雞子大

右㕮咀水煎溫服

薤白湯治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱悉皆主之

豆豉半合綿裹 薤白壹握 山梔柒枚

右㕮咀用水二升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升下豉煎取一升二合溫服

赤石脂丸治傷寒熱利

赤石脂 乾薑各壹兩 黃連 當歸各貳兩

爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸米飲下日三服

濕毒氣盛者下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜桃花湯地榆散黃連阿膠湯

地榆散治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便利膿血

地榆 犀角屑 黃連 葛根各半兩

梔子 黃芩

右㕮咀每服五錢水一盞入薤白五寸同煎溫服

（海藏）黃連阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連炒二兩 山梔半兩 阿膠炒 黃蘗各壹兩

右㕮咀每服四錢水煎服

（雲岐）傷寒汗下後大小便利者腹中痛者宜縶腸丸

附子壹枚炮 龍骨半兩 乾薑壹兩 吳茱萸

粟殼 訶黎皮各半兩

爲細末酒糊丸桐子大每服三十丸溫水下利止勿服

傷寒汗下後裏急後重下利者宜七宣丸

大黃壹兩 木香 檳榔 柴胡

訶子皮 甘草各半兩 桃仁叁拾枚去皮尖

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸溫水下

傷寒汗下後氣逆利不止者寒也宜枳實芍藥甘草湯

芍藥　甘草　枳實炒　乾薑炮各半兩

右㕮咀每服五錢水煎服

厥陰病　氣上衝心　饑不欲食　吐蚘蟲　厥

少腹滿　囊縮

厥陰之為病煩滿囊縮其脉尺寸俱微緩若微浮為欲解不浮為未愈宜小建中湯脉浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧為欲愈宜桂枝麻黄各半湯若尺寸脉俱沉短者必是囊縮毒氣入藏宜承氣湯下之　大抵傷寒病藏府傳變陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣尅於脾土脾再受賊邪則五藏六府皆困而危殆榮衛不通耳聾囊縮

不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五藏危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脉得微緩微浮為脾胃脉也故知脾氣全不再受尅邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

厥陰經治法有汗下吐温和解灸

汗　麻黄升麻湯　桂枝湯　桂枝茯苓白术湯

下　小承氣湯　三黄瀉心湯

吐　瓜蒂散　梔子豉湯

溫　烏梅丸　眞武湯　當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯　吳茱萸湯

附子乾薑湯　理中湯　通脉四逆湯

和解　甘桔湯　白虎湯

乾薑黃連黃芩人參湯　白頭翁湯

小柴胡湯

灸　厥陰　脉促灸　下利厥灸

内經曰尺寸俱微緩者厥陰受病也其脉循陰器絡于肝故煩滿而囊縮 [illegible] 厥

陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食即吐蚘下之利不止〔㾜〕邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太陰則腹滿而嗌乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也至厥陰成消渴者熱甚能消水故也飲水多而小便少者謂之消渴大抵熱生於火火生於木肝氣通心厥陰客熱氣上衝心心中疼熱傷寒六七日厥陰受病之時爲傳經盡則當入府胃虛客熱饑不欲食蚘在胃中無食則動聞食臭而出[illegible]食則吐蚘此熱在厥陰經也若便下之虛其胃氣厥陰[illegible]必下利不止○[illegible]桂枝附朮茯苓湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

芍藥　茯苓　白朮各貳錢　甘草壹錢

水一盞半生薑三片棗二枚煎至八分去滓服

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈　厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈　厥陰病欲解時從丑至卯上[illegible]

[illegible]

〔識〕下利清穀者陰中之陰宜進通脉四逆湯或當歸四逆湯加生薑茱萸舌卷囊縮不特陰中之陰有之陽明之熱陷入厥陰亦有之蓋陽明主宗筋宗筋爲熱毒風所攻故弗榮而急引舌與睾丸故舌卷囊縮當瀉陽以救陰宜大承氣湯陽傳太陰而利故用小建中湯及小柴胡湯去黃芩加芍藥此一藥治太陰泄利腸鳴而痛已利而獨爲虛虛則腸鳴蓋爲傳陰之陽氣漸微不敢過用冷劑但以芍藥通壅滯

氣上衝心

成氣上衝者腹裏氣時時上衝也此汗吐下後之疾雖經下之邪猶在表故也痞病氣上衝咽喉亦由誤汗吐下而生又有病如桂枝證胸中痞氣上衝咽喉不得息瓜蔕散盖未經汗吐下作膈實故宜吐也厥陰氣上撞心易病氣上衝尤宜消息按條而施治焉

氣撞心疼吐蚘者厥陰本病也如氣上衝不吐蚘者為陽證若衝咽不得息者瓜蔕散吐之往來寒熱者奔豚陰拘攣者陰陽易卒口噤者剛痓與汗吐下之後各有證治方法學者詳之　厥陰本病方論已見前條

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜

瓜蔕散

瓜蔕（炒黄）　赤小豆（各壹分）

右研為細末取一錢用豉一合湯七合先漬之須臾煎成稀糜去查取汁相和温頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與服

活瓜蔕散每服一錢匕藥下便卧欲吐且忍之良久不吐取三錢匕湯二合和服以手指探之便吐不吐復稍增之以吐為度若吐少病不除明日如前法再吐之不可令人虛也如藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可食無復服若服藥過多者飲水解之

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

陰陽易少腹裏急引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花者宜燒裩散

氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓者宜葛根湯

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核各一壯與

桂枝加桂湯

桂枝　芍藥　生薑（各叁兩）

甘草（貳兩）　大棗（拾貳枚）

右㕮咀每服五錢水煎温服（桂枝加桂以能泄奔豚氣也）

動氣發汗則氣上衝正在心端（詳見動氣）　太陽下後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胸頭眩脉沉緊若發汗則動經身為振揺者茯苓白术甘艸湯（方見振揺）　傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

〇附

活李根湯治氣上衝正在心端

半夏　當歸　芍藥
生薑　茯苓　桂枝
黄芩　甘草　甘李根白皮各等分
右㕮咀每服五錢水煎溫服

饑不欲食

饑不欲食食則吐蚘者厥陰病[illegible]　手足厥冷脉乍緊心煩饑不能食者邪在胸中宜瓜蔕散吐之[illegible]

太陽病吐發汗出發熱不惡寒關脉細數腹中饑口不能食朝食暮吐者此為小逆[illegible]　陽明病下後心中懊憹饑不欲食但頭汗出者宜梔子豉湯[illegible]

吐蚘蟲

氣上衝心疼饑不欲食吐蚘者厥陰病桂枝白朮茯苓湯理中安蚘散　蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩此為藏寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭

出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅圓主之蚘厥者其人手足冷而吐蚘也蚘已則靜不若藏厥者死陽氣絕也蚘厥雖厥而煩吐蚘暫安時也病人藏寒胃虛蚘動上鬲聞食臭出因而吐蚘舌燥口乾常欲冷飲浸口不欲嚥蚘上膈[illegible]　病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘[illegible]

烏梅圓方

烏梅參百箇　細辛　附子炮　桂枝去皮
人參　黄蘗各陸兩　當歸　蜀椒去汗各肆兩
乾薑拾兩　黄連壹斤
右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸

之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下圓如梧桐子大先食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷滑物臭食等

肺主氣肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之以苦堅之當歸桂枝細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒蚘得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安蚘

理中安蚘散 陶尚文秘方累用之效

人參三錢 白朮 白茯苓

乾薑各壹錢半 川椒去目 烏梅三枚

右作一服水二鍾煎七分服凡治蚘不可用甘草并甜物蓋蚘虫得甘則動於上得苦則安得酸則止得川椒之辛則頭伏于下也

凡吐蚘未止加黃連黃蘗各五分川椒十四粒若足冷甚者必加附子半錢或三錢量病輕重斟酌之

藏胃中冷必吐蚘吐蚘人皆知為陰也然亦有陽證吐蚘者蓋胃中空虛既無穀氣故蚘上而求食至咽而吐又看別證如何不可專以胃冷為說曾記一人陽黃吐蚘又大發斑陽毒證口瘡咽痛吐蚘皆以冷劑取效是亦有陽證矣

厥 四逆 尸厥附

四逆者四肢不溫厥者手足冷夫邪在三陽則手足熱傳到太陰則手足溫至少陰則逆而不溫至厥陰則為之厥甚于逆也蓋自熱至溫而四逆至厥者傳經之邪也四逆散主之始得之便厥是陰經受邪陽氣不足四逆湯主之

王仲景言四逆與厥者非一或曰四逆或曰厥或曰厥逆厥冷厥寒或曰手足逆冷手足厥逆手足厥冷手足厥逆冷俱是言寒冷耳故厥逆二字每每互言未嘗分逆為不溫厥為冷也既不曰溫則為冷矣尚何異乎然四肢與手足却有所分以四字加逆字之上者是通指手足臂脛以上言也以手足字加厥逆厥冷等上及無手足字者是獨指手足言也雖然厥逆俱為寒冷却有陰陽之殊熱極而成厥逆者陽極似陰也仲景以四逆散寒藥治之是也寒極而成厥逆者獨陰無陽也仲景雖無四逆湯熱藥治四逆之條但四逆湯之名由四肢之冷而立今以四逆湯治手足厥冷豈非逆厥之不異乎成氏既謂四逆為熱邪至少陰病死證二條下又謂四逆為寒甚不自悖其說乎是知四逆亦猶厥之有寒有熱但四肢通冷比之手足獨冷則有間耳故仲景曰

少陰病吐利煩躁四逆者死又曰少陰病四逆惡寒而踡脉不至不煩而躁者死又曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者呉茱萸湯此三條二為死一為可治雖通由諸證兼見而然然死者以四逆言可治者以厥冷言可見四逆重於厥冷矣成氏謂厥甚于逆豈不謬耶

按凡言四逆或言厥言逆者皆為重證若舉四肢而言耳言指頭寒言手足厥與逆與冷者皆為厥微蓋手之上為腕腕上為臂足之上為踝踝之上為脛也其病之輕重淺深皆寓于書法之中不可不審

自熱至溫自溫至厥乃傳經之邪四逆散主之厥逆大便秘小便赤或大便黑脉沉而滑此為陽證似陰白虎湯甚者大承氣湯不可誤也

傷寒脉 六 一條之四 八廿一

太陽傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之　太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也 眞武湯○方見下利○太陽此有二證皆因發汗所致汗多亡陽故溫之

甘草乾薑湯方

甘草炙肆兩　乾薑貳兩炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服 内經曰辛甘發散為陽甘草乾薑相合以復陽氣

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛　傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之　三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之　一

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者呉茱萸湯 方見吐

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯脉暴出者死微續者生　少陰

傷寒脉 八 一條之十四 八廿二

病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯 方見下利　少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散 方見少陰病 按此言四逆者四肢之省文也四肢者自指至肘足至膝是也其邪為深凡言手足者自指至腕足至踝而已其邪為淺仲景下字不苟得之則輕重淺深一覽了然矣○趙仲景三文但云少陰病四逆其人或欬或悸作四肢厥逆過實厥下利腹痛而裏而厥者曰逆散之京又用若直入陰經之寒邪不得發熱極而厥也是者以水漬水尤當戒之學者宜詳究焉

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治　少陰病吐利煩躁四逆者死　少陰病四逆惡寒而身踡脉不至

不煩而躁者死　少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治但厥無汗熱入裏而外無其汗也當[illegible]而強發其汗[illegible]不能出汗必內傷其[illegible]而妄行也諸厥者皆屬下但厥為下厥血亡於上為上竭

厥陰傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利四逆散之或云三陰經傷寒太陰[illegible]手足[illegible]下足[illegible]厥陰則手足厥[illegible]乃[illegible]也[illegible]故反有發熱之理[illegible]此陰陽相錯必然之理也[illegible]陽[illegible]者有發熱之[illegible]事之[illegible]安之常經[illegible]

傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也成云金匱要略曰水停心下甚者則悸微者短氣是以心下悸為水飲內甚先與茯苓甘草湯治其水而後治其厥若先治厥則水飲浸漬入胃必作下利

茯苓甘草湯方

茯苓　桂枝去皮各貳兩　生薑切叁兩

甘草炙壹兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服茯苓甘草之甘益津液而和衛桂枝生薑之辛助陽氣而解表

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利吐膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之方見下利　手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之成云手足厥寒者陽氣外虛不溫四末脉細欲絕者陰血內弱脉行不利與當歸四逆湯助陽生陰也

當歸四逆湯方

當歸　桂枝去皮　芍藥　細辛各叁兩

甘草炙　通草各貳兩　大棗貳拾伍枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服內經曰脉者血之府也諸血者皆屬於心通脉者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助心血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急急食甘以緩之大棗甘草通草之甘以緩陰血

下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也　下利後脉絕手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還者死　下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯　大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯　病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散方見上氣　傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤傷寒一二日至四五日傳經之邪前熱後厥者亦傳經之邪當以厥之微甚辨熱之淺深若厥熱入府而實者下之若反發汗則胃中津液愈竭熱而熱故必口傷爛赤然經云諸四逆者不可下之至此又云應下最宜詳審先賢謂熱厥手足雖厥冷而或有溫時手足雖逆冷而手足掌心必煖戴院使又以指甲之煖冷別熱寒二厥臨病之工慎之

諸四逆厥者不可下虛家亦然　傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此爲亡血下之死　傷寒脈促手足厥逆者可灸之

診凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也 [illegible] 之故也

傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者其後必便膿血 成先熱後 [illegible]

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也

傷寒厥 厥之門 全注

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐爲除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此爲熱氣有餘必發癰膿也 成始發熱邪在表也至六日邪傳厥陰陰氣勝者作厥而利厥反九日陰寒氣多當不能食而反能食者恐爲除中除去也中胃氣也言邪氣大甚除去胃氣胃欲引食自救故暴能食此欲勝也食以索餅試之若胃氣絕得麪則必發熱若不發熱者胃氣尚在也恐是寒極變熱因暴熱來而復去使之能食非除中也 [illegible] 後三日脈之其熱續在者陽氣勝也期之旦日夜半愈若旦日不愈後三日脈數而熱不罷者爲熱氣有餘必發癰膿經曰數脈不時則生惡瘡

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈 成陰勝則厥陽勝則熱 [illegible]

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病爲愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血 [illegible]

傷寒厥 厥之門 全注

少腹滿痛而厥爲冷結關元 并少腹

發熱而厥七日下利者爲難治　傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死 [illegible]

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死　傷寒發熱下利至甚厥不止者死　下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死

○附

活 冷厥者初得病日便四肢逆冷脈沉微而不數足多攣臥時惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自調或小便數外證多惺惺而靜脈雖沉實按之遲而弱者知其爲冷厥也四逆湯理中湯通脈四逆湯當

歸四逆湯當歸四逆加吳茱萸生薑湯白通加豬膽汁
湯隨證用之

熱厥

熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽證二三日至四五日方發厥熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深方能發厥須在二三日後也若微厥却發熱者熱深故也其脉雖伏按之而滑者為裏熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外證多昏憒者知其熱厥也白虎承氣湯隨證用之

失下發厥

又有下證悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脉沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須用承氣湯下之不可拘忌也

諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須下者正謂手足雖逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆也當消息之

脉沉疾有力宜下無力宜溫

海厥陰證四肢厥冷爪甲青脉沉疾按之有力者為陽則當下宜大承氣湯如脉沉遲按之無力者為陰則當溫宜四逆湯更須速灸之

天寒陰證宜溫之

羅省掾曹德裕男婦二月初病傷寒八九日請予治之脉得沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱腋下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫者留白虎加人參湯可服否予曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未然今此證不可服白虎者有三傷寒證云立夏以前立秋以下不可妄用一也太陽證無汗而渴者不可用二也況病人陰證悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急當救裏宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連鬚葱白九莖水五大盞同煎至三盞去滓分三服一日服之至夜則止手足溫翌日大汗而解繼之以理中湯數服而愈孫真人習業論云凡欲為太醫必須精讀甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經絡三候九部本草藥性仲景叔和並須精熟如此方為太醫不則猶無目夜遊動致顛隕執此用藥者冉思可矣

天熱陽證宜[illegible]之

陽證治驗真定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞役飲食失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末三錢匕熱酒調下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒施治須臾汗大出汗後即加口乾舌澀眼白睛紅項強轉肢體不柔和小便淋赤大便秘澀循衣摸床如發狂

我問之則言語錯亂視其舌則赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人董悉謂危殆不望生全隣人吉仲完舉予治之診其脉七八至知其熱證明矣遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三行折其勝勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩徐徐服之以去其熱三日後病十分中減五六更與白虎加人參湯約半斤服之瀉熱補氣前證皆退戒以慎起居節飲食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣宜無翼其勝無贊其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和當暑者氣方盛之時聖人以寒涼

急救腎水之原補肺金之不足雖有客寒傷人仲景云用麻黃湯內加黃芩知母石膏之類恐發黃發斑又用桂枝湯之戒況醫以桂末熱酒調服所謂差之毫釐謬以千里逆仲景之治法經云不伐天和不贊其復不翼其勝不失氣宜不然故疾未已新病起矣

用熱遠熱從乎中治

友人劉巨源年六十五歲至正夏月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以為四時證治之不愈遠十日請予治診之右手三部脉沉細而微太陰證也左手三部脉微浮而弦虛陽在表也大抵陰多而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自覆氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經有用熱遠熱之戒口乾但漱水不嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也內虛則外證隨時而變詳內外之證乃飲食勞倦寒傷於脾胃非四時之證明矣治病必察其下今適當大暑之時而得內寒之病以標本論之時為標也病為本也用寒藥則順時而逆本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必當從乎中治中治者溫之是也遂以錢氏

白朮散加升麻就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而利小便人參藿香木香和脾胃進飲食㕮咀一兩煎服再服斑退而利止身溫而神出次服異功散治中湯辛溫之劑一二服五日得平止藥或曰病雖稍愈勿藥可乎予曰藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既去強之以藥變證隨起不若以飲食調養待其真氣來復此不藥而藥不治而治之理旬日良愈

活法

若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脉或一手無脉者必是有正汗也多用綿衣裹手足令溫煖

急服五味子湯或無與麻黃細辛甘草湯之類服之晬
時必有大汗而解矣
五味子湯治傷寒喘促脉伏而厥
人參　麥門冬去心　杏仁去皮尖
生薑　陳皮各二錢半　大棗二枚
五味子半兩
右㕮咀水煎服
蓋陰陽之病皆能發厥故有陽厥有陰厥皆病之深
也二厥惟陽厥易誤當問其初得病如何若初得病
頭不痛四肢逆冷足多蜷臥而惡寒或汗自引衣蓋

覆或不渴或利清穀或小便自調人多惺惺而靜此
寒厥也是爲陰中之陰宜四逆湯附子理中湯若初
得病頭痛身熱外別有陽證至五六日方發厥其人
雖厥或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便
祕小便赤多昏憒者此熱厥也是爲陰中之陽宜白
虎湯或大承氣湯熱厥雖手足冷而指甲却煖不若
寒厥并指甲俱冷此辨陰陽要法也　近有陽病自
腰以上極熱兩脚常冷蓋三陰脉上不至頭故頭不
疼三陽脉下不至足故足冷也　南陽謂傷寒手足
必微冷若手足自溫者係太陰也說欠分曉若陽明

手足安得微冷少陽厥陰而大冷安得言微冷但當
言三陰經少陰厥陰手足厥冷惟有太陰手足自溫
耳
陶陰陽二厥治之一差死生立判陽厥者先自三陽
氣分因感寒邪起于頭痛發熱惡寒已後傳進三陰
血分變出四肢厥逆乍溫大便燥實讝語發渴揚手
擲足不惡寒反怕熱或腹痛後重泄利稠粘小便赤
澀脉沉有力此見傳經熱證謂之陽厥陽極發厥者
即陽證似陰外雖有厥冷內有熱邪耳蓋因大便失
下使血氣不通故手足乍冷乍溫也如火煉金熱極

金反化水寒極水反成冰而能載物厥微熱亦微四
逆散厥深熱亦深大承氣若不明此復投熱藥如抱
薪救火夫陰厥者乃三陰血分自受寒邪初病無身
熱頭痛就便惡寒四肢厥冷直至臂脛已上過手肘
膝不溫引衣踡臥不渴無或腹痛吐瀉小便清白或
戰慄面如刀刮口吐涎沫脉沉遲無力此爲陰經直
中眞寒證不從陽經傳入謂之陰厥也輕則理中重
則四逆又有病自陽經傳入日下係陰證而厥者亦
陰厥也且夫人之手足乃胃土之末凡脾胃有熱手
足必熱脾胃有寒手足必寒此理之常也至于亢極

反成熱化此又事之變也學者於此宜致力焉

[吳]大抵傷寒發厥正氣已極宜速加治夫陽厥者必先因熱甚不解而致劉河間謂肢體厥冷惟心胸有熱大便秘者以涼膈散養陰退陽不可速下若大便不秘者以黃連解毒湯主之凡厥證可下者內有燥屎也以手摩病人臍腹或鞕滿或痛者是也若腹中轉失氣氣出極臭者或繞臍刺痛者以有燥屎也輕則調胃承氣重則大承氣或用涼水調下玄明粉一二錢亦佳或用雞清入蜜水和一匙調入好芒硝末二三錢最効大抵陽厥以脉滑別之則無差也凡陰

厥者必先因腎氣虛寒或復著外寒或誤服寒涼之藥或誤下之則積陰盛于下微陽衰于上遂發厥逆其脉沉細而微按之全無者是也宜四逆湯急溫之冷甚者治例與陰毒同也凡尸厥者經言少陰脉不至腎氣微奔氣促迫宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股而為尸厥也急宜刺期門巨闕昔扁鵲治虢太子病尸厥針三陽五會穴而愈蓋以陽脉下墜陰脉上爭宗氣聚而不通上有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色以發脉亂故形靜厥冷昏沉如死人之狀名曰尸厥宜陰毒例中求之　凡傷寒寒

熱而厥面色不澤冒昧兩手無脉或一手無脉此將有好汗出如亢陽欲雨之狀多用綿衣包煖手足急用五味子湯或兼與桂枝麻黃各半湯汗之而愈若脉不至汗不出者死

[針灸]治傷寒手足逆冷　大都一分

傷寒六脉俱無　復溜補六呼留六　合谷　中極　支溝

一寸半此穴和脉絕穴　復溜在內踝骨下　巨闕二寸二分　氣衝炙七壯

尸厥少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

少腹滿　少腹急

臍下為少腹夫胸中滿心下滿皆氣也腹滿者多有燥屎也少腹滿者有物聚也蓋身半已上同天之陽身半已下同地之陰清陽出上竅濁陰出下竅故在上滿者氣也在下滿者物也物者溺與血爾邪結下焦則津液不通血氣不行或溺或血流滯而脹滿也若小便利者畜血之證小便不利溺澀證也俱是熱病惟冷結膀胱少腹滿一證為寒病有手足厥冷為可辨

太陽傷寒表不解乾嘔發熱而欬或小便不利少腹滿者小青龍去麻黃加茯苓湯主之（詳欬）

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之（成太陽經也膀胱府也此太陽隨經入府者也六七日者邪氣傳裏之時也脉微而沉邪氣在裏之脉也表證仍存者則邪氣猶淺也當結於胸中若不結於胸其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞕滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血）

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸（成傷寒有熱少腹滿是畜血於下焦若熱畜津液不通則小便不利其熱不畜津液而畜血不行小便自利者乃為畜血當與桃仁承氣湯抵當湯下之然此無身黃屎黑又無喜忘發狂是未至於甚故不可與其餘峻猛之藥也可與抵當丸小可下之也）

太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之（成身黃脉沉結少腹鞕小便不利者胃熱發黃也可與茵陳湯身黃脉沉結少腹鞕小便自利其人如狂者非胃中瘀熱為熱結下焦而為畜血也與抵當湯以下畜血）

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之（許人曰晝夜譫語喜忘少腹滿小便不利男子為蓄血婦人為熱入血室[illegible]當[illegible]）

厥陰尺寸脉微緩者厥陰受病也當六七日發其證少腹煩滿而囊縮

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也（[illegible]當歸四逆[illegible]或眞武湯）

脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者名藏結死　或云此有動氣犯汗吐下者死（老本）

少腹急　太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯（下血抵當湯解表桂枝湯○太陽膀胱經也太陽經邪熱不解隨經入府為熱結膀胱其人如狂者為未至於狂但不寧爾經曰其人如狂者以熱在下焦太陽多熱熱在膀胱必與血相搏若血不為蓄為熱迫之則血自下血下則熱隨血出而愈若血不下者則血為熱搏蓄積於下而少腹急結乃可攻之與桃核承氣湯下熱散血內經曰從外之內而盛於內者先治其外後調其內此之謂也）

身重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸為陰陽易病（詳見本門）

囊縮仲景無治法今采南陽海藏治法補之
扁鵲曰舌卷囊縮者死孫眞人曰陰陽易病亦縮則舌吐出死凡囊縮有熱極而縮者有冷極而縮者凡熱極者有可下冷極者宜急溫之下之宜大承氣湯溫之宜附子四逆加茱萸湯併艾灸關元氣海葱熨等法治之
活傷寒六七日煩滿囊縮其脉尺寸俱微緩者足厥陰肝經受病也厥陰病其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈宜小建中湯脉浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧爲欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸俱沉短者必是囊縮毒氣入腹宜承氣湯下之大抵傷寒病藏府傳變陽經先受病故次傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣尅於脾土脾再受邪則五藏六府皆因而危殆榮衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五生一死古人云脾熱病則五藏危又土爲木賊則死若第六七日傳厥陰脉得微緩微浮爲脾胃脉也故知脾氣全不受尅邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣
海厥陰證者煩滿囊縮大小便不通發熱引飲腹滿尺寸脉微緩煩者火也滿者木也雖不吐蚘囊縮但急者亦木也火與木相合四肢厥逆而爪甲青大小便不通地道塞也發熱引飲邪氣在裏宜溫之下之
已上諸證大小便俱通地道不塞不發渴不引飲邪不在裏則宜溫之灸之則裏外相接以復陽氣宜服正陽散

正陽散方

麝香　乾薑

甘草　附子

皁莢

右爲細末每服貳錢白湯調溫服

回陽丹

硫黃　木香

附子

全蝎　蓽澄茄

吳茱萸

乾薑

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大生薑湯下三五十丸併二三服併熱投之衣被取汗

陰毒

仲景但名陰毒主發表陰毒之為病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之方見陽毒

王玫之仲景書雖有陰毒之名然其所敘之證不過面目青身痛如被杖咽喉痛而已並不言陰寒極甚之證況其所治之方亦不過升麻甘草當歸鱉甲而已並不用大溫大熱之藥是知仲景所謂陰毒者非陰寒之病乃是感天地惡毒異氣入於陰經故曰陰毒耳後之論者遂以為陰寒極甚之證稱為陰毒乃引仲景所敘面目青身痛如被杖咽喉痛數語併而言之却用附子散正陽散等藥以治竊謂陰寒極甚之證固亦可名為陰毒然終非仲景所以立名之本意觀後人所敘陰毒與仲景所敘陰毒自是兩般豈可混論後人所敘陰毒亦只是內傷冷物或不正暴寒所中或過服寒涼藥所變或內外俱傷於寒而成耳非天地惡毒異氣所中者也

活人更名陰毒傷寒主退陰

陰毒甘草湯治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥後六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾身如被杖咽喉痛五六日可治七日不可治

甘草炙　桂枝去皮　升麻

當歸　雄黃　蜀椒去目

鱉甲

右㕮咀水煎服如人行五里許更進一服覆取汗毒從汗出即愈若未汗再服

始得陰毒脈沉細疾許陰毒本因腎氣虛冷因欲事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚覺重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰證也若服涼藥過多則渴轉甚躁轉急有此證者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰證不宜發汗如氣正脈大身熱未瘥用藥發汗無妨

正元散治傷寒如覺風寒吹著四肢頭目骨節疼痛急服此藥如人行五里許再服連進三服出汗立瘥若患陰毒傷寒入退陰散五分同煎或傷冷傷食頭昏

氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃去節　陳皮　大黃生

甘草　乾薑　肉桂

芍藥　附子　吳茱萸

半夏各等分

右㕮咀麻黃加一半茱萸減一半同爲末每服一錢水一盞薑三片棗一枚煎七分熱服以衣被蓋覆取汗切須候汗乾去之如陰毒不可用麻黃免更出汗

退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重連服三次小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻

陰毒傷寒咳逆煎一服細細熱呷病止

川烏　乾薑各等分

右爲麤末炒令轉色放冷再搗爲細末每服一錢水一盞鹽一捻煎至半盞去滓溫服

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦咳嗽鼻塞不思飲食兼治傷寒夾冷氣并慢陰毒神效

白术二兩半　甘草　五味子

石膏各壹兩　乾薑三兩半

右㕮咀每服五錢水一盞入鹽少許同煎服如冷氣相夾入薑棗煎或治陰毒病入艾葉少許煎服

海藏白术散治陰毒傷寒心悶煩躁四肢厥冷

川烏炮去皮臍　桔梗　附子炮

白术　細辛各一兩　乾薑炮半兩

右㕮咀或末之白湯調下一錢匕

雞正陽丹治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷脉沉細而微神效　右用葱葱四五枝陳蜂房四五箇燒存性爲細末用葱葱搗和丸如彈子大手心內握定用手帕緊縶須臾汗出以綵被覆蓋如手心熱甚休教解開如服藥先服升麻湯五錢連鬚葱三枝生薑五片水二大盞煎至一盞去滓溫服被覆取汗則愈

陰毒漸深爪青面黑脉七至沉細積陰感於下則微陽消於上故其候四肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結鞕躁渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脉沉細而一息七至以來有此證者速宜於氣海關元二穴灸二三百壯以手足溫暖爲效仍服金液丹來蘇丹五勝散還陽散退陰散

川烏去皮臍冷水浸七日薄切曬乾爲末每服　患者頭面青末每服一錢入鹽一小錢水一盞　至七分放溫服空心熱酒下　稍未已再進一服效

還陽散治陰毒面青四肢逆冷心躁腹痛

用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱

一起更看緊慢再服汗出瘥

附子回陽散 治陰毒傷寒面青四逆及臍腹疼痛身體如氷并一切卒暴冷氣

右用附子二枚炮裂去皮臍搗為細末每服三錢匕取生薑自然汁半盞冷酒攪勻共一盞調服更以冷清酒一盞送下相次更進一服良久臍下如火徧身和煖為度

活 返陰丹 治陰毒傷寒心神煩躁頭疼四肢逆冷

硫黃五兩另研 附子炮去皮臍 乾薑炮 太陰玄精石別研各二兩

桂心各半兩 硝石另研

右用生鐵銚先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上用小盞合着用三斤炭火燒令得所勿令烟出細研似麪後三味搗羅為末與前藥同研令勻軟飯和丸如梧子大每服十五丸至二十丸煎艾湯下頻服汗出為度病重則三十丸此方甚驗喘促與吐逆者入口便住又服此藥三五服不退者更於臍下一寸灸之須是晝夜大段不住手灸不限多少壯數灸之艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷少腹鞕即於臍下兩邊各開一寸各安一道三處齊下火灸之仍與當歸四逆湯併返陰丹亦須頻服內外通透方得解若遲誤即死矣又若陰證加以少腹不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴急灸之仍須與返陰丹當歸四逆湯加吳茱萸生薑慎勿與尋常利小便冷滑藥

火焰散 治傷寒惡候

舶上硫黃 黑附子去皮生用 新臘茶各一兩

右為細末先用好酒一升調藥攤入新碗中於火上蕩乾合在瓦上每一碗下燒熟艾一拳大以瓦擡起無令着火直至烟盡候冷即刮取研入磁盒內盛每

服二錢酒一盞共煎七分有火焰起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脉沉細或吐瀉五心煩躁胸中結鞕或轉早伏陰在內湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服服後心中熱其病已瘥下至藏府中表未解者渾身壯熱脉氣洪大便宜用發表藥或表解者更不發熱便得眠睡渾身有汗若少有痞結脉實方可用下藥行藏府藥漸用調和元氣補治脾胃湯散服此藥三服不應者不可治也

陰毒沉困脉入至附骨方有陰毒沉困之候與前後漸深之候皆同而更加沉重六脉附骨取之方有按之即

無一息入至巳上或不可數至此則藥餌難為功矣但於臍下灼火艾如棗大三百壯以來手足不和煖者不可治也倘復和緩以前硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來則漸減熱藥而和治之以取瘥也

治陰虛陽脫體冷無脈氣息欲絶不省人事及傷寒陰厥百方不效者用葱以索纏如臂大切去根及葉惟存白長二寸許如大餅樣先以火熁一面令通熱勿令着火乃以熱面熨病人臍上連臍下又以熨斗滿貯火熨之令葱餅中熱氣鬱入肌肉中須更作三四餅一餅壞不可熨又易一餅良久病人當甦手足溫有汗即瘥更服四逆湯以溫其內

治陰證諸藥不效併湯水不下身冷脈絶氣息短不知人用葱白熨法又不若用釅醋拌麩皮炒熱注布袋中蒸熨之比上法尤速

代灸塗臍膏

附子　馬藺子　蛇床子

吳茱萸　肉桂各等分

右為細末可用白麪一匙藥末一匙生薑自然汁煨成膏攤帋上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其火力可代灸百壯腰痛亦可貼之　一法用丁香葱擦乾薑牡蠣燒灰放手心中以唾津調如泥以手掩其陰至煖汗出為度

治陰毒傷寒四肢逆冷者用吳茱萸不拘多少為細末溫酒和勻生絹袋盛之熱熨腳心令通暢愈若以湯煎溫藥淋洗以接四肢亦可

廻生神膏良方治男女陰毒傷寒外接法

牡蠣煆粉　乾薑炮各壹錢

右為細末男病用女唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈卵與乳男女之根蒂坎離之分也陰證大小便不通及諸雜證陰證大小便不通者並宜此外治法數日不通為急非急者勿用

陰中伏陽破陰丹

硫黃　水銀各壹兩　陳皮　青皮各半兩

右將硫黃先入銚子內鎔開次下水銀用鐵杖子打勻令無星傾入黑茶盞細研入二味麪糊丸如桐子大每服三十丸如煩躁冷鹽湯下陰證艾湯下良效

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰證也急服金液破陰來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰證而見陽脈有可生之理仲景所謂

陰病見陽脉者生仍灸氣海丹田百壯手足温温陽回得汗而解或問滑沉之狀如何便有生理予曰仲景云翕奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翕為正陽陰陽和合故名曰滑古人論脉滑雖曰往來前却流利旋轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字極難曉翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翕而合俄降而沉奄為忽忽間仲景論滑脉可為諦當矣其言皆有法故讀者難曉宜細思之

霹靂散　治傷寒陰勝隔陽其人必躁熱而不欲飲水是也

右用附子一枚燒灰存性為末作一服蜜水調下而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

陶陰毒病手足指甲皆青脉沉細而急者四逆湯無脉者通脉四逆湯陰毒甘草湯真武湯厚朴丸白术湯肉桂散皆可選用

正陽回陰霹靂散正元散天雄散附子散

却金液丹

熏逆冷囊縮者以炒豆投熱醋中如法熏之

熨法灸法一傷寒直中陰經真寒證或陰毒證身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四體堅冷如石手指甲唇青藥不入口六脉沉細或無脉欲絶者將葱一握切去根葉取白三寸許搗如餅先用麝香半分填臍中後放葱餅臍上以火熨之連換三四餅稍醒灌入生薑汁服回陽救急湯如不醒再灸氣海關元二三十壯使熱氣通于内逼邪外出以復陽氣如用此法手足温和汗出即醒者有生意也手足不温汗不出不醒人事者不能起矣

吳或問陰毒傷寒用附子湯冷服何也此蓋陰極于下陽浮于上之治法也予曾治一人傷寒十餘日脉沉細手温而足冷大便不通面赤嘔煩渴藥不能下惟

喜凉水一二口或西瓜一二塊食下良久而復吐出此陰寒于内逼其浮陽失守之火聚于胸中上衝咽嗌故為面赤嘔煩也遂用附子大者一枚以生薑自然汁和白麵包裹煨熟去麵取附子去皮尖切作八片又以人參三錢乾薑炮三錢水二鍾煎取一鍾浸于冷水中待藥冷與之即愈按内經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱藥冷服下嗌之後冷體既消熱性即發由是病氣隨愈嘔煩皆除情且不違而致大益此之謂也蓋近世患陰證傷寒往往疑似參差初便不敢用附子直待陰極陽竭而用之則為遲矣大抵

治法有是病投是藥豈可狐疑而誤治哉且夾陰傷寒先因慾事伏陰于內却又著寒內外皆陰陰氣獨盛則陽氣以衰故脉沉而足冷也必須急用人參健脉以益元氣為主佐以附子溫腎經散寒邪以退陰而回陽也若舍此二味不用將何以救之哉古之諺曰傷寒偏死下虛人誠哉斯語許學士論必以真氣為主蓋真氣乃人命之根蒂也若不察真氣之虛實而欲急攻其熱或施汗下或多用寒凉之藥攻熱未愈陰寒復生病至危殆良可悲夫

又方用雄鷄血滴入無灰熱酒內飲之以衣被溫覆取汗

傷寒證治準繩帙之四

傷寒證治準繩帙之五

金壇王肯堂輯　門人南昌張　綍校

合病併病汗下吐後等病

表裏合病必下利太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者葛根加半夏湯主之　太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之　陽明與少陽合病必下利脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯詳見下利

併病二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒太陽證不罷面赤躁煩短氣者更發汗則愈　二陽併病太陽證罷潮熱譫語者下之則愈論見譫語　太陽與少陽併病項強眩冒心下鞕如結胷者刺胷腧肝腧論見結胷

合併病

合病兩經俱病併則一經證罷而併歸于一經也太陽與陽明合病有三證其邪湊有淺深之殊故用藥有汗下和解之異治見各條三陽合病有二證其一證用白虎湯其一證無治法後人用小柴胡白虎之類蓋此二證俱有三陽之候故不可汗下二陽併病有二證表未解者汗之表已解有裏證者下之太陽與少陽併病有三證其一由誤下以致心下鞕成結胸其一項強如柔痓狀心下鞕如結胸刺肺俞肝俞慎勿發汗汗則讝語不止宜刺期門其一心下鞕項強而眩者刺大椎肺俞不宜下也

合病太陽與陽明合病胸滿而喘者不可下麻黃湯

太陽與陽明合病自下利葛根湯不下利但嘔者葛根加半夏湯或曰由太陽表未罷而陽明裏又至兩陽合病熱甚于表乘虛熱攻于裏故下也其不下利而嘔者邪氣雖攻裏未入于胃但氣逆而嘔故加半夏以止嘔逆龐氏曰外證必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也脈浮大太陽受病也長者陽明也頭疼者太陽也眼目鼻乾陽明也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏湯或曰此表實裏虛熱入攻裏故自下利若兼嘔飲則嘔也

陽明少陽合病必下利脈長者為順脈弦者為負負者尅賊也脈滑而數者有宿食大承氣湯或曰陽明土少陽木其脈弦者木乘土也不強者不負也負者必死脈滑而數者有宿食非負也故宜下

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讝語遺尿不可汗下若自汗者白虎湯　三陽合病脈浮大見關上但欲眠目合則汗小柴胡白虎湯或曰此二證俱有三陽之證此不可汗下

併病二陽併病太陽初得時汗之不徹轉屬陽明續自微汗不惡寒大柴胡湯　若太陽證不罷不可下可小發汗設面色緣緣正赤陽氣怫鬱在表汗之不徹其人煩躁短氣不知痛處宜更發汗則愈葛根湯　二陽併病太陽證罷潮熱手足汗大便難讝語者大承氣湯

太陽少陽併病反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下心煩生薑瀉心湯小陷胸湯　太陽與少陽併項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞕刺大椎第一間肺俞肝俞不可汗汗則讝語不止刺期門　太陽少陽併病心下鞕項強而眩者刺大椎肺俞慎勿下

趙嗣真曰合病併病之難明也久矣姑釋之蓋合病者二陽經或三經同受病病之不傳者也併病者一陽經先受病又過一經病之傳者也且如太陽陽明併病一證若併而未盡是傳未過尚有表證仲景所謂太陽證不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁

氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大便鞕而譫語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府所以仲景論太陽陽明合病止出三證如前太陽陽明併病則言其有傳變如此也又如陽經互相合病皆自下利仲景於太陽陽明合病則主以葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病主以承氣湯至於太陽少陽併病其證頭項強痛眩冒如結胸心下痞鞕當刺大椎肺俞肝俞不可汗下太陽陽明併病已見上論但三陽合病仲景無背惡

寒語句雖別有口燥渴心煩背微惡寒者乃屬太陽證而非三陽合病也活人言三陽合病背惡寒者非也三陽若與三陰合病即是兩感所以三陰無合病例也

張夫併者乃催併督併之義非吞併就之理然催併係去聲吞併之併乃上聲史記曰始皇初併天下即此理也夫併之理乃前病未解後病已至有逼相併之義故曰併病也經曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒云云如果併作一家則仲景不具兩經之證而言也其非併字明矣

又曰或云三陽合病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明似乎重出予曰各有所指不過表裏之分耳夫三陽合病在表三陽陽明病在裏事在兩途即非重出在表者宜解散以奏安在裏者非攻下則不可然表裏證治迥各不同惟綱目有似乎重出

發汗後不解

傷寒初感始以太陽故以發汗爲首汗行如雨散雲收其病乃愈倘汗行不解者或表邪未盡或熱邪傳裏或邪氣乘虛内客故有汗後而不解者

發汗病不解反惡寒虛也芍藥甘草附子湯　太陽病發熱汗不解仍發熱心下悸振振欲擗地眞武湯　發汗後身疼痛脉沉者桂枝加芍藥人參新加湯　太陽發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢拘急難以屈伸桂枝加附子湯　大汗出熱不去内拘急四肢疼下利惡寒四逆湯　發汗過多冒心心下悸欲得按桂枝甘草湯　汗後腹脹滿厚朴生薑人參湯　太陽病發汗後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之則愈若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散　發汗已脉浮數煩渴五苓散　服桂枝湯脉洪大與桂枝湯如前法若形如瘧日再發汗出必解麻黃湯　發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐不和大柴胡湯　服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪大白虎加人參湯　發汗後臍下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯　發汗後不惡寒但惡熱蒸蒸發熱者實也調胃承氣湯　發汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯

下後不解

去傷寒之邪不過汗吐下之三法也三法得當病勢易衰則愈矣三法失宜病勢危惡傳變不已誠可慮也況發汗吐下後邪氣乘虛而未散或雍塞而未盡則當量其虛實以治之先賢謂知邪氣之虛實發汗吐下之不差温補針艾之適當則萬全之功可得矣若過經者以六日傳六經七日爲一候若不愈十三日乃再傳經盡所以謂之過經也

傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛未欲解也梔子豉湯下後心煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯　陽明病下之心中懊憹而煩梔子豉湯若有燥屎者大承氣湯　太陽病下後脉促胸滿桂枝去芍藥湯微惡寒者去芍藥方中加附子醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯　太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯　服桂枝湯或下之仍頭痛項強無汗翕翕發熱心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯　太陽病過經十餘日二三下之嘔不止心中微煩大柴胡湯下之　六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下利脉不至咽喉不利吐膿血瀉利不止爲難治麻黃升麻湯

汗吐下後不解

五六日巳發汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩爲未解柴胡桂薑湯　太陽汗吐下解後心下痞鞕噫氣不除者旋覆代赭石湯　太陽先發汗不解而復下之脉浮者則知病在外當須解外桂枝湯　發汗若下之病仍不解煩躁不得眠茯苓四逆湯　大汗若大利而厥者四逆湯　下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱乾薑附子湯　下後復發汗必振寒脉微細此内外俱虛也　傷寒本寒後復吐下之食入口即

吐乾薑黃連黃芩人參湯　發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯　發汗若下之煩熱胸中窒梔子豉湯　吐下後不大便五六日至十餘日日晡發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀循衣摸床脉弦者生濇者死但發熱讝語者大承氣湯　吐下後腹脹滿邪熱入胃也調胃承氣湯　太陽吐下後微煩小便數大便鞕小承氣湯　吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥煩欲飲水白虎加人參湯　吐下後心下逆滿氣上衝胸頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振搖茯苓桂枝白术甘草湯

喘

成肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝衝而氣急喝喝而息數張口擡肩搖身滚肚是爲喘也有邪在表致氣不利而喘者麻黄湯桂枝加厚朴杏子湯有水射肺而喘者小青龍湯發汗後飲水必喘以水灌之亦喘及傷寒心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者小青龍去麻黄加杏仁是欲發散水寒也經曰喘而汗出者與葛根黄芩黄連湯以利之（此邪氣内攻氣逆不利因喘而汗出見其邪氣在裏也雖表未解未可和之）汗出而喘者與麻黄甘草石膏湯以發之（此外邪壅盛使氣不利汗出而喘不已見其邪氣在表也雖經汗下亦可發之）若傷寒止于邪

氣在表而喘者心腹必濡而不堅設或腹滿而喘則又爲可下之證經曰短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也又汗出髮潤喘不休者爲肺絶身汗如油喘而不休爲命絶直視讝語喘滿者死是皆不治之喘也　太陽病頭痛發熱身痛腰痛骨節痛惡風無汗而喘麻黄湯　太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下麻黄湯

〔許〕有人病傷寒脉浮而長喘而胸滿身熱頭痛腰脊强鼻乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胸滿者麻黄湯也治以麻黄湯得解

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者小青龍湯（方見太陽病）　發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘（喘肺疾飲水多而喘者飲冷傷肺也以冷水灌洗而喘者形寒傷肺也○或用小青龍加杏仁備急湯）　傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯　喘家有汗桂枝湯加厚朴杏仁佳（與太陽病為諸陽主氣風甚氣壅則生喘也與桂枝湯以散風加厚朴杏仁以降氣）　太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏人湯主之（下後大喘則為裏氣太虛邪氣傳裏正氣將脫也下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也與桂枝湯以解外加厚朴杏人以下逆氣）

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝（去皮）　芍藥　生薑（切各參兩）

厚朴（炙去皮）　甘草（炙貳兩）　杏仁（去皮尖伍拾枚）

大棗（拾貳枚擘）

右七味以水七升煮取三升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之（於發汗後喘當作桂枝加厚朴杏仁湯汗出則喘會令汗[illegible]常為邪氣壅遏桂枝湯不能發散故不可更行桂[illegible]汗上加喘有大熱者內熱氣甚也無大熱者表邪必[illegible]石膏湯以散其邪[illegible]子觀仲[illegible]言發汗後乃表邪悉解止[illegible]一證而已故言不可又[illegible]桂枝湯今汗出而喘無大熱乃上焦餘邪未解當[illegible]黃杏仁甘[illegible]石[illegible]以散之夫[illegible]受加厚朴杏仁湯乃桂枝證悉[illegible]所加喘者用之若[illegible]汗出而喘以為[illegible]氣壅甚非桂枝[illegible]發散此誤也[illegible]無大熱更無）

謂何故復言表邪必甚其後並下後不可更行桂枝湯條下注曰汗下雖殊既不當損正氣則一其言有至理存焉可見汗後所注之誤矣原其理當時因傳寫錯簡前後失於照應故有此等之弊也　下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯（此上條云發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者為與此證治法同汗下雖殊既不當損正氣則一邪氣所傳既同遂用一法治之經所謂若發汗若下若吐後是矣）

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃（肆兩去節）　杏仁（伍拾枚去皮尖）　甘草（炙貳兩）

石膏（半斤碎綿裹）

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

（[illegible]解肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以甘散發之）

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯（方見[illegible]）　陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難麻黃湯　陽明脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯　陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重白虎湯五苓散　傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則讝語（邪氣入內之時得脈沉而喘滿裏證具也則當下之反發其汗令人津液越出胃中乾燥大便必難久則裏實必發讝語也○大承氣湯）

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之　病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

診傷寒吐下後不大便有熱若劇則不識人循衣摸牀微喘直視脉弦者生濇者死（詳見循衣摸牀）　濕家下後額汗微喘大小便利者死（詳見額汗）　少陰病息高者死（詳見下利論見厥）（詳見厥）　厥冷無脉灸之不還反微喘者死（詳見厥）　直視譫語喘滿者死（詳見譫語）　脉浮洪汗出如油髮潤喘不休為

命絕

○附

活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳（方見陰毒）

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚衆當以五苓散或陷胸丸主之（方見渴及結胸）

熱喘嗽有陰陽太陽經喘嗽略於前本經言之詳見嗽門少陽有嗽無喘有喘非少陽也其見少陽證而嗽者宜小柴胡湯加北五味子六分乾薑四分陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也其陽明證喘有潮熱者宜大承氣湯陰證喘惟少陰有之若四肢沉重疼痛小便如常大便自利而嗽者真武湯去芍藥加北五味乾薑各半錢細辛三錢此陰中之陰若四肢厥逆腹中痛泄利下重而咳四逆湯加北五味乾薑各半錢下利嘔渴身煩不得眠而咳嗽者猪苓湯此陰中之陽諸陰喘促最為危證返陰丹

矣凡表有寒發喘者脉浮緊惡寒身疼無汗也宜麻黃湯汗之若表有風發喘者脉浮緩惡風自汗也宜桂枝湯加厚朴杏仁主之凡陽明內實不大便腹滿短氣發潮熱而喘者大柴胡加厚朴杏仁湯或小承氣湯凡陰

證厥逆脉沉細而微氣促而喘無汗者宜四逆湯加五味杏仁凡虛人脉伏若手足逆冷而喘者五味子湯凡暴冒風寒脉浮無汗而喘蘇沉九寶湯凡熱盛有痰脉弦數而喘不可汗不可下以小柴胡湯加知母貝母瓜蔞仁胸滿者加枳殼桔梗心下滿者加枳實黃連舌燥飲水而喘者加知母石膏主之古人云諸喘為惡故非輕也華佗曰盛則為喘蓋非肺氣盛也乃肺中之邪火盛也所以瀉白者瀉肺中之火也非瀉肺也又為瀉心湯乃瀉心下之痞滿者也衛生寶鑑曰凡看文字有餘當認作不足者蓋受病為不足病氣為有餘也

五味子湯方見喘門

蘇沉九寶湯

桑白皮上 甘草下 大腹皮下 官桂下

麻黃中 薄荷下 陳皮上 紫蘇中

杏仁去皮尖炒中 生薑叄片 烏梅半箇

右用水二鍾煎至八分去滓通口服

加減瀉白散 治煩熱胸膈不利上氣喘促口乾或欬者

桑白皮壹錢 知母 橘紅 瓜蔞仁去殼

細黃芩 貝母 桔梗 甘草各壹錢五分

地骨皮壹錢

右煎服法同前

短氣

短氣者氣急而短促似喘而非喘喘則張口擡肩短氣只是氣促不能相續似喘而不擡肩似呻吟而無痛也有責為實者經曰短氣腹滿而喘有潮熱欲解可攻裏此短氣之實者也此外有責為虛者經曰趺陽脈浮而緊緊則為寒微則為虛虛寒相搏則為短氣之虛也有在表者經曰短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈與其風濕相搏汗出短氣小便不利惡風者甘草附子湯此邪在表而短氣也有在裏者經曰乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和十棗湯與太陽病醫反[redacted]下之短氣煩躁懊憹心中要成結大陷胸湯此邪在裏而短氣也治各有異大抵短氣為實要略曰短氣不足以息者實也又水停心下亦令短氣要略曰食少飲多水停心下微者短氣學者察諸

表證短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風濕宜甘草附子湯方論見風濕 短氣腹滿脇痛其人若脈弦浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯也論見陽明發黃方見往來寒熱

裏證若表未解手足濈然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論見潮熱 若表解心下痞鞕乾嘔短氣者宜十棗湯方論見脇滿痛

汗不徹短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不罷面赤者為併病更發汗則愈論見面赤

下後若下後心中懊憹心下鞕痛者用大陷胸湯論見結胸

診趺陽脉微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣坐而伏者短氣也

○附

陶傷寒失于汗下或因汗下後虛令人氣逆不相接續者名短氣分虛實治之此與喘證不相類

吳因汗吐下後元氣虛弱脉來微虛氣不能相接而短少者以人參益氣湯凡陰證脉弱沉細而遲手足逆冷面上惡寒如刀刮口鼻之氣難以布息而短者宜四逆湯加人參主之又食少飲多水停心下令人短氣煩悶茯苓甘草湯

身重

成身重之由有風濕有風寒有風濕俱見有火逆有易病有三陽合病雖所得不一然悉屬三陽非若身疼兼有三陰裏寒也壞病有矣寒則無之識者鑒焉

太陽傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之解太陽 發汗已身猶灼熱名曰風溫脉浮汗出身重多眠鼻息鼾詳風溫證治以葳蕤湯 風溫脉浮身重汗出惡風者宜

防已黃芪湯

防已壹兩 甘草半兩 白朮柒錢半 黃芪去蘆壹兩壹錢

右㕮咀每服五錢生薑四片大棗一枚水一盞半煎至八分溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如氷後坐被上又以一被繞腰已下溫令微汗瘥

喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三分 下有沉寒者加細辛三分

脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也 脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡

重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之（方見驚○張病有身重不能轉側下後血虛津液不榮于外也身疼不能轉側者風濕相搏于經而裏無邪也經曰傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者以桂枝附子湯主之此以柴胡加龍骨牡蠣湯主之以上二證言不能轉側頗相似論疼與重俱不相侔各從本法為宜也）

陽明病脉遲汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘或潮熱或不潮熱承氣湯證（方見潮熱）　陽明病脉浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身重忌汗忌燒鍼忌下（自解）（汗庄云此證宜和解之）

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之（[illegible]）

少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者真武湯

中暍發熱惡寒身重而疼痛手足逆冷小有勞身即熱小便已洒洒然毛聳其脉弦細芤遲口開前板齒燥此爲太陽中暍忌汗下溫鍼（[illegible]）

陰陽易身重少氣少腹裏急或引陰中熱上衝胸眼花者此爲陰陽易宜燒裩湯（[illegible]）

難轉側

三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯（論見身重）　下後胸滿煩驚小便不利讝語身重不可轉側者柴胡牡蠣湯（論見驚）　風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯（論詳身痛）

面赤　面垢　眼赤　面青

太陽病面反有熱色二陽併病面色緣緣正赤陽明面合赤色是皆表邪必發散解肌而愈少陽目赤和解而安少陰面赤色厥陰面少赤帶陽二日必四逆而後可也亞赤雖由陽熱而生然各經俱無可下之證在少陰厥陰者正證有下利厥逆脉微實為陰寒之病縱面赤似陽只是無化而已

太陽病如瘧狀若脉微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小汗之方論見發熱　脉浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者瘥遲為無陽不能作汗其身必痒也

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下之下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也[illegible]

陽明病面合赤色不可攻葛根湯　少陰病下利清穀手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒者通脉四逆湯加葱白詳下利

厥陰下利清穀脉沉遲面少赤身有微熱者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也詳下利

面赤而身熱足寒卒口噤背反張者痓病也詳雜病痓門

面赤而斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血者陽毒也詳陽毒

面垢三陽合病腹滿身重難轉側口不仁譫語面垢遺尿不可汗下

面青太陽病汗後遂發熱惡寒復加燒針因胸痞面青膚瞤者難治色微黃身足溫者易愈

目赤少陽中風兩耳無聞目赤胸滿而煩者不可吐下小柴胡湯

○附

面黃孫兆口訣云工部郎中鄭忠厚患傷寒胸腹滿面黃如金色諸翰林醫官商議略不定推讓曰胸滿可下恐脉浮虛召孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死某有一二服藥服之必瘥遂下小陷胸湯尋利其病遂良愈明日面色改白京師人稱服

壞病

傷太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脉證知犯何逆隨證治之

按逆者謂不當汗而汗不當下而下或汗下過甚皆不順於理故云逆也隨證治之者如後云汗後病不解及發汗若下之病仍不解其湯主之之類是也隨證治之一句語活而義廣王韓諸家以壞病另作一證而以羊肉湯主之誤矣

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯若已吐下發

汗溫針譫語柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之

趙仲景論中所謂壞病者以太陽病誤汗吐下後虛煩結胸痞氣吐後內煩腹脹滿等證是也此正謂桂枝不中與小柴胡湯證罷者爲當指異氣之病如活人所謂異氣爲壞病之說仲景又云更感異氣變爲他病者卽索矩所謂二氣三氣雜合爲病是也以其未可定名而非有名四種溫病之比故以變病名之且四經溫病仲景以爲冬傷於寒至春發爲溫病溫病未已重遇于邪變爲溫瘧風溫溫毒溫疫病未嘗壞故以變證名之一曰壞病一曰變證名目自是不同可見異氣不爲壞病也審矣假如溫瘧果爲壞病則仲景不言小柴胡湯證罷也請人思焉

是齋方傷寒陰陽二證不明或投藥錯誤致患人困重垂死七日以後皆可服傳者云千不失一用好人參一兩去蘆薄切水一大升於銀石器內煎至一盞以新水沉之取冷一服而盡汗不自他出只在鼻梁尖上涓涓如水是其應也妙甚蘇韜光云侍郎方丈嘗以救數十人王使君宰清流日倅車中暑行父之子婦產後病時疫一十餘日已成壞病偶見閑因勸其只服人參一味遂安是時未知有此方偶然暗合耳

海陽證大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之刱陰證者豈可不溫補哉此與傷寒太陽證振振搖與眞武湯一例外之陽病至此尚溫况內之陰候豈得不補耶

韓産脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯爲效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近證有中外治有輕重各適其至所爲故病八九日汗下太過二脉沉細無力多睡足臥惡聽人聲皮

有衆時戰如瘧宜羊肉湯主之

羊肉湯方

當歸　白芍藥　牡蠣煆赤各壹兩

生薑貳兩　桂枝柒錢半　龍骨煆通赤半兩

黑附子炮去皮肆錢

右為麤末每服一兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同剉爛以水五升熬𦵏一半以來濾絞去滓分三服服之

按此方陰證宜之

鼈甲散　治傷寒八九日不瘥諸藥不効名壞傷寒

鼈甲醋炙為末　升麻　前胡

烏梅肉　枳實　犀角鎊

黃芩各半兩　甘草炙貳錢半　生地黃壹兩

每服五錢水一盞半煎至八分去滓服

按此方陽證宜之

振戰慄

戊振者聳動也戰者戰搖也慄者心戰也振輕而戰重也戰外而慄內也振者責其虛寒虛則不至于爭故止于振聳耳戰者為正與邪爭爭則股慄而戰矣戰雖重於振而慄重於戰也戰者正氣勝慄者邪氣勝也皆邪正之相爭也

太陽傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白木甘草湯主之吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胸表虛陽不足起則頭眩脈浮緊為邪在表當發汗脈沉緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷陽氣陽氣外虛則不能主持諸脈身為振振搖也與此湯以[illegible]加經益陽

茯苓桂枝白木甘草湯方

桂枝去皮叁兩　茯苓四兩　白木　甘草炙各貳兩

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服陽不足者補之以甘茯苓白木生津液而益陽也裏氣逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地真武湯主之方見下

孫太乙宮道士周德眞患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地衆醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲

解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能乾涸血液爾仲景云尺脉不足榮氣不足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者子年三十初得病身微汗脉弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠譫語不識人筋惕肉瞤振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景曰脉微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此

為逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈清心竹葉湯方未考

下後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故也　亡血家不可發汗發汗則寒慄而振　太陽病火劫其背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄自下利者此為解也詳譫語

脉沉緊按之芤當戰而汗出解脉芤為虛是以發戰脉浮為在表故當汗出解也詳脉　太陽病脉陰陽俱停等必戰慄汗出而解已見發熱　凡柴胡證下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解詳見往來寒熱

脉浮而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也反發熱者脉遲不能作汗其身必痒也論見面赤

諸乘寒者則為厥鬱冒不仁口急不能言戰而慄也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

發汗下後戰者與救逆湯微減與羊肉湯再投而戰解若陰氣內盛正氣大虛心慄鼓頷身不戰者遂成寒逆宜灸之或用大建中湯仲景治尸厥戰而慄者刺期門巨闕

凡振者大抵氣血俱虛不能榮養筋骨故為之振搖而不能主持也須大補氣血則可予曾用人參養

榮湯得効又一人身搖不得眠者以十味溫膽湯倍加人參遂愈內經曰寒之傷人使人毫毛畢直鼓頷戰慄而無汗按此表寒而戰慄也經言病有戰而汗出因得解其脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也又曰脉陰陽俱停以三部浮沉遲數脉同等必先振慄汗出而解若脉浮數按之不芤其人本不虛者則汗出而解不發戰也若不發戰而心慄者此陰中於邪必內慄也凡正氣怯弱寒邪在內必為慄也學者宜詳究焉

加味人參養榮湯　治發汗過多氣血俱虛而筋惕肉

瞤或身振搖者

人參貳錢半　茯苓　甘草炙

川芎各壹錢　白术　麥門冬去心

當歸身各壹錢　五味子拾伍粒　肉桂壹錢有熱者減半

生地黄壹錢半有熱者用生地黄無熱用熟地黄　黄芪貳錢半有自汗者用蜜炙壹錢

生薑叁片　棗子貳枚

水二鍾煎至一鍾去滓溫服如陰虛相火動者加知母黄檗各一錢酒炒用若陽虛下寒脉微者加熟附子一錢肉桂倍之不得眠加遠志酸棗仁各一錢

加味溫膽湯　治虛煩身振不得眠

人參貳錢半　橘紅　茯苓

黄連酒炒　軟苗柴胡　當歸身

川芎　白芍藥　生地黄

酸棗仁以上各壹錢　半夏柒分　甘艸伍分

竹茹壹團　生薑叁片

右煎服法同前

筋惕肉瞤

成經云陽氣者精則養神柔則養筋發汗津液枯少陽氣大虛筋肉失養故惕惕而跳瞤瞤然而動也宜溫經益陽真武之類是矣又傷寒吐下後復發汗筋脉動惕者久而成痿及太陽病發汗復下之表裏俱虛復加燒針因膚瞤者難治二者逆之甚也又非若但發汗後可比發汗吐下庸可忽諸

太陽病脉微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之則厥逆筋惕肉瞤宜真武湯　太陽病已汗不解仍發熱頭眩身瞤振振欲擗地者真武湯或以人參養榮湯治人參當歸湯　傷寒吐下後復發汗虛煩脉甚微八九日心下痞脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿宜茯苓桂枝白术甘草湯

陽明傷寒吐下後不解不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死但發熱譫語者大承氣湯

陽明脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若加燒針必怵惕煩躁不得眠　若動氣在左頭汗不止者活人用防風白术牡蠣次服建中湯

診汗下吐溫鍼後若膚瞤動胃煩面色青黄者難治論見

活傷寒吐下後發汗脉微心下痞脇痛氣上衝筋脉動惕此爲逆甚矣夫此證皆因發汗攻表太過邪熱未解血氣虛奪筋肉失養所致或不因此由素稟血少邪熱搏于血脉之中火性動惕故也曾治一人傷寒不經發汗七八日筋脉動惕潮熱來尤甚其肉不瞤大便秘結不行小便赤澁以手按臍旁硬痛此有燥屎也以加味大柴胡湯下之而愈又一人傷寒十餘日曾三四次發汗過多遂變肉瞤身振揺筋脉動惕此汗多氣血

俱虛故也以加味人參養榮湯二劑而愈又一人汗後虛煩不得眠筋惕肉瞤內有熱以加味温膽湯治之而愈凡治此證要察虛實也

叉手冒心

發汗過多叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯

驚悸

驚悸之別雜病中辨之甚明傷寒中有單言驚者有單言悸者理不得淆故兩分之其兼言驚悸者則少陽耳聾目赤胸滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚一條而已

海藏茯苓丸治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣

茯神　麥門冬去心　熟地各壹兩　牡丹皮
人參　黄芪各柒錢　桂枝　甘草炙
牛膝　澤瀉各半兩

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒下

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑半兩　茵蔯蒿柒錢半　茯苓貳兩
芍藥貳兩　生地黄焙貳兩　麥門冬去心壹兩半
山梔半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑一片竹葉三七片同煎至七分食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得卧

麥門冬去心　赤茯苓去皮　知母焙

芎藭　炙甘草　酸棗仁微炒
陳皮去白炒　檳榔各壹兩
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三

驚

夫驚壞病也由誤下火逆溫針所致仲景之法不過隨其逆而調之

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之成傷寒八九日邪氣已成熱而復傳陽經之時下之虛其裏而熱不除胷滿而煩者陽熱客於胷中也驚者心惡熱而神不守也小便不利者裏虛津液不行也譫語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行於裏不營於表也與柴胡湯以除胷滿而煩加龍骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津液利小便加大黃以逐胃熱止譫語加桂枝以行陽氣而解身重錯雜之邪斯悉愈矣

柴胡加龍骨牡蠣湯方
半夏湯洗貳合　柴胡肆兩　大黃貳兩
人參　桂枝去麄皮　茯苓
龍骨　鉛丹　牡蠣熬
生薑各壹兩半　大棗擘六枚
右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一二沸去滓溫服一升

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之成傷寒脉浮責邪在表醫以火劫發汗汗大出者亡其陽汗者心之液亡陽則心氣虛心惡熱火邪內迫則心神浮越故驚狂起臥不安與桂枝湯解未盡表邪去芍藥以芍藥益陰非亡陽所宜也火邪錯逆加蜀漆之辛以散之陽氣亡脫加龍骨牡蠣之濇以固之本草云濇可去脫龍骨牡蠣之屬是也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方
桂枝去麄皮　生薑切　蜀漆洗去腥各叁兩
牡蠣熬五兩　龍骨肆兩　甘草炙貳兩
大棗擘拾貳枚
右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

太陽傷寒者加溫針必驚也心屬火火先入心心主血而藏神血如水也神如魚也兩陽相熏灼水熱湯沸則魚驚躍不能安矣

風溫脉浮自汗身重多眠若被火者微則發黃劇則如驚癇時瘈瘲論見風溫

矣大抵傷寒汗吐下之後虛極之人或因事未決遂生驚悸者宜養血安神鎮心之劑或硃砂安神丸之類

悸

成悸心忪也築築惕惕然動怔怔忪忪不能自安也有氣虛而悸有停飲而悸有汗下後而悸者汗為心液汗去心虛如魚無水故悸

傷寒二三日心悸而煩者小建中湯少陰病四逆

或悸者四逆散加桂是氣虛而悸也陽氣內弱心下空虛故悸飲水多心下悸是停飲而悸也心為火而惡水水既內停心不自安則為悸也太陽病發汗過多叉手自冒心心下悸者太陽病若下之身重心下悸者不可發汗少陽病不可發汗汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸少陽病不可吐下吐下則悸而驚是數者皆汗下後挾邪而悸者也其治或鎮固之或化散之惟飲之為悸甚于他邪雖有餘邪必先治悸何者以水停心下無所不入侵于肺為喘嗽傳于胃為噦噎溢于皮膚為腫漬于腸間為利治不可緩也故經曰厥而心下悸宜先治水與茯苓甘草湯後治其厥厥病甚重猶先治水況病之淺者乎

太陽傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之方見腹痛

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之結代之脉動而中止能自還者名曰結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脉

炙甘草湯方一名復脉湯

甘草炙四兩　生薑切　桂枝去皮各叁兩

人參　阿膠各貳兩　生地黃壹斤

麥門冬去心　麻子仁各半升　大棗擘拾貳枚

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津耗散為枯五藏痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脉通心也

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也飲水多而小便利者則水不內蓄但腹中水多令心下悸金匱要畧曰食少飲多水停心下甚者則悸飲水多而小便不利則水蓄于內而不行必苦裏急也小便不利茯苓甘草湯裏急十棗湯

脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之發汗過多亡陽也陽受氣于胸中胸中陽氣不足故病叉手自冒心心下悸欲得按者與桂枝甘草湯以調不足之氣

桂枝甘草湯方桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾而緩中

桂枝去皮肆兩　甘草炙貳兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動也腎之積名曰奔豚發則從少腹上至心下為腎氣逆欲上凌心今臍下悸為腎氣發動故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤　桂枝去皮肆兩　甘草炙貳兩

大棗擘拾伍枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮

取三升去滓温服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者揚之無力取不助腎氣也

太陽病汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地眞武湯

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚 數逆小柴胡去黃芩加茯苓已過水陽 愚病要多不可吐下吐下則悸而驚人云尚未吐下脈沉緊者小柴胡湯又云已吐下發汗溫鍼譫語爲壞病蓋不可吐下者禁止之辭也未吐下者未經誤吐治但可和解而已吐下者失于誤治成壞病也活人于少陽證病證中云尚未可吐下八參一可悸恐未下隨

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇滿默默不欲飲食心煩喜嘔或心下悸或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可汗汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸 調胃承氣湯

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之 悸者加桂五分

厥陰傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫者四逆散加桂枝

霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

藏結與結胸痞氣大同小異

問曰病有結胸有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也何謂藏結荅曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治 [illegible] 如結胸狀飲食如故 [illegible] 於藏而舌上白胎又為胸寒外證上下俱病故難治也○王朝奉云可刺關元穴

藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也 [illegible] 法當 [illegible] 下無陽證為表無熱不往來寒熱 [illegible] 人反靜為裏無熱 [illegible] 有寒以表裏皆寒故不可攻○王朝奉云可刺關元穴 [illegible]

病胸中素有痞連在臍旁引入少腹入陰筋者此名藏結死

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也 [illegible] 浮而緊復下之緊反入裏則作痞由此推之風邪入裏則結胸寒邪入裏則為痞然此亦皆太陽病之所致非陰證之所為也又云病在陽應以汗解 [illegible] 此皆先生之說也

傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也宜半夏瀉心湯 [illegible]

結胸

心下痞結按之鞕滿而痛者結胸也按之鞕滿不痛者痞氣也經曰病發于陽 [illegible] 而反下之熱入因作結胸病發于陰 [illegible] 而反下之所作痞所以成結胸者下之太早也蓋表當汗反下之裏之正氣為下所損則表之全熱乘虛入裏結於心下為結胸也裏之陰分已受邪熱為病是謂發于陰也或熱微下證未全不任轉瀉而反下之則裏之微熱雖除而表之熱邪又至雖不結胸亦成痞也小結胸 [illegible] 于大結胸而重於痞也由誤之大

小非以痞爲寒也經謂但結胸無大熱者爲寒實結胸誠非寒也但熱微甚爾及夫藏結者經謂熱結于藏則爲病深故云難治若用涼劑而亦有生又陽結者熱結于府則微而淺也又留飲不散而成頭汗脉沉潛及附骨者積飲成水結胸也又有不因誤下而成結胸與痞者此又失下及夫反汗而成者也經謂熱已入裏久不攻之亦至結實名曰三死一生是失下也汗後熱氣傳入心下而痞者是失汗也結胸固知當下或脉浮大者又不可下下之則死是猶帶表邪未全結實故也又結胸證悉具加之煩躁者亦不治也六經所以能逐邪

者必待胃氣施布藥力始能温汗吐下以逐其邪邪氣勝胃氣絶者安可爲之

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈内拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣内陷心下因鞕則爲結胸大陷胸湯主之

懊憹皆熱爲實陽氣内陷氣不得通於膈壅於心下爲鞕滿而痛成結胸也與大陷胸湯以下結熱○再所按太陽病在表未嘗存表而攻裏可謂虛矣而況所得之脉浮而動數乎今得表而下動數變遲矣而又曰胃中空虛又曰短氣躁煩虛之甚矣借曰陽氣内陷心下因鞕而可迅攻之乎豈大陷胸之力發于府氣内陷已下者不可再下寧不畏其虛乎上文曰結胸脉浮大者不可下下者死又曰結胸證悉具煩躁者死今日脉浮又曰煩躁大陷胸果可用乎彼陽病實下後若胃中空虛客氣動膈心中懊憹者以施于梔豉湯吐胸中之邪況太陽大下後胃虛證乎

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞕者大陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷

胸湯主之

大陷胸湯方

大黃六兩去皮　芒硝壹升　甘遂壹錢爲末

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

結胸由邪在胸中處身之高分宜若可吐然所謂結者諸陽受氣於胸中邪氣與陽氣相結不能分解氣不通壅於心下爲鞕爲痛是邪正固結於胸中非虛煩膈實之所同是須攻下可也低者舉之高者陷之以平爲正結胸爲高邪陷下以平之故曰陷胸湯也

陷胸破結非苦寒直達者不能是以甘遂爲君內經曰鹹味湧泄爲陰又曰鹹以耎之氣堅者以鹹耎熱勝者以寒消是以芒硝鹹寒爲臣蕩滌邪寇除去不平將軍之功也陷胸滌熱是以大黃苦寒爲使利藥之中此駃劑也傷寒錯惡結胸爲甚非此不能通利劑大而數少須其迅速分解邪結也

此證經曰胃中空虛曰短氣躁煩曰脉浮此湯不可輕用

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

是過一腹而言之此云正在心下則少處不鞕痛可知矣蓋微於前故云小結胸也

小陷胸湯方

半夏湯洗半升　黃連壹兩　栝蔞實大者壹枚

右三味以水六升先煮栝蔞取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服一服未和再服微解下黃涎便安也

苦以泄之辛以散之黃連栝蔞實之苦以泄熱半夏之辛以散結

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

白散方

桔梗　貝母各三分　巴豆一分去皮心熬黑研如脂

右三味爲末內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

右熱實結胸及寒實結胸活人不拘寒熱但用陷胸湯不差者用枳實理中丸應手而愈

結胸項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸

大陷胸丸方

大黃半斤　葶藶熬　芒硝
杏仁去皮尖熬黑各半升
右四味擣篩二味内杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚别擣甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升温頓服之一宿乃下如不下更服取下爲效禁如藥法　海藏云大陷胸湯太陽入本藥也大陷胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大陷胸治熱實大陷胸丸兼喘小陷胸治痞

大黃苦寒之苦[illegible]以[illegible]葶藶杏仁之苦[illegible]所以[illegible]甘遂取其直達白蜜取其緩[illegible]以下[illegible]

心下滿痛如結胸狀若頭下強痛或目眩者刺大椎肝俞若汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白术湯[illegible]

大陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也　太陽病下之脉浮者必結胸也

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩　結胸證悉具煩躁者亦死　結胸脉浮大不可下下之則死[illegible]

[illegible]

死矣仲景所以[illegible]不[illegible]其[illegible]也其脉浮滑不[illegible]

附

活若誤下了初未成結胸者急頻與理中湯自然解了更不作結胸蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到

後因人消息得之若大段轉損有厥證者兼與四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也

西晉崔行功云傷寒結胸欲絶心膈高起手不得近用大陷胸湯皆不瘥者此是下後虚逆氣已不理而毒復上攻氣毒相摶結於胸者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神

枳實理中丸方

枳實拾陸片麸炒　茯苓　人參

白术　乾薑炮　甘草炙以上各貳兩

右爲末煉蜜丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加栝蔞根一兩自汗者加牡蠣二兩煅過下利亦加

海增損理中丸王朝奉云大小陷胸湯丸不愈者宜與之

人參　白术　栝蔞

牡蠣煅　甘草炙各貳兩　乾薑炒白半兩

枳實麩炒貳拾肆枚　黃芩去枯壹兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大湯一盞煎服一丸不解復與之不過五六丸胸中豁然矣藥之神速未嘗見也渴者加瓜蔞根有汗加牡蠣

活水結在胸脇間亦名結胸其證頭微汗出但結胸無熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣主之

孫兪伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫以爲溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至乃用半夏茯苓湯遂瘥衆問其故曰頭有汗心下滿非濕證乃水結胸脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當徧身汗若有食心滿頭豈得汗若言是表身又不疼不惡寒表證何在故凡水結胸脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯方見雷門

寒結散大實大滿心胸高起氣塞不通者爲結也

蟾酥　麝香　輕粉　巴豆炒另研許

右再研過至細以乳汁爲丸如黍米大每服二丸用薑湯下不時服

本婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤　滑石　甘草炙各壹兩　芒硝半兩

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胸膈血散膻中血聚則小腸壅小腸壅

膻中血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方疑非仲景然其言有理姑存之

或熱實結胸如仲景法治之又有寒實結胸雖痛而無煩躁等證此因下後虛逆寒氣獨結宜理中湯加枳實半錢茯苓一錢或枳實理中湯又有水結胸無大熱證頭微汗出宜小半夏茯苓湯又有血結胸手不可近其人嗽水不欲嚥喜忘如狂大便黑色小便自利宜犀角地黃湯

胸結胸之證嘗見俗醫不問曾下與未下但見心胸滿

悶便與桔梗湯便呼為結胸蓋本朱奉議之說也有頻頻與之反成眞結胸者殊不知結胸乃下早而成未經下者非結胸也乃表邪傳至胸中未入於府證雖滿悶尚爲在表正屬少陽部分爲半表半裏之間宜用小柴胡湯加枳殼如未効則以本方對小陷胸湯一服豁然其妙如神若因下早而成者方用陷胸湯丸分淺深從緩而治之不宜太峻上焦乃清道至高之分若過下則傷元氣也故陷胸湯丸宜從緩治之嘗讀仲景傷寒論結胸條云病發于陽而反下之熱入因作結胸病發于陰而反下之因作痞滿所以成結胸者以下太早故也

及成氏註釋曰發熱惡寒者發于陽也無熱惡寒發于陰也再三熟玩不能不致疑於其間蓋無熱惡寒者寒邪直中陰經之眞寒證也非陽經傳至陰經之病也若誤下之不死則危矣豈可以瀉心湯寒熱相參之藥治之而愈乎豈反輕如結胸者乎詳此恐言榮衛陰陽也風屬陽陽邪傷衛頭痛發熱微汗出反惡寒者當服桂枝湯止汗散邪醫者不達而下之胃氣重傷胸中結鞕經又云結胸證脉浮大者不可下下之則死結胸證悉具而煩躁者亦死蓋衛出上焦清道所傷不爲不重也設用陷胸湯峻利之藥以下之寒爲陰陰邪傷榮當服麻黃發表誤下之而成痞滿宜瀉心湯以理痞蓋榮出中焦黃連能瀉心下痞邪下于膈不犯清道則元不傷故輕于結胸耳若陰經自中之寒以泄心湯理之而愈者未之有也又云脉來沉實有力方爲結胸急用大陷胸湯加枳桔下之

治結胸灸法

巴豆拾肆個　黃連柒寸去皮

右搗細津唾和成膏塡入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

摘傷寒結胸　先使人心蔽骨下正痛處左畔揉之以毫針刺左畔支溝穴 [illegible] 次刺左間使名曰雙關次刺左行間 [illegible]

雲傷寒結胸痞氣

胸中結痞涌泉　太溪　中衝　大陵

心中結痞隱白　太白　少衝　神門

胃中結痞少商　太淵　大敦　太衝并上下中脘瀉之

通玄結胸身黃　涌泉

痞血結胸面赤大燥口乾消渴胷中疼痛不可忍

期門　太陵　關元妊娠不得刺關元胎死不出子母俱亡慎之

集傷寒胸脇痛　期門　太陵

活近世治結胸多用金針并用硫黃陽起石者若寒實結胸或有瘥者若熱實結胸必死也

傷寒結胸　附痞

痞

心下滿鞕而痛者為實為結胸鞕滿不痛者為虛為痞氣不滿不鞕但煩悶者為支結保命集云脾不能行氣於四藏結而不散則為痞大抵諸痞皆熱也故攻痞之藥皆寒劑其有一加附子者是以辛熱佐其寒涼欲令開發痞之怫鬱結滯非攻寒也先發汗或下後陽氣虛故惡寒汗出太陽證云發汗後惡寒者虛也此加附子恐大黃黃連損其陽也非補虛也

痞鞕傷寒嘔而發熱者柴胡證具而以他藥下之若心滿而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胸

傷寒痞

半夏瀉心湯方此方乘表未盡本理中人參黃芩湯方也

半夏洗半升　黃芩　乾薑

人參　甘草炙以上各三兩　黃連一兩

大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服若加甘草即甘草瀉心湯治痞鞕吐利若加生薑即生薑瀉心湯治痞鞕噫氣辛入肺而散氣半夏之辛以散結苦入心而泄熱黃芩黃連之苦以瀉痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩脾

痞鞕下利傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

成胃為津液之主陽氣之根大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞鞕金匱要略曰中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀也脇下有水氣腹中雷鳴土弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃

生薑瀉心湯方

生薑肆兩切　半夏半升洗　甘草炙

人參　黃芩各叁兩　黃連壹兩

乾薑壹兩　大棗拾貳枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之

傷寒痞　○六味方中[illegible]

成傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫反下之虛其腸胃[illegible]下利日數十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱[illegible]乾嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆[illegible]攻痞加甘草[illegible]故加生薑此[illegible]

甘草瀉心湯方

甘草肆兩　黃芩　乾薑各叁兩

半夏半升洗　黃連壹兩　大棗拾貳枚擘

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

成氣結而不散壅而不通為結胸陷胸湯為直達之劑塞而不通否而不泰為痞瀉心湯為分解之劑瀉心者謂瀉心下之邪也痞與結胸有高下焉邪結在胸中故曰陷胸湯痞者留邪在心下故曰瀉心湯內經曰苦先入心以苦瀉之瀉心者必以苦為主是以黃連為君黃芩為臣以降陽而升陰也內經曰辛走氣辛以散之散痞者必以辛為君故以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也陰陽不交曰痞上下不通曰滿欲通上下交陰陽必和其中所謂中者脾胃也脾不足者以甘補之故用人參甘草大棗為使以補脾而和中中氣得和上下得通陰陽得分水升火降則痞消熱已而大汗解矣

傷寒痞　○[illegible]

痞濡脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳[illegible]

心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之[illegible]

大黃黃連瀉心湯方

大黃貳兩　黃連壹兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而瀉虛熱

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之因惡寒汗出故加附子以溫經固陽

附子瀉心湯方

大黃　黃連　黃芩各壹兩

附子壹枚炮去皮臍破別煮取汁

右㕮咀以麻沸湯二升熱漬之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯活人云大汗出[illegible]先解表然表未解[illegible]心下妨悶者非痞也謂之支結[illegible]桂枝湯[illegible]加[illegible]

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之[illegible]

痞鞕吐利傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之

心下痞鞕嘔逆下利若表解身涼脇痛十棗湯主之方論並見脇痛

活人云十棗湯大柴胡湯皆治心下痞十棗尤難用須是表證罷不惡寒身涼其人漐漐汗出發作有時頭疼心下痞鞕滿引脇下疼乾嘔短氣者乃可用十棗湯表未解者慎不可用也

下利表裏未解 太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之成外證未除而數下之為重虛其裏邪熱乘虛而入裏虛協熱遂利不止而心下痞若表解而下利心下痞者可與瀉心湯若不下利表不解而心下痞者可先解表而後攻痞以表裏不解故與桂枝人參湯和裏解表

桂枝人參湯方

桂枝去皮　甘草炙各肆兩　白朮

人參　乾薑各叁兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再夜一服

表未解者[illegible]以數下之[illegible]

張或問大柴胡湯瀉也桂枝人參湯補也何為皆治下利心下痞鞕子曰此非裏實乃下之早因作痞裏虛協熱而利也不觀成氏註云若表解而下利心下痞者是裏實也可與瀉心湯若不下利表不解而心下痞者可先解表而後攻痞此以表裏不解故與桂

枝人參和裏解表夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者表和而裏病也以心中痞鞕故為實當以大柴胡湯下之二者心下痞鞕雖同而虛實之證有別故用藥有攻補之異也

痞鞕噫氣傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復代赭石湯主之（噫氣即俗所謂噯氣也活人書云有旋覆代赭石證其人或咳逆氣虛者先服四逆湯胃中寒甚者服理中丸次服旋覆代赭湯為良）

旋復代赭石湯方

旋覆花　甘草（各三兩）　人參（二兩）

代赭石（壹兩）　生薑（切五兩）　半夏（半升洗）

大棗（十二枚擘）

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服（硬則氣堅鹹味可以耎之旋覆花之鹹以耎痞鞕虛則氣浮重劑可以鎮之代赭石之重以鎮虛逆辛者散也生薑半夏之辛以散虛痞甘者緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱）

病解後心下痞鞕噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也若下利者前條生薑瀉心湯也

痞鞕氣上衝胸中痞鞕氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞕脇痛氣上衝咽眩冒者成痓（方論並見氣上衝門）

活人云下利而心下痞服生薑瀉心湯甘草瀉心湯利不止者當治其下焦赤石脂禹餘糧湯主之蓋生薑瀉心甘草瀉心皆治中焦此利在下焦若只治中焦則利益甚當服赤石脂禹餘糧利復不止當利其小便五苓散主之　又云凡痞服瀉心湯不愈然後可用陷胸丸下之（不可用陷胸湯蓋大猛只用陷胸丸）

發熱惡寒身痛表證未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也（方見太陽病若心下痞者先以桂枝湯解表却以大黃黃連瀉心湯攻痞）

心下滿似痞而手足厥冷若脉乍結乍緊心煩飢不欲食者瓜蒂散若脉沉細頭汗惡寒大便鞕者小柴胡湯（方見前）

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胷煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫易愈

脉浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈甚汗少則便難若脉遲尚未可攻　陽明痞且實心下鞕滿者不可攻之（方見前）

○附

桔梗枳殼湯　治傷寒痞氣胷滿欲絕

枳殼（去穰麩炒）　桔梗（各三兩）

右㕮咀以水二盞煎至一盞去滓分二服

活傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙緣桔梗枳殼行氣下鬲先用之無不驗也

趙活人書第七十六問中云凡痞服瀉心湯不愈然後可用陷胸湯下之愚詳仲景論陷胸湯無治痞之例恐太猛難用又況胸與心下處所不同痛與不痛陰陽邪亦異除結胸外今將痞證以傳經之邪與內陷之邪分為二種而下治焉一者病發于陰身無熱而反下之緊反入裏則作痞其脉關上沉為陰邪內

陷也先宜桔梗枳殼湯次半夏瀉心諸湯隨證用之服瀉心湯後渴而口燥煩小便不利者五苓散二者身有熱不因下後而傳邪入裏亦作痞其脉關上浮為陽邪隨經入裏須先解表而不惡寒者宜三黃瀉心又有心下痞而汗出惡寒者以陽邪與表之正氣入裏故表虛汗出而惡寒因加附子以固表也既結胸除有寒實熱實之殊則痞證亦有陰陽邪不為異也外有痞而鞕者旋覆代赭人參湯溫之或大柴胡湯十棗湯下之亦自早一律也活人書又云關浮則結熱三黃以瀉肝益熱結則成結胸非痞也況心下正屬中焦關脉亦主中部故湯名瀉心豈可援雜病脉例以左關為肝部因謂之瀉肝乎

張或謂痞證多有雜以別證而心下痞鞕者必非半夏瀉心之所宜也予曰證候不同宜從治療已上諸痞皆雜別證非特下早而成也仲景所以各從其宜用藥以治之若下早而作痞者但滿而不痛別無外證與半夏瀉心湯以攻痞宜也

吳夫痞者氣滯不通泰也若不因下早而為痞者或痰或食或氣為之結也保命集曰治痞用瀉心主之各有冷熱之不同要在辨而治之如熱實而為痞者

大黃黃連瀉心湯之類也或寒多而熱少半夏瀉心等湯之類也要之瀉心非瀉心火之熱乃瀉心下之痞滿也

心下滿

有不因汗下而心下滿者經曰邪結在胸心滿而煩飢不欲食當吐之又曰脉浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之吳氏曰按此言屬藏者宿屎在藏也不令發汗二者一吐一下因其邪之高下也又有不可下者如陽明病若心下鞕滿不可攻之攻之利不止者死利止者愈是邪在表裏之間留于心下未全入府故戒之不可下也有因汗下後心下滿而微痛者及吐下後心下逆滿宜桂枝白朮茯苓湯者又有下後心下鞕滿成結胸與痞者皆宜詳審而互考之

太陽服桂枝或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯　傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯　傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之此證人未解者心下滿悶謂之支又或欲水過多成水結者枳半夏茯苓湯　傷寒五六日大便後身熱不去心中結痛者梔子豉湯　傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯　太陽少陽併病心下鞕項強而眩者當刺大椎肺俞慎勿下

熨法若心胸脇下有邪氣結實滿悶鞕痛用生薑一斤搗爛絞去汁以查炒微燥帶潤絹包之于患處款款熨之稍可又將查用前汁和勻炒乾再熨許久豁然寬快此為良法

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便鞕脉細者此為陽微結有表復有裏也脉沉亦在裏假令純陰結不得復有外證脉雖沉緊不得為少陰病以頭汗出故知非少陰也宜小柴胡湯設不了了者得屎而解

陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈或下之或用瀉心湯〇陽明病腹滿者為邪氣入府可下之心下鞕滿則邪氣內或未全入府不可便下之得利止者為邪氣去下之安故若因下利不止者為正氣脫而死　得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之

厥陰病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩飢不欲食病在胸中須吐之瓜蒂散

吳氏凡心下滿者正在心之下胃之上也此自滿而非下之所致若下早心下滿者此為痞氣另有條也凡心下滿者以手按之揉之則散而軟者此虛氣也不發熱者以木香和中湯若發熱者以小柴胡加枳實

一錢去黄芩加薑汁炒黄連一錢減人參一半若按之汩汩有聲者此有停水也若按之鞕痛者有宿食也若不按而痛其人喜忘者畜血也各有本條宜詳審而治之凡少陽脉弦口苦發熱心下滿者以小柴胡加枳實黄連各一錢

心痛心下痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之成傷寒五六日邪氣在裏之時若大下後身熱去心胸空者為欲解若大下後身熱去而心結痛者結胸也身熱不去心中結痛者虛煩也結胸為熱結胸中為實是熱氣已收斂於內則外身熱去虛煩為熱客胸中未結為實散漫為煩是以身熱不去六七日為欲解之時以熱為虛煩故云未欲解也與梔子豉湯以吐除之　一身熱不去四字要玩結胸身不熱裏熱不在表故可用大小陷胸湯以承下之今熱仍在表故宜越之也成注未透

陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾無汗嗜卧身黄小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯詳胃實

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之

宜大承氣湯此少陰背水也青肝色也自利色青為肝邪乘腎經從前來者為實邪以腎蘊實邪必心下痛口乾燥也與大承氣湯以下實邪

厥陰為病消渴氣上衝心心中疼熱飢不欲食食則吐蚘下之利不止桂枝茯苓白朮湯

附

灸傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘氣海二穴　如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝二穴三陰交如無此證只用前穴

煩（舊以煩疼不類入之今詳煩疼者謂身體四肢疼痛煩冤與心煩不同下宜並入疼夫之）
煩者熱也謂煩擾也與發熱若同而異也須辨熱所
煩無時而歇非若發熱而時發時止也經有煩有微煩
有煩熱復煩反煩煩滿煩痛煩渴胸中煩心中煩內煩
虛煩大煩欲解皆以煩爲熱也然陰寒而煩者亦不少
也蓋在表而煩者則有脉浮惡風寒體強痛之證在裏
而煩者則有潮熱譫語不大便腹滿小便赤澀之證在
半表半裏而煩者則有往來寒熱胸脇疼痛之證其邪
在胸膈已上而煩者則有胸滿憒憒可吐之證其陰寒
而煩者則有惡寒而踡反下利厥逆脉微與夫吐蚘之
證大煩欲解者其脉必和但脉不應者爲難治若是足
冷脉沉細而微者此陰證之煩也忌用人參附子熱劑
濕之若內傷勞役陰虛火動而煩者其人身倦無力自
汗尺脉浮虛也宜補中益氣湯加炒黃連生地黃麥門
冬黃蘗知母之類也若不得眠而心煩者兼服朱砂安
神丸納其浮溜之火而安神明也此特其大槩耳善治
病者當以諸證互考之可也

虛煩胸中煩心中煩三者不因汗吐下而煩則是傳經
之邪不作膈實但以和解而已經用小柴胡湯黃連阿
膠湯豬苓湯是也若經汗吐下而煩則是邪熱內陷以
爲虛煩心中嗢嗢然欲吐憒憒然無奈者是也但多湯
吐而已經用梔子豉湯梔子乾薑湯梔子厚朴湯是也
蓋有不因汗吐下邪結胸中則爲膈實與瓜蔕散及陽
明心煩與調胃承氣湯此又煩之實者也傷寒二三日
悸而煩者虛也建中湯少陽之邪入府煩而悸者熱也
大抵先煩而後悸是熱先悸而後煩是虛治病必求其
本者此也

太陽傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜
桂枝湯（發汗身涼已解半日許身復熱者邪不盡也故當再汗）　太陽病初服
桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈
（[illegible]）

發汗
已脉浮數煩渴者五苓散　中風發熱六七日不解而
煩有表裏證渴欲飲水水入則吐曰水逆五苓散　病
在陽應以汗解反以冷水潠之若灌之其熱不得去彌
更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不
差者與五苓散（[illegible]）　傷寒吐下後七八日不解熱結
在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩者白虎
加人參湯　服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大
者白虎加人參湯主之
垣治陰虛發熱煩渴引飲肌熱躁熱至夜尤甚其脉

洪大按之無力者此血虛發躁當以當歸補血湯主之若以白虎湯與之則誤矣如輕手脉來浮大按之即無者乃無根蒂之脉為散脉也此虛極而元氣將脫也切不可發表攻熱如誤治之則死須用大劑人參生脉湯救之（當歸補血湯方見雜病發熱門）

太陽病發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯　傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯　發汗吐下後其人心煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯　若少氣者梔子甘草豉湯　若嘔者梔子生薑豉湯

梔子豉湯方

梔子（拾肆枚擘）　香豉（肆合綿裹）

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後服

經曰其高者因而越之其下者引而竭之中滿者寫之於內其有邪者漬形以為汗其在皮者汗而發之治傷寒之妙雖有變通終不越此數法也傷寒邪氣自表而傳裏留於胸中為邪在高分則可吐之所吐之證亦自不同如不經汗下邪氣蘊鬱於膈則謂之實也應以瓜蒂吐之瓜蒂散吐胸中之實邪也若發汗吐下後邪氣乘虛留於胸中則謂之虛煩應以梔子豉湯吐之此吐胸中虛煩者也梔子味苦寒內經曰酸苦涌泄為陰涌者吐也涌吐虛煩必以苦為主是以梔子為君煩為熱勝也涌熱者必以苦勝熱者必以寒香豉苦寒助梔子以吐虛煩故以為臣內經曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕重適其所以為治依而行之所謂良矣

梔子甘草豉湯　於梔子豉湯中加甘草壹兩餘依前法得吐止服

梔子生薑豉湯　於梔子豉湯中加生薑貳兩餘依前

法得吐止後服

傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之（成無己曰下後但腹滿而不心煩即邪氣入裏為實但心煩而不腹滿即邪氣在胸中為虛煩既煩且滿則邪氣壅於胸腹之間也滿則不能坐煩則不能卧故卧起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿）

梔子厚朴湯方（酸苦涌泄梔子之苦以涌虛煩厚朴枳實之苦以泄腹滿）

梔子（拾肆枚擘）　厚朴（肆兩薑炙）　枳實（肆枚水浸去穰炒）

以上三味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之（成無己曰丸藥不能除熱但損正氣邪氣乘虛留於胸中而未入深者則身熱不去而微煩與梔子乾薑湯吐煩益正氣）

吐煩正氣　按先藥所謂
神丹甘遂也或作巴豆
梔子乾薑湯方　若以湯之梔子之苦以吐煩辛以潤之乾薑之辛以益氣
梔子 拾肆枚　乾薑 貳兩
右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進
一服得吐者止後服
凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之　病人舊微溏者裏虛而寒在下也雖煩則非蘊熱故不可與梔子湯[illegible]
太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞕者與
小承氣湯和之則愈
右發汗吐下後心中懊憹而煩若無燥屎大便爽者
梔子等湯證也若有燥屎不大便者小承氣湯證也
傷寒煩　煩之五　六十六
痞結胸心煩 詳二門　心煩而渴 [illegible]
傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之　傷寒二三日邪氣在表未當傳裏之時心中悸而煩是非邪氣搏而所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建中湯先建其裏
太陽病脉浮緊無汗發熱身疼八九日表證仍
在此當發汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃
解　病欲解者必當先煩乃有汗而解　太陽病過經
十餘日心下嗢嗢欲吐而胸中痛大便反溏微滿鬱鬱
微煩 詳胸痛　傷寒脉浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣
急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之更厥咽中乾煩

躁吐逆者甘草乾薑湯 詳厥　太陽病吐之但太陽當惡
寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也　微數之
脉慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脉中
火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也　吐利汗後
脉平小煩者以胃虛不勝穀氣也
陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心下懊憹飢不
能食但頭汗出者梔子豉湯主之　陽明病脉浮緊若
下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上白胎者宜
梔子豉湯 詳喘　下利後煩按之心下濡者為虛煩也
宜梔子豉湯　陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩
傷寒煩　煩之五　六十七
必小便難此欲作穀疸 詳黃疸　陽明病下之心下懊憹而
煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻
之若有燥屎者宜大承氣湯　大下後六七日不大便
煩不解腹滿痛者本有宿食故也大承氣湯　陽明病
不吐不下心煩者可與調胃承氣湯 [illegible]
[illegible]　陽明病本自
汗更重發汗病已差尚微煩不了了者以亡津液胃中
乾燥故令大便鞕問其小便日幾行小便少津液當還
胃中故知不久必大便也　病人煩熱汗出則解又如
瘧狀日晡發熱屬陽明也

右胃實不大便心煩若吐下後者大小承氣證也若
不曾吐下者調胃承氣湯證也
〔許〕有人病傷寒入九日身熱無汗時時譫語時因下
後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得
臥但心中沒曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者
不知是何證予診之曰此懊憹怫鬱二證俱作也胃
中有燥屎者服承氣湯下燥屎二十餘得利而解仲
景云陽明病下之心中懊憹微煩胃中有燥屎者可
攻又云小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不
臥者有燥屎也承氣湯主之素問云胃不和則臥不

安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大便堅者必
譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非痛所
以心中懊憹也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱
也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也
〔少陽〕傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽不可汗汗之則
譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸（活人明謂調胃承氣湯）
胃滿而煩若不經汗下兼往來寒熱者小柴胡湯（詳往來寒
熱） 若汗下後往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯（[illegible]）
兼驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡桂枝龍骨
牡蠣湯（詳驚） 嘔時鬱鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者

大柴胡湯證也若極吐下後胸滿便溏腹痛者調胃承
氣湯證也
〔太陰〕傷寒脉浮而緩手足自溫者係在太陰當發身黃
小便利者身不發黃至七八日雖暴煩下利十餘行必
自止以脾家實腐穢當去故也（[illegible]云太陰病至七八日太[illegible]轉者爲太陰入府轉陽明也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去也[illegible]下泄故雖暴煩下利日十餘行而必自止[illegible]柴胡湯或用平胃散[illegible]）
〔少陰〕病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四
逆湯（詳欲寐） 若與白通湯後下利不止厥逆無脉乾嘔
煩者白通湯加猪膽汁（[illegible]）而煩格拒不通加人尿猪膽汁（[illegible]熱因寒用）

少陰病得之二三日心中煩不得臥黃連
阿膠湯 若下利六七日欬而嘔心煩不得臥者猪苓
湯 下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯 若惡寒而踡時
自煩欲去衣被者可治 脉緊至七八日自下利脉暴
微手足反溫脉緊反去爲欲解雖煩下利必自止
〔厥陰〕手足厥冷而煩若脉乍結乍緊及心中滿飢不欲
食者宜瓜蒂散吐之 蚘厥靜而復時煩（詳吐蚘）
病六七日手足三部脉皆至大煩而噤不能言其人躁
擾者欲解也 若脉和其人大煩目內際黃者欲解也

有表證宜汗　汗下後宜和解　無表證宜下宜

煩躁

煩爲煩擾之煩躁爲憤躁之躁俗謂焦躁是也合而言之煩躁爲熱也析而分之煩陽也爲熱之輕躁陰也爲熱之甚先煩而漸至躁者謂之煩躁先躁而後復煩者謂之躁煩有不煩而躁者此爲陰盛格陽也（雖大躁欲於泥水中但飲水不得入口者是也活人用霹靂散）又有邪氣在表而煩躁者（太陽中風脉浮而緊不汗出而煩躁大青龍湯是也）有邪氣在裏而煩躁者（病人不大便六七日繞臍痛煩躁發作有時此有燥屎是也）有因火劫而煩躁者（太陽病以火熏之不得汗其人必躁太陽病二三日反躁火熨其背令大汗出火熱入胃躁煩者是也）有陽虛而煩躁者（傷寒煩躁大陽證治之五）有陰盛而煩躁者（少陰）此皆證之常也又有諸不治證詳附于後不可不知

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯　發汗不徹太陽證不罷其人面色赤躁煩不知痛處更發汗則愈　太陽病大發汗後胃中乾煩躁不得眠欲飲者少與之若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散　因下之心下痞與瀉心湯痞不解渴而口燥煩小便不利者五苓散　得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯　煩躁不大便繞臍痛發作有時者有燥屎也　下之後復發汗晝日煩躁不得安眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯

乾薑附子湯方

乾薑（壹兩）　附子（壹枚去皮破八片生用）

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

（內經曰寒淫所勝平以辛熱寒太甚是以辛熱劑勝之也）

服乾薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱服以接心火身表寒盛外火少也寒從外生熱從內消譬如凍死寒在外也一法當寒服足少陰腎也寒邪入水冷服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之（發汗若下病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁與茯苓四逆湯以復陰陽之氣）

茯苓四逆湯方（四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰）

茯苓陸兩　甘草炙貳兩　乾薑壹兩半

人參壹兩　附子壹枚生用去皮破捌片

右五味以水伍升煮取三升去滓溫服七合日三服

煩躁心下鞕若未曾下者即前條無太陽柴胡證以小承氣少少微和之也若已曾下心下鞕痛短氣躁煩者大陷胸也若結胸證悉具煩躁者死也（方論見結胸）

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

傷寒煩躁　八條之五

桂枝去皮壹兩　甘草炙貳兩　牡蠣熬貳兩

龍骨各貳兩

右為末以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

（辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中火邪澀可去脫龍骨牡蠣之澀以收斂浮越之正氣）

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必清血名為火邪（成此火邪迫血而血下行者也太陽病用火熏之不得汗則熱無從出陰虛被火必發躁也六日傳經盡至七日再到太陽經熱氣當解若不解熱氣迫血下行必清血也清廁也[illegible]遂反不到不解者必緣反可奔而[illegible]人身則不可便註爲傳經盡也其言[illegible]不可知矣況於上文言一文則此承接[illegible]日及十餘日下文言一二日[illegible]上文[illegible]論日數不言傳經利也成氏不解熱到字）

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄下利者欲解也（方見譫語）

活人云大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽經傷風多煩而躁也

陽明病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯　大抵得病二三日脈弱無大柴胡證煩躁心下熱小便利屎定鞕以小承氣湯少少微和之然有病已瘥面赤微煩必大便鞕當問其小便日幾行若小便少津液當還入胃不須攻也

少陽傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰也

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之（方見吐）

傷寒煩躁　內條之五

少陰病吐利煩躁四逆者死　少陰病四逆惡寒身踡脈不至不煩而躁者死　少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩滿者必便血　傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安者為臟結死蚘厥雖厥而煩吐蚘已則靜非若臟厥躁無暫安時也　傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死　傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

傷寒得病無熱但狂言煩躁不安者五苓散服之二
錢新汲水一升許則以指探喉去之隨手愈
成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先
發躁而迤邐復煩者也從煩至躁爲熱未有不漸煩
而躁者也先躁後煩謂怫怫然更作躁悶此爲陰盛
隔陽也雖大躁欲於泥水中卧但飲水不得入口是
也此氣欲脫而爭譬如燈將滅而暴明矣蓋內熱曰
煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱爲
有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱
爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治

也
○附
活病人身冷脉沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也
宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火焰散丹砂丸
並主之
霹靂散 火焰散二方並見陰毒 丹砂丸方見兩人昌
海已寒丸此丸不僭上陽生於下治陰證服四逆輩胸
中發躁而渴者或數日大便秘小便澀亦服此丸上不
躁大小便自利
肉桂去麤皮 茯苓各五錢 良薑
烏頭炮各柒 附子炮 乾薑炮
芍藥 藿香炒各壹兩
右爲細末糊爲丸如梧桐子溫酒空心下五七十丸
八九十丸亦得酒醋爲糊俱可
本破陰丹治陰中伏陽煩躁六脉沉伏方論見陰毒
項年鄉人李信道得疾六脉沉伏不見深按至骨則
若有力頭疼身溫煩躁指末皆冷胸中滿惡心更兩
醫矣皆不識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也
仲景法中無此證世人患此者多若以熱藥以助之
則爲陰所隔絕不能導引真陽反生客熱用冷藥則
所伏真火愈見消爍非其治也須用破散陰氣導達

真火之藥使水升火降然後得汗而解矣乃授此藥
二百粒作一服冷鹽湯下不時煩躁狂熱手足躁擾
其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定略睡身已
中汗自昏達旦方止身涼而病除矣
戴煩躁陰陽經皆有之陽明經胃有燥屎故煩此當下
之太陽經已得汗而煩者五苓散少陽亦或有煩宜小
柴胡湯 陰煩少陰爲多由陽氣傳入陰經陰得陽而
煩自利而渴煩不眠者辰砂五苓散若非是陽氣傳陰
陰氣犯陰經吐利手足厥冷而煩經云陽虛陰乘之故

煩又云陰盛發躁欲坐井中吳茱萸湯甚者四逆湯加葱白二莖　外有虛煩一證乃是病愈後陰陽未復時發煩熱竹葉石膏湯痰多睡不寧者温膽湯嘔者橘皮湯

懊憹　憹即懊字古通用

成心中鬱鬱然不舒憒憒然無奈比之煩悶而甚者懊憹也由下後表之陽邪乘虛內陷結伏于心胸之間故如是也其治之法或吐之或下之苟或當下反吐療熱以寒則變證百出矣可不慎歟

太陽病脈浮動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也動數變胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹（梔子豉湯○詳見後）　發汗吐下後虛煩不得眠反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯　陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯　陽明病下之心中懊憹而煩有燥屎者大承氣湯　陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃（或用茵蔯湯梔子蘗皮湯）

欬

成欬則有聲無痰欬則有聲有痰也肺主氣形寒飲冷則傷之使氣逆而不散衝擊咽膈令喉中淫淫如痒習習如梗而欬嗽也甚者連續不止坐臥不安言語不竟動引百骸聲聞四近矣咳嗽有寒者有熱者有停飲者有在表者有在裏者有在半表半裏者病各不同治亦有異如停飲與表寒相合而欬者小青龍湯停飲與裏寒相合而欬者真武湯邪熱在半表半裏而咳者小柴胡湯欬為肺疾必發散而可已然又有不可發者經曰欬而小便利不可發汗發汗則四肢厥冷又曰欬而發

汗蹉而苦滿腹中復堅此為逆也又脈數者為心刑肺金則死

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之水飲於胃或乾嘔或噎水射於肺故喘或欬水停心下故渴水入腸胃故利水蓄下焦故小便不利少腹滿與小青龍湯散表寒行飲散水氣也傷寒之證變不一故有或為之證隨證而治之　傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

小青龍湯方

麻黃去節　芍藥　乾薑

細辛　桂枝去皮各三兩　五味子

半夏湯洗各半升　甘草炙三兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

加減法　若微利者去麻黃加蕘花如雞子大熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利蕘花下十二水水去利則止　若渴者去半夏加栝蔞根三兩辛燥而苦潤半夏辛而燥津液非渴者所宜故去之栝蔞味苦而生津液故加之　若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒

氣冷必相搏其人即䭇加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘去麻黃惡發汗　若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水蓄下焦不行為小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄蓄水於下加所當也　若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要略曰其人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

青龍象肝之兩岐而主兩傷之疾大青龍主榮衛之兩傷此則主表不解而又加之心下有水氣則非麻黃湯所能解桂枝湯所能散乃須小青龍始可祛除

表裏之邪氣耳表不解以麻黄發汗爲君桂甘草佐麻黄發散爲臣欬逆而喘肺氣逆也内經曰肺欲收急食酸以收之故用芍藥酸寒五味子酸温爲佐以收逆氣心下有水津液不行則腎氣燥急食辛以温之是以乾薑細辛味辛熱半夏味辛温微熱爲使以散寒水逆氣收寒水散津液通行汗出而解矣心下有水則所傳不一故又有增損之證水畜則津液不行氣燥而渴去半夏則津液易復栝蔞根苦微寒潤枯燥者也加之則津液通行水氣不行漬入腸間如下利者不可攻表麻黄專主發散非下利所宜故去

之芫花味苦寒爲湯泄之劑水去則利止芫花下水故加之噎者去麻黄加附子經曰水得寒氣必冷水寒相搏其人則噎噎爲胃氣虚竭麻黄發汗非胃虚冷所宜故去之附子味辛熱熱則温其氣辛則散其寒故用爲佐以祛散冷寒之氣　凡邪客于體者在外者可汗之在内者可下之在上者可湧之在下者可滲之水畜下焦小便不利小腹滿滲泄可也非發汗所宜故去麻黄加茯苓味甘淡專行津液内經曰濕淫于内以淡滲之是也　若喘者去麻黄喘爲氣逆麻黄發陽故去之杏仁味苦甘温加之以泄逆氣

金匱要略曰其形腫者不用麻黄乃用杏子以麻黄發其陽故喘逆形腫也

少陽傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔身有微熱或欬者小柴胡湯去人參加五味子乾薑

陽明欬而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥者必頭痛若但頭眩不惡寒能食者必咽痛（詳見[illegible]）

少陰病欬而下利譫語小便難者被火氣劫故也（詳下編）

少陰病四逆其人欬者四逆散加五味子乾薑各五分　少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯　少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人欬者眞武湯加五味子半升細辛乾薑各一兩

傷寒欬逆上氣其脉散者死謂其形損故也　欬而失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷（論見遺溺）

○附

雲傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參壹兩　五味子伍錢　桑白皮貳兩

款冬花　蛤蚧壹對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音嘶敗者宜

阿膠散

薯蕷　阿膠　五味子

麥門冬去心　白朮　乾薑炮

桂枝　杏仁去皮尖

右剉細每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯溢邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗　桑白皮　甘草

貝母　訶黎勒各伍錢

右為細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二鍾同煎服

人參石膏湯　治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭疼精神不利昏憒宜服

人參去蘆半錢　石膏壹兩　半夏湯泡

梔子仁　黃芩各壹錢　川芎

白朮　茯苓去皮　知母各一錢半

甘草炙貳錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

凡表寒咳嗽者脉浮惡寒身疼拘急而無汗也麻黃湯或三拗湯汗之痰唾如膠者金沸草散汗之若有熱者參蘇飲去木香人參加桑白皮杏仁麻黃汗之亦往但察天時與病情斟酌而用之也若虛弱人冒感風寒而咳嗽有痰或惡風頭疼乾嘔者宜人參杏仁湯凡傷寒二三日傳少陽經脉弦口苦發熱而咳嗽者小柴胡湯去人參大棗生薑加五味子乾薑主之若發熱胸中煩滿而欬者加炒瓜蔞若胸脇痞滿發熱而欬者加枳殼桔梗主之凡陰證手足冷脉沉細而咳嗽者四逆湯加五味大抵傷寒咳嗽非比雜證同也按仲景治例有欬者不分陰陽二證俱用五味子乾薑也蓋五味收肺氣而止嗽以乾薑之辛溫肺經散逆氣也

射干湯　治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏于內咳嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

射干　紫菀　當歸　獨活

麻黃　甘草各　生薑炮　橘皮

肉桂去皮　枳實麩炒　半夏湯洗　杏仁去皮尖炒

右㕮咀每服伍錢水一盞半煎至八分去滓溫服

直視 目中不了了

成直視者視物而睛不轉動也睛轉者非也水之精為志火之精為神目者心之使也神所寓焉肝之外候也精神榮焉針經曰五藏六府之氣皆上注于目而為之精 五藏氣血調和精氣充榮則目和而明矣邪氣壅盛冒其正氣則神識不慧藏精之氣不上榮于目則目為之直視傷寒直視邪氣已極證多難治

經曰衄家不可發汗汗則額陷脈緊急直視不能眴

以肝受血而能視亡血家肝氣已虛木氣又弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此雖逆未為甚又直視與目中不了了形證相近一可治一不可治也

太陽衄家不可發汗汗出則額上陷脈急直視不能眴不得眠 汗後身猶灼熱名風溫脈陰陽俱浮自汗身重多眠語言難出若被下者小便不利直視失溲

陽明傷寒吐下後不解不大便至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濇者死

直視譫語喘滿者死下利者亦死

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

又若戴眼反折者此為上視絕汗乃出大如貫珠不流此爲膀胱絕也其目中不了了能視物但見一半而不見一半有所譫妄而胡言者是也若內實不大便者宜下之內虛者多難治也

鬱冒　音讀　舊以又手冒心是入今去之　一

成鬱為鬱結而氣不舒冒為昏冒而神不清俗謂之昏迷是也皆因虛乘寒所致經曰諸虛乘寒者則為厥鬱冒不仁此寒氣乘虛中上也駱龍吉以附子湯倍人參川芎天麻乾薑之類主之又曰太陽病先下之不解因復發汗以此表裏俱虛其人因冒冒家汗出自愈由表和也若不得汗不解者以人參三白湯加川芎天麻如下虛脉微者加附子以溫腎經乃固本也經曰滋苗者必固本伐下者枯其上此之謂也要略曰新產婦人有三病一痓二鬱冒三大便難亡血復汗寒多故鬱冒又曰產婦鬱冒其脉微弱不能食大便堅者蓋由血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出觀此則鬱冒為虛寒可知矣又少陰病下利止而頭眩時時自冒者死以其虛極而脫也

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也裏未和然後復下之（成氏以鬱謂冒起未詳按說文冒字从冃从目冃細小兒及蠻夷頭衣也此致冒者謂若物蒙蔽其目也是昏迷之義今以冒為鬱不惟失六書之本旨且失病情及仲景之意也裏未和時刻作得裏和或增未字而不失得字則并於文理今以宋本正之）

諸乘寒者則為厥鬱冒不仁口急不能言戰慄也

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞕者當刺大椎肺俞肝俞

陽明病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥有燥屎也宜大承氣湯

少陰病但欲寐下利止而頭眩時時自冒者死

厥陰下利清穀脉沉遲其人面赤身有微熱必鬱冒汗出而解

傷寒吐下後虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六脉細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱結膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上迫熏肺所以神昏也蓋肺為清肅之藏內有火邪故令神昏宜梔子黃連黃芩湯若脉在丙者導赤散脉在丁者瀉心湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脉沉滑有力者則可用之或用犀角

地黃湯近於是已本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中熱藥若脉浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉心湯各半服之則宜矣此證膀胱傳丙足傳手經者下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者艮之離也越經傳者又爲府傳藏也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脉與外證治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必矣

脉在丙者脉浮也脉在丁者脉沉也脉丙丁俱有熱者浮沉俱有力也

余雲衢太史形氣充壯飲啖兼人辛卯夏六月患熱病肢體不甚熱而間揚擲手足如躁擾狀昏憒不知人事時發一二語不可了而非譫也脉微細如欲絕有謂是陰證宜溫者有謂當下者時座師陸葵日先生與曾植齋馮琢菴二太史皆取決於余余謂是陽病見陰脉在法爲不治然素禀如此又值酷暑外爍酒炙内炎宜狂熱如焚脉洪數有力而此何爲者豈熱氣怫鬱不得伸而然耶且不大便七日矣姑以大柴胡湯下之時大黃止用二錢又熟煎而太醫王雷菴力爭以爲太少不若用大承氣余曰如此脉證豈宜峻下待大柴胡不應而後用調胃承氣調胃承氣不應而後用小承氣以及大承氣未晚也已服藥大便即行脉已出手足溫矣余謂雷菴曰設用大承氣能免噬臍之悔哉繼以黃連解毒湯數服而平七月初遂與陸先生同典試南京不復發矣明年余請告歸里偶得劉河間傷寒直格讀之中有云畜熱内甚脉須疾數以其極熱畜甚而脉道不利反致脉沉細而欲絕俗未明造化之理反謂傳爲寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證候者或兩感熱甚者通宜解毒加大承氣下之下後熱稍退而未愈者

黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脉微而昏冒將死若急下之則殘陰暴絕而死盖陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯養陰退陽積熱漸以宣散則心胸再暖而脉漸以生然後撫卷而嘆曰古人先得我心矣余太史所患正失下熱極以至身冷脉微而昏冒欲絕者也下與不下大下與微下死生在呼吸間不容髮嗚呼可不慎哉宜表而出之以爲世鑒

不能言

成不能言及語言難出有二證其六一則太陽風溫其六二則少陰咽中生瘡是皆傳經之邪熱氣壅閉所致陰寒之證氣血通行則關節開張語言出矣

太陽發汗已身猶灼熱名風溫脉尺寸俱浮自汗身重多眠鼻鼾語言難出詳風溫

少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者苦酒湯

奚凡瘖瘂不言有六一者少陰病咽中傷生瘡不能語言者以雞子苦酒湯主之二者狐惑傷寒上唇有瘡咽乾聲嗄者治見本條三者痙證口噤不能言者

亦見本條四者熱病喑啞不言三四日不得汗出者死五者熱甚火傷肺金不能言者宜清肺降火則愈六者風熱壅盛咳嗽聲嗄者以消風降痰火治又有失於發散風邪伏于肺中者當發散之

鼻鼾鼻鳴

成風溫則鼻鼾太陽中風則鼻鳴由風氣壅塞衛氣不利所致陽明少陽三陰雖亦有中風然邪不在表故鼻不鳴而不鼾也

太陽中風陽浮陰弱陽浮熱自發陰弱汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯　汗已身猶灼熱脉浮自汗身重多眠鼻鼾語言難出不可下不可火

傷寒證治準繩帙之五

金壇王肯堂輯　門人南昌張　綍校

小便不利　小便入難

成小便不利有數種被下而小便不利者津液耗於内也因汗而小便不利者津液亡於外也發黃與痞及夫熱病小便不利者熱鬱所致風濕相搏與夫陽明風中其小便不利寒邪所乘其小便難者亦多由汗下而然宜詳辨之

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯去麻黃

加茯苓（方見欬）　太陽病大發汗後胃乾煩躁不得眠欲飲水小便不利脉浮者五苓散不浮者猪苓湯　本以下之心下痞與瀉心湯痞不解渴而口燥煩小便不利者五苓散　服桂枝湯或汗或下之仍頭項强痛翕翕發熱無汗心滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白术湯　太陽病飲水多必心下悸小便少者茯苓甘艸湯（方見悸）　若無身黃而小腹鞕脉沉結者茵蔯湯（方見黃）　若表未解及下之不結胸但頭汗出小便不利者必發黃亦茵蔯湯（梔子蘗皮湯）

陽明病而合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病小便不利若中寒不能食手足濈然汗出大便初鞕後溏者此欲作固瘕　若能食大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈　或無汗心中懊憹或被火額上微汗出或頭汗出身無汗劑頸而還渴引水漿皆欲發黃之候　若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之（此浮字誤也活人云脉浮者五苓散脉沉者猪苓湯則知此證若脉字下脫一不字也按太陽篇内五苓散乃猪苓澤瀉茯苓三味中加桂白术也陽明篇内猪苓湯乃猪苓澤瀉茯苓三味中加阿膠滑石也桂與白术味甘辛為陽主外阿膠滑石味甘寒為陰主内南陽之言亦可思不失仲景之旨矣第南陽欲言易二藥分曉又覺筆下以沉對浮遂使後人致疑三陽經中不當言脉沉更不復致疑矣

久之有闕也更詳太陽證固當脉浮而陽明爲表之裏故具脉不曰浮而曰長蓋長者不浮不沉之中脉也成氏自以脉浮釋之而朱氏却以脉沉言之齊失之矣若曰脉浮者五苓散不浮者猪苓湯則得仲景之意矣又於少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯一證雖不言脉沉然少陰之脉必沉耳豈活人以少陰對太陽一證而示與以此參之成氏隨文淺釋明矣）　病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯　得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞕後必溏須小便利屎定鞕乃可用大承氣攻之

少陽傷寒五六日中風往來寒熱胸脇痛不欲食心煩

喜嘔或心下悸小便不利者小柴胡湯　傷寒五六日已汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗心煩往來寒熱爲未解柴胡桂薑湯　傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯

少陰小便不利而大便自利腹痛爲少陰病　兼四肢沉重有水氣者眞武湯　兼便膿血者桃花湯　兼四逆者四逆散加茯苓

厥陰傷寒殘而腹滿視其前後知何部不利利之則愈前部爲小便小便不利脉浮者五苓散不浮者猪苓湯

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬風濕宜甘草附子湯　若脉沉緩大便反快者屬濕痺活人用五苓散

○附

活陰證小便不利手足厥冷脉微細者不宜服利小便冷滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之

集傷寒小便不通取陰谷　陰陵泉

吳凡傷寒小便不通刺任脉一穴在臍下一寸用長針入八分又灸支溝二穴在手腕後三寸兩骨之間陷中針入二分凡傷寒小便不利當分六經治之太陰少陰詳見本條太陰腹滿自利小便不利無熱脉沉者理中湯合五苓散更加厚朴木香分利其小便而大便自止厥陰寒閉厥冷脉伏囊縮入腹小便不利宜四逆湯通草茯苓或灸氣海石門穴或以葱熨法治之若陰虛火動小便赤澁不利者加木通生地知母黄蘗凡内熱盛大便不通小便赤澁不利者八正散治之凡不渴小便不利者熱在血分也宜知母黄蘗生地之類夫膀胱爲津液之府氣化而能出也若汗多者津液外泄小便因少不可利之恐重亡津液待汗止小便自行又小便自利不可妄利之恐引熱入膀胱則變畜血又爲害也

小便難汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯　若太陽證中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黄陽盛陰虛欲衄小便難也　若少陰以火劫汗者則欬而下利譫語小便難也

下後小便難有二若脉遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身黄項強小便難也　若陽明胃實發熱惡寒脉浮緊下之者則腹滿小便難也

脇痛身黄小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下後不食項強者忌柴胡

趙傷寒小便難仲景論有發汗漏不止桂枝加附子湯者有陽明中風或脈弦浮大而潮熱噦者或脈浮而緊誤下而成腹滿者又有陽明脉浮遲飽則微煩頭眩者活人問中當以傳經邪熱與漏風亡陽分作兩條其桂枝加附子湯證乃亡陽經虛所致豈得均謂之陰虛陽湊爲有熱耶要當以小柴胡證及誤下證發疸證次於陽湊傳邪之下却別出一條云外有汗多亡陽津液不足亦有小便難者還以桂枝加附子湯證屬之

小便自利　小便數

成小便自利有在表者有在裏者有熱而利者有寒而利者六經俱有之證難以槩治宜考經條分之可也小便數者三陽有在表者有在裏者三陰並無小便數之證宜詳察之

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂以熱在下焦小腹當鞕滿小便自利者下血乃愈抵當湯　太陽病身黃脉沉結小腹鞕小便自利其人如狂血證也抵當湯　傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸　傷寒十三日不解過經譫語小便利而大便亦下利脉反和調胃承氣證詳譫語　太陽中風火劫汗後發黃欲衄小便難頭汗出腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦捻衣摸牀小便利者可治詳見發黃　太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急小便不利甘草茯苓湯　傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯若其人小便自利去桂枝加白朮湯　傷寒發熱惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗小便利爲欲解此肝乘肺名曰横刺期門

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必
苦頭痛(詳頭痛)　得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁
心下鞕以小承氣微和之不大便六七日小便少者雖
不能食但初鞕後溏未可攻小便利大承氣湯　傷寒
脉浮而緩手足自温係在太陰當發身黄若小便自利
不能發黄至七八日大便鞕為陽明病也大承氣湯
陽明病自汗更發汗小便自利為津液内竭屎雖鞕不
可攻之宜蜜煎導而通之猪膽汁或土瓜根皆可為導
太陰傷寒脉浮而緩手足自温係在太陰當發黄小便
自利不發黄至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止
按以上數條皆以小便自利為病蓋以驗病之下與
不當下也若小便不利而少腹鞕者屎也當滲泄之
若小便自利而少腹鞕者非血則糞也當通利之且
病之發黄與不發黄及病之欬與不欬皆可於此而
驗之焉
少陰病二三日至四五日腹滿小便不利四肢沉重疼
痛自下利者為有水氣或小便利真武湯(詳下利)　既吐
且利小便復利而大汗下利清穀内寒外熱脉微欲絶
者四逆湯
厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小

便利色白者此熱除也欲得食為病愈
小便數傷寒脉浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急者
慎不可行桂枝湯(甘草乾薑湯 芍藥甘草湯)
趙太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚
攣急若小便數者慎不可行桂枝也宜與甘草乾薑
湯芍藥甘草湯此虚寒所致與上文客熱等證全不
相合又多四肢拘急難以屈伸八字即係前篇小便
難之證今却添入於此問小便數之下何耶又云傷
寒脉浮便數若胃中不和譫語者少與調胃承氣湯
蓋仲景論中此論専主胃氣不和譫語未嘗無治脉
浮自汗小便數之證何不曰若服甘草乾薑湯後胃
氣不和譫語者少與調胃承氣湯不亦宜乎
趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大
便則難其脾為約麻仁丸　太陽病汗吐下後微煩小
便數大便因鞕與小承氣湯和之則愈　太陽病寸緩
關浮尺弱其人發熱汗出惡寒不嘔但心下痞者下之
早也如其不下病人不惡寒而渴者此轉屬陽明小便
數者大便必鞕
吳凡小便數者頻欲去而不多也太陽陽明治各有
條凡腎虚有熱小便頻數者清心蓮子飲或人參三

白湯加知母黃蘗麥門石蓮肉之類或服滋補丸亦佳或補中益氣加知母黃蘗生地黃麥門冬主之

遺溺

三陽合病腹滿身重難轉側口中不仁面垢譫語遺尿自汗者不可汗不可下宜少與白虎湯詳身重

風溫病脉浮自汗出體重多眠若下之則小便不利直視失溲詳風溫

楊氏士瀛曰膀胱蓄水下焦不攝則亦遺溺經云邪中下焦陰氣為慄足膝逆冷便溺妄出合用四逆湯下焦畜血小腹結急小便自利不禁輕者桃仁承氣湯重者抵當湯

寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而吞酢中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷

太陽病火熨其背大汗出譫語十餘日振慄下利欲小便不得反嘔而失溲者此為欲解也詳譫語

遺溲狂言目反直視者此為腎絕

[案]凡遺尿者小便自出而不知也其熱盛神昏遺尿者為可治若陰證下寒逆冷遺尿脉沉微者多難治

宜附子湯加乾薑益智子以温其下也若厥陰囊縮逆冷脉微遺尿者四逆加吳茱萸湯温之陽不廻者死凡傷寒汗下後熱不解陰虚火動而遺尿者以人參三白湯加知母黄蘗或補中益氣湯加知母黄蘗麥門冬生地黄五味子之類主之若狂言直視譫語遺尿者此為腎絶内經言膀胱不利為癃不約則遺溺又曰水泉不止者膀胱不藏也盖腎與膀胱為表裏腎虚則膀胱之氣不約故遺尿也要在滋補膀胱之氣也東垣謂溲便遺失為肺金虚又當補肺氣也大抵肺虚腎虚熱甚者皆可治惟腎絶遺尿則不可治此下焦氣絶不歸其部故也

噫氣

說文云噫飽食息也於介切俗作噯傷寒有二證皆由誤汗吐下胃氣弱而不和虚氣上逆心下痞鞕故下利者生薑瀉心湯不下利者旋復代赭石湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復代赭石湯主之

○附

云傷寒噫氣者何氣使然答曰胸中氣不交故也少陰經至胷中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜如聖加枳實湯

如聖加枳實湯方

甘草　桔梗各四錢　枳實麩炒三錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯

如聖加人參藿香杏仁湯方

甘草　桔梗　人參

藿香　杏仁各等分

右剉細每服五錢水煎服

噦（即吃逆）

噦即俗所謂吃逆雜病辨之甚詳按說文噦氣牾也於月切又乙劣切乙劣之訛遂為吃逆亦猶俗呼團為突欒角為葛洛其故明矣名世如東垣亦謂噦是乾嘔之重者不知有聲無物皆為乾嘔豈以輕重分為二病哉至所云欬逆者即今之喘嗽是也乃與吃逆混而為一或以為噦皆不攷之過而得失利害係焉不可以不辨

胃寒傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也（或人吐大下胃氣極虛復極發汗又汗出外和煩擾於表時身熱醫與之水以發其汗胃虛得冰）

虛實相搏則噦也（○吳茱萸湯理中湯○活人用橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散）

活人云若服藥不瘥者灸之必愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指為率男左女右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脈是

胃熱陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦脈續浮者與小柴胡湯若不尿腹滿加噦者不治（詳胃實）

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈（仲景無方活人云前部宜猪苓湯後部宜調胃承氣湯）

胃中虛冷不能食者飲水則噦　與小承氣湯入腹中不轉失氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦（詳潮熱）

本渴而飲水嘔者柴胡不中與也食穀者噦（詳脇）　陽明病胃實不能食者攻其熱必噦　濕家頭汗出背強惡寒欲覆被向火者下之早則噦（詳濕病）

太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語甚者至噦捻衣摸牀小便利者可治（詳見頭汗）

○附

橘皮乾薑湯

橘皮　通草　乾薑（炮）

桂心　甘草（炙各貳兩）　人參（壹兩）

右剉如麻豆大每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

羌活附子散　治吃逆

羌活　附子（炮）　茴香（微炒各半兩）

木香　乾薑（炮各如棗許大）

右為細末每服二錢水一盞鹽一捻同煎一二十沸帶熱服一服止

半夏生薑湯　治噦欲死

半夏（洗壹兩貳錢半）　生薑（貳兩）

右以水二盞煎至八分去滓分二服溫服

失下 海藏云傷寒咳逆脈散死　仲景之言不虛僞
大抵原因失下生　欬逆喉中陰不內　便軟惟宜用
瀉心　便鞕尤宜大承氣　二藥神工作者誰　東垣
潔古為良劑

潔 欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便
祕者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海 少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不
內也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰
入不內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養

陰退陽而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦
可若脈左浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以
然欬逆舌強右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞
而渴逆者五苓散主之別無惡候是也惡候生或兼以
舌攣語言不正而反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜
大承氣湯也何以脈浮為表浮之實大沉之損小是為
表也浮之實大沉之亦然即非表也邪入已深矣內熱
當沉反浮陽極復之表也

陰證 者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火
已病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胸中

亦欲盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺
熱他人按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根
之火也故用丁香乾薑之類熱藥溫胃其火自下

勻氣散

用川烏大者炮去皮臍　為細末每服三錢用黑豆二
十一粒砂糖同泡湯調乘熱細細飲之

治陰毒吃逆方本事

川烏頭　乾薑　附子炮去皮　肉桂
芍藥　半夏　炙甘草　吳茱萸
陳皮　大黃各等分

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分
去查溫服

肉荳蔻湯治傷寒汗後吃逆噫氣

肉荳蔻壹箇　石蓮肉炒　檀香各壹兩　人參
丁香各半兩　枇杷葉伍片拭去毛炙

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去滓空心溫服
分二服

良薑湯

橘皮　良薑　桂枝　當歸各壹兩
杏仁貳拾箇　麻黃　甘草各半兩　檳榔炙一箇另為末

右㕮咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去查下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服龐老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃逆無休止宜服此方

扁鵲中藏經治傷寒欬逆丁香散丁香柹蔕各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱猛喫極効

右以上五方陰證所宜

三因橘皮竹茹湯見雜病吃逆門

右方陽證所宜

治傷寒吃逆救急方

香附子　橘核炒各半兩

右細剉用酒半盞先將藥置銀石器內炒漸漸滴酒炒藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋呷服一方單用香附子末

又方大蒜頭二箇煨爛研爆入白薑末各一錢炮研和如梧桐子大搗韮菜自然汁吞下二十丸病退再服一十五丸

[吴]吃逆者氣上逆而為吃忒也醫方或以為欬逆者非也經曰欬逆上氣脉散者死謂其形損故也成無已注引千金方云欬逆上氣乃咳嗽也言心火以刑肺金其氣噴逆而為嗽喘也若肺絶則脉散皮毛焦折而死故曰形損也與吃逆何相干哉吃逆有因胃熱失下而作者且其氣皆從胃至胸嗌之間而為吃忒矣易老治法失下胃熱內實大便鞕者以承氣湯下之便軟者以瀉心湯主之胃虛有熱者橘皮竹茹湯有痰飲者半夏生薑湯或茯苓半夏湯若胃冷者橘皮乾薑湯加味理中湯要略言其氣自臍下直衝于胸嗌間吃逆者此陰證也其病不在胃也且病下虛內以伏陰或誤用寒涼遂致冷極于下迫其相火上衝率集于胸中以為吃忒亦欲盡也病人煩躁

自覺甚熱他人以手按其肌膚則冷此為無根失守之火散亂為熱非實熱也乃水極似火若不識此誤用涼藥下咽則敗矣凡治須用活人羌活附子散或加味附子湯急溫其下真陽一回火降吃逆自止也如冷極吃逆不止者或蒸以硫黃乳香散嗅法或灸期門中脘臍元氣海但要取手足溫暖脉生陽回陰退則生矣

瘧狀

瘍瘧狀作止有時非若寒熱往來或踈或數而作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節拘攣百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧　脉自弦或洪數或緊實或虛緩或刮澀皆為瘧狀但以外證別之用藥固有本條小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝一證雖各有一方皆當以川芎為佐

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者為欲愈也

脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯　服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯（成氏曰如服[illegible]大汗出脉洪大者[illegible]在也若形如瘧日再發者邪氣客於榮衛之閒也與桂枝二麻黃一湯以解散榮衛之邪）

桂枝二麻黃一湯方

桂枝（叁錢去粗皮）　芍藥（叁錢）　麻黃（去節[illegible]錢[illegible]分）

生薑（叁錢切）　甘草（[illegible]）　杏仁（去皮尖[illegible]）

大棗（貳枚[illegible]）

右七味以水二鍾先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一鍾去滓分二服

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯（雖有陽明證未可便為裏實審看脉候以別內外其脉實者熱已入府為實可與大承氣湯下之其脉浮虛者是熱未入府猶在於表也可與桂枝湯發汗則愈）

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故為瘧狀發作有時小柴胡湯主之（詳婦人傷寒）

舌胎

舌上白胎陽明病脇下鞕滿不大便而嘔者小柴胡湯主之

陽明病脉浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹者梔子豉湯主之方見 濕家但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利者丹田有熱胸中有寒也

診脉陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥踡臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日已來其人微發熱手足溫者此為欲解或到八日已上反大熱者此為難治

設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

藏結如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽證不往來寒熱其人反靜者不可攻也

成無己云舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥澀黃黑是數者熱氣淺深之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎矣邪初傳未全成熱或在半表或在半裏或邪氣客於胸中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒邪初傳入裏也

陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胸中也若病在臟宜若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熱猶帶表寒故也及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澀也經曰傷寒七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也

宜下 若熱聚於胃則為之舌黃是熱已深矣金匱要略曰舌黃未下者下之黃自去 若舌上黑色者又為熱之

極也鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心為君主之官開竅於舌黑為腎色見於心部心部者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

但下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胸中有寒分別之胃有後寒加辛熱之劑立效 舌燥澁如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上揩之其刺立消神效

無薄荷蜜治舌上白胎乾澀語話不真先以生薑厚片蘸蜜水揩洗次用薄荷自然汁與白蜜等分調勻傅之良

陶傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑用井華水浸青布片洗淨後用生薑切作片子時時浸水刮擦之其胎自退凡見黑胎如芒刺者必死此熱毒入深十有九死蓋腎水尅心火也　又舌吐不收者用冰片少許摻舌上即收

○附杜清碧驗證舌法

白胎舌

舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之證也宜小柴胡湯梔子豉湯治之

將瘟舌



舌見紅色熱畜於內也不問何經宜用透頂清神散治之

透頂清神散方

豬牙皂角　細辛　白芷

當歸各等分

爲細末和勻令病人先噙水一口以藥少許吹入鼻內吐去水取嚏爲度未嚏仍用藥吹入凡瘟疫之家不拘已未患者皆宜用之

中焙舌



舌見紅色內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君火熾盛反兼水化宜涼膈散大柴胡湯下之

生瘢舌



舌見紅色而有小黑星者熱毒乘虛入胃蓄熱則發斑矣宜用玄參升麻葛根湯（即玄參升麻湯加葛根）化斑湯解之（化斑湯即白虎加人參湯）

紅星舌

舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不勝者假火勢以侮脾土將欲發黄之候也宜用茵蔯五苓散治之

黑尖舌

舌見紅色尖見青黑色者水虛火實腎熱所致宜用竹葉石膏湯治之

裏圈舌



舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒遺於心胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是症也以承氣湯下之

人裂舌

疫亦有此形

舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火燔灼熱毒炎上故發裂也宜用涼膈散

蟲碎色

舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾甚火在上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之

裏黑舌



舌見紅色內有乾鞭黑色形如小長舌而有刺者此熱毒熾甚堅結大腸金受火制不能平木故也急用調胃承氣湯下之

厥陰舌



舌見紅色内有黑紋者乃陰毒厥于肝經肝主筋故舌見如絲形也用理中合四逆湯溫之

死現舌

舌見黑色水尅火明矣患此者百無一治治者審之

辯余在留都時地官主事鄭汝東妹壻患傷寒得此舌院内醫士曾禧謂當用附子理中湯人咸驚駭遂止亦莫能療困甚治棺曾與之鄰往視之謂用前藥猶有生理其家既待以死拚從之數劑而愈大抵舌黑之證有火極似水者即杜學士所謂薪為黑炭之意也宜涼膈散之類以瀉其陽有水來尅火者即曾醫士所療之人是也宜理中湯以消陰翳又須以老生薑切平擦其舌色稍退者可治堅不退者不可治弘治辛酉金臺姜夢輝患傷寒亦得此舌手足厥逆吃逆不止衆醫猶作火治幾致危殆院判吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之為道有是病必用是藥附子療寒其效可數柰何世皆以為必不可用之藥寧視人之死而不救不亦哀哉至於火極似水之證用藥得宜効應不異不可便謂百無一治而棄之也

黃胎舌



舌見尖白根黃其表證未罷須宜解表然後乃可攻之如大便秘者用涼膈散加硝黃泡服小便澀者用五苓散加木通合益元散加薑汁少許以白滾湯調服

黑心舌

舌見弦白心黑而脉沉微者難治脉浮滑者可汗沉實者可下始病即發此色乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之

十五舌

舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如欲水不至甚者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此亦危證也

十六舌



舌見白胎中有黑小點亂生者尚有表證其病來之雖惡宜涼膈散微表之表退即當下之下用調胃承氣湯

十七舌

舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門也宜急下之服解毒湯下三五次遲則難治如初服量加大黃酒浸泡

十八舌

舌見微黃色者初病即得之發譫語者由失汗表邪入裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩停主之

雙解散加解毒湯方

防風　川芎　當歸　芍藥

大黃　麻黃　連翹　芒硝

荊芥　白朮　梔子各半兩　石膏

黃芩　桔梗各壹兩　甘草貳兩　滑石叁兩

右每服一兩水一鍾半生薑三片煎八分服不拘時

一云有桂枝二兩

十九舌

舌中見白胎外則微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒者五苓散

二十舌



舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天水散主之可下者大柴胡湯下之表裏雙除臨證審用之

二十一舌



舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已

入胃宜急下之若下遲必變黑色爲惡證爲亢害鬼賊邪氣深也不治宜用調胃承氣湯下之

二十二舌

舌左白胎而自汗者不可下宜白虎加人參三錢服之

二十三舌



舌右白胎滑者病在肌肉爲邪在半表半裏必往來寒

熱宜小柴胡湯和解之

二十四舌

舌左見白胎滑此臟結之證邪併入臟難治

二十五舌



舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之證兼有表者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

二十六舌



舌見黃而有小黑點者邪偏六腑將入五臟也急服調胃承氣湯下之次進和解散十救四五也

二十七舌

舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼膈散二服合進之脉弦者宜防風通聖散

二十八舌

舌見黃而澁有隔瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急以大承氣湯下之若身發黃者用茵蔯湯下血用抵當湯水在脇內十棗湯結胸甚者大陷胸湯痞用大黃瀉心湯

二十九舌

舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四下方退五次下之而不退者不治

三十舌



舌見黃而黑點亂生者其證必渴譫語脉實者生脉澀者死循衣摸牀者不治若下之見黑糞亦不治下宜大承氣湯

三十一舌

舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治調胃承氣湯主之

三十二舌

舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解散加解毒湯相半微汗之汗罷急下之如結胸煩躁目直視者不治非結胸者可治

三十三舌

舌見灰色尖黃不惡風寒脉浮者可下之若惡風惡寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見糞黑不治

三十四舌

舌見灰黑色而有黑紋者脉實急用大承氣湯下之脉浮渴欲飲水者用涼膈散解之十可救其二三

三十五舌

舌根微黑尖黃脉滑者可下之脉浮者當養陰退陽若惡風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十生七八也

三十六舌

舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脉實急用大承氣湯下之脉浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其一二也

已上三十六舌乃傷寒驗證之捷臨證用心處之百無一失

動氣

動氣者爲築築然動跳於腹者是也

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水活人云先服五苓散三服次服竹葉湯　動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤活人云先服防風白朮牡蠣散汗止次服建中湯方見自汗　動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端活人云宜服李根湯方見氣上衝心　動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反吐穀不能進活人云先服大橘皮湯吐止後服小建中湯　動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也　動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則欲踡　動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌　動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

○附保命集方

傷寒汗下後臍左有動氣者宜防葵散

防葵散方

防葵壹兩　木香不見火　柴胡

黃芩各半兩

右剉爲細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜枳殼散

枳殼散方

枳殼（麩炒）　訶棃勒　木香（不見火各伍錢）

赤茯苓　當歸　三稜（炮各壹兩）

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜前胡散

前胡散方

前胡　赤茯苓　大腹皮

人參（各伍錢）　木香　檳榔

大黃（各叄錢）

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜茯苓散

茯苓散方

赤茯苓（壹兩）　桂心　大腹皮

川蘹香（炮炒）　良薑（各伍錢）　檳榔（叄錢）

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

漱水不欲嚥

此證屬陽明凡內有熱者欲飲水今欲水而不欲嚥是熱在經而裏無熱也陽明經氣血俱多經中熱甚逼血妄行故知必作衄也　楊仁齋曰脣燥口乾血證頻有之必欲取水而灌漱也然漱水而不飲水何哉蓋渴者易為飲陽熱入裏胃中液乾患不與水耳惟夫上焦瘀血下焦畜血乘肺蒸燥渴證獨無是以漱水而不欲下咽也漱水條例惟血證有焉

陽明身熱頭疼口燥漱水不欲入咽必衄血脉微者（犀角地黃湯　茅花湯）無表證不寒熱胸腹滿脣燥口乾漱水不嚥小便多此為瘀血必發狂輕者（犀角地黃湯　桃仁承氣湯）甚者（抵當丸）取盡黑物為度

【寒】凡少陰脉沉細手足冷或時煩躁作渴欲漱水不欲嚥者宜四逆湯溫之又下利厥逆無脉乾嘔煩渴欲漱水不欲嚥宜白通加猪膽汁人尿主之凡厥陰蛔厥傷寒煩躁吐蛔口燥舌乾但欲涼水浸舌及脣時不可離不欲嚥者宜理中湯加烏梅主之大抵陰證發躁煩渴不能飲水或有勉強飲下良久復吐或飲水而嘔或噦逆者皆內寒也蓋無根失守之火遊于咽嗌之間假作燥渴則不能飲或有能飲水不吐復欲飲者熱也

衂

成衂者鼻中出血也雜病衂血在裏傷寒衂血在表病源曰心主血肝藏血肺主氣開竅于鼻血得熱隨氣上從鼻出為衂是雜病衂者責其裏熱也經曰傷寒脉浮緊不發汗因致衂者麻黄湯傷寒六七日不大便頭痛有熱者與小承氣湯小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衂宜桂枝湯是傷寒衂者責其表熱也衂雖為熱在經又有不可汗者經曰衂不可汗汗則額上陷脉緊急直視不能眴不得眠是也前云桂枝麻黄證者非治衂也蓋以發散經中邪氣使其不得擁盛于經迫上而妄行也衂為熱無寒是以三陰無衂經曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出是名下厥上竭者死非衂也又衂但頭汗出身無汗及汗出不至足者亦死證也

太陽傷寒脉浮緊不發汗因致衂者麻黄湯主之 [illegible]

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衂乃解所以然者陽氣重故也麻黄湯主之

張或謂經言衂家不可發汗汗出必額上陷今衂血之證皆贅麻黄於其下何也夫太陽脉浮緊發熱無汗自衂者愈此一定之論也何故復用麻黄湯以汗之仲景豈有前後相反之理哉然前條麻黄湯主之五字合當用于當發其汗之下蓋以漢之文法用藥諸方皆贅于外條之末且如大青龍湯證既云脉微弱汗出惡風者不可服服之厥逆筋惕肉瞤此為逆也又以大青龍湯主之皆此例也

太陽中風以火刦發汗邪風被火兩陽相熏其身發黄陽盛欲衂陰虛小便難頭汗腹滿微喘口乾咽爛或不大便讝語甚者至噦捻衣摸牀小便利者可治詳身黄門

太陽病脉浮緊發熱無汗而衂者愈也

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衂成陽明之脉起於鼻絡於口陽明裏熱則渴欲飲水此口燥但欲漱水不欲嚥者是熱在經而裏無熱也陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄行必作衂也○宜煎黄芩芍藥湯衂乃解黄芩湯

脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衂黄芩湯

少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出名下厥上竭為難治

禁忌衂家不可發汗汗出必額上陷脉急緊直視不能眴不得眠衂忌發汗者以其脉浮緊身疼無汗是表實之證宜發之

動氣發汗則衂而渴飲水即吐詳動氣

二附

（海）仲景言衄不可發汗者盖為脉微也若浮緊者麻黄湯浮緩者桂枝湯脉已微二藥不可用犀角地黄湯主之仲景云衄家不可發汗汗出必額上陷脉緊直視不能瞬不得眠又云亡血不可發其表汗出即寒慄而振此二說皆為脉微不可汗也若脉浮緊及浮緩者皆當發之是也

（活）傷寒衄血脉已微者黄芩芍藥湯犀角地黄湯主之

犀角地黄湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黄大便黑此方主消化瘀血

芍藥三分　生地黄半兩　牡丹皮

犀角鎊各一錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加黄芩一兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黄芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一盞分二服即差無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

（本）治傷寒衄血滑石丸

滑石末不以多少飯丸如桐子大每服十丸微嚼破新水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服温和藥以調其衛纔見鮮血急以此藥治之

（戴）古論鼻衄屬太陽經風寒皆有之既衄而表證仍在於寒當用麻黄湯於風當再用桂枝湯且謂發煩目瞑極者必衄既發煩目瞑豈純是太陽經兼陽明之脉循鼻是太陽侵入陽明汗下俱難若衄已而熱不退者惟升麻葛根湯敗毒散陽旦湯為穩衄而煩渴飲則吐水先服五苓散次服竹葉石膏湯大衄不止宜茅花湯或黄芩芍藥湯加茅花一撮　若少陰初得病醫誤以止發汗之法致迫血動經妄行而衄其血非獨出於鼻或

從口中或從耳目又有陽陷入陰四肢厥逆醫見其厥謂寒邪在表從而汗之當下反汗以致動血是謂下厥上逆為難治先哲云桂枝下咽陽盛則斃正以此也要知汗不出徹為陽之衄誤發其汗為陰之衄二者大不同也又云陽盛陰虚汗之則死

（陶）傷寒衄血或成流久不止者將山梔炒黑色為細末吹入鼻內外用水濕草紙搭於鼻中其血自止須分點滴成流者其邪在經不在此法　墨汁五倍子燒灰或服或吹隨用又或刺曲池合谷瀉之

（吳）凡吐血衄血無表證脉不浮緊者不可發汗也東垣

云脉微者宜黄芩芍藥湯脉滑數者犀角地黄湯如熱盛血不止者河間地黄散古方四生丸血虚者東垣麥門冬飲子三黄補血湯若不止者活人茜根散芎花湯主之也以上皆治吐血衂血之良方但在出入通變也大抵吐血衂血脉滑小者生脉實大者死或吐或衂後脉微者易治若熱反盛脉反數急者死也若衂而頭汗出或身上有汗不至足者乃難治也凡血得熱則行得冷則凝見黒則止所以犀角地黄湯中加好京墨一二匙攪藥令黒與之最效也昔陶尚文治一人傷寒四五日吐血不止醫以犀角地黄湯茅花湯治之反劇陶公

切其脉浮緊而數遂用麻黄湯一服汗出而愈也可謂得仲景之心法矣若脉不浮緊而數者此法豈可施乎

吐血

成雜病吐血咯血責爲實邪傷寒吐血咯血皆由誤汗下并火逆而致誠非寒病熱之微甚者也是爲壞病宜隨其逆而調之惟少陰厥竭誤汗一證強動經血故云難治也

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血（黄芩湯 犀角升麻湯）脉浮熱甚反灸之必咽燥唾血（火邪迫血而血上行者也 芎花湯 解毒湯 黄芩芍藥湯） 少陰病但厥無汗強發之必動其血或從口鼻或從目出名下厥上竭爲難治 少陰證惡寒發熱無頭疼誤大汗使血從耳目口鼻出者名陰血多不語此與

鼻衂陽血不同 傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治（麻黄升麻湯） 咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者爲陽毒宜升麻鼈甲湯

○附

（一）治一貧士病脾胃虚與補劑藥愈後繼而居曠室臥熱炕咳而吐血數次予謂此久虚弱外有寒形而有火熱在内上氣不足陽氣外虚當補表之陽氣瀉裏之虚熱蓋冬居曠室衣服單薄是重虚其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脉

浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衂血却與麻黃湯立愈與此甚同因與麻黃人參芍藥湯

麻黃人參芍藥湯方

麻黃壹錢去外寒　桂枝半錢補表虛　白芍藥一錢

黃芪壹錢實表益衞　炙甘草壹錢補脾　五味子伍粒安肺氣

麥門冬叁分保肺氣　人參叁分益三焦元氣不足而實其表

當歸五分和血養血

右㕮咀作一服水三盞煎麻黃令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去滓熱服臨卧一服愈觀此一方足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也

活傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於五藏內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯三黃丸

便膿血

便膿血熱病也其在太陽者誤發淋家汗因便血猪苓湯此壞病也由小便淋澀所致故利其小便而愈陽明病下血譫語此熱入血室刺期門以散其熱也無表裏證因下後協熱便膿血者熱勢下流故也其在少陰下利便膿血又有至四五日腹痛便膿血治以桃花湯成氏釋為裏寒非也桃花湯雖佗乾薑然分兩最微赤石脂粳米居多蓋調正氣澀滑脫佐用辛以散之之義又八九日一身盡熱必便血也又便膿血者可刺厥陰又傷寒先厥後熱必便膿血又傷寒厥少熱微後必便血又下利脉數而渴必清膿血是數者皆傳經之熱邪也各隨其輕重或用微涼或用疎導無不愈者或用辛熱

間或得痊世因以為難療之疾殊不知仲景言便膿血別無死候學者宜究心焉

太陽病以火熏之不得汗其人必躁再到太陽經不解必清血為火邪此火邪迫血而下行者也　太陽病下之其脉促不結胸者為欲解脉沉滑者協熱利脉浮滑者必下血

淋家不可發汗發汗必便膿血　太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯證也血自下者

陽明病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之

假令已下脉數不解下不止必協熱而便膿血也　陽明病下血譫語此熱入血室但頭汗者刺期門衝脉爲血海即血室也男女均有之男子下血譫語婦人寒熱似瘧皆爲熱入血室迫血下行則爲協熱而利搏血之脉乍疏乍數或沉或伏血熱交併則脉洪盛大抵男多在左手女多在右手見之也又有陰寒爲病下利膿血者乃下焦虛寒腸胃不固清濁不分而便下膿血也二者一爲血熱一爲血寒臨病宜詳審之

少陰病八九日一身手足盡熱以熱在膀胱必便血也

少陰病下利便膿血者可刺

厥陰傷寒先厥後發熱下利必自止若不止必便膿血　傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁小便利色白者此熱除也欲得食爲欲愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便膿血　傷寒厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血　下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血　下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血

吳凡下血便膿血有陰陽冷熱之不同要詳辨之古人云見血無寒又言血得熱而行此大槩言之也大抵屬熱者常八九屬寒者纔一二不可拘泥謂無寒也要略曰陽證內熱則下鮮血陰證內寒則下紫黑如豚肝也且夫陽證脉數而有力者爲實熱苦寒之藥可投若數而無力者虛熱當甘温養血藥中少佐寒藥可也若陰證則脉遲而有力者爲有神可治無力者難治也凡下利膿血身熱脉大者爲難治身熱脉小者爲易治也

畜血

身黃如狂屎黑喜忘皆畜血之證也許學士云血在上則喜忘在下則發狂

[成]血留下焦而瘀者畜血也大抵傷寒先看面目次觀口舌次觀心下至少腹以手揣之若少腹鞕滿若小便不利者是津液留結可利小便若小便自利者是畜血證可下瘀血其陽明病有畜血而喜忘者證之甚也宜抵當湯太陽有熱結膀胱如狂者證之輕也宜桃人承氣湯經云病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者此有瘀血抵當湯主之若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也此證當不大便六七日之際又無喜忘如狂幷少腹鞕滿之候與承氣下者多矣何以知為畜血蓋脉浮而數浮則熱傷氣數則熱傷血因下之後浮數俱去則已若下後數去而脉但浮者則榮血間熱去併於衛氣間熱心中則飢也邪熱不殺穀則有潮熱發渴之證也及下之後渴去而數不解者則衛氣間熱去合于榮血間之熱熱氣合併逼血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以去泄必便膿血也若不大便六七日則血不得出泄畜在下焦為瘀

血須抵當湯下之此實證之奇異治法之玄微也

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之[成]太陽經也膀胱府也此太陽隨經入府者也六七日邪氣傳裏之時也脉微而沉邪氣在裏之脉也表證仍在者則邪氣猶淺當結於胸中若不結於胸中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞕滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血○表裏非謂成也陽明為太陽本經曰熱在下焦曰少腹鞕滿曰小便自利皆陽明之證故知熱結隨經瘀熱在裏二字要看得活非三陰之裏乃隨經膀胱之裏也

太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之身黃脉沉結少腹鞕小便不利者胃熱發黃也可與茵蔯湯身黃脉沉結少腹鞕小便自利其人如狂者非胃中瘀熱為熱結下焦而為畜血也與抵當湯以下畜血

抵當湯方

水蛭熬三十箇　蝱蟲三十箇去翅足熬　桃人貳拾箇去皮尖

大黃三兩酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

苦走血鹹勝血蝱蟲水蛭之鹹苦以除畜血甘緩結苦泄熱桃人大黃之甘苦以下結熱

人之所有者氣與血也氣為陽氣留而不行者則易散以陽病易治故也血為陰血畜而不行者則難散

陰病難治故也血畜于下非大毒駛劑則不能抵當故治畜血曰抵當湯內經曰鹹勝血血畜於下必以鹹為主故以水蛭鹹寒為君苦走血血結不行必以苦為助是以蝱蟲苦寒為臣肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急食甘以緩之散血緩肝是以桃人味苦甘平為佐大黃味苦寒濕氣在下以苦泄之血亦濕類也蕩血逐熱是以大黃為使四物相合雖苛毒重病亦獲全濟

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸成傷寒有熱少腹滿是畜血於下焦若熱畜津液不通則小便不利其熱不畜津液而畜血不行小便自利者乃為畜血當與桃人承氣抵當湯下之然況無身黃屎黑又無喜忘發狂是未至於甚故不可峻攻只餘緩之藥也可與抵當丸小可下之也○按身黃屎黑喜忘發狂乃是推爲之詞若文中文只是滿而不硬耳

抵當丸方

水蛭 貳拾箇　蝱蟲 貳拾伍箇　桃人 貳拾箇 去皮尖

大黃 叁兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之晬時當下血若不下者更服

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃

可攻之宜桃核承氣湯按犀角地黃湯以治上血如吐血衄血為上血也桃仁承氣湯治中血如畜血中焦下利膿血之類為中血也抵當湯丸治下焦血如血證如狂之類是下血也上中下三焦各有主治此條當作三證看至下者愈是一證謂其血自下也疑有闕文至當先解外是一證蓋其人如狂是下焦血非桃人承氣證也自外解至末又是一證恐是自下只去得下焦血而中焦道遠未能盡去故尚留於少腹耳又抵當易丸其中蝱蟲水蛭性為猛厲不若四物湯加酒浸大黃各半下之妙見湯液本草水蛭條下

桃核承氣湯方

桃人 伍拾箇 去皮尖　桂枝 去麤皮　芒硝

甘草 炙 各貳兩　大黃 四兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃人之甘下焦畜血散以桂枝辛熱之氣寒以取之芒硝之鹹停血故加二物於調胃承氣湯中也○按以上諸證論之當是桂非桂枝也蓋桂枝輕揚治上桂厚重治下成氏隨文附釋未足據

【陽明】陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯下之成內經曰血并於下亂而喜忘此下焦本有久瘀血所以喜忘也津液少大便鞕以畜血在內屎雖鞕大便反易其色黑也與抵當湯以下瘀血

【海】初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤重色變者以其火燥也如羊血在日色中須臾變褐色久則漸變而為黑色即此意也當詳察之

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令巳下脉不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脉數不解血下不止必協熱而便膿血也

成當不大便六七日之際無喜忘如狂之證又無少腹鞕滿之候何以知其有畜血蓋以其脉浮數故也浮則熱客於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病巳若下後數去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中

熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

張或問攻下之法須外無表證裏有下證然後可攻上言無表裏證況脉更浮數何故言可下之曰此非風寒之所病是由內傷而致然也若外不惡寒裏無譫語但七八日發熱有爍津液乃陽盛陰虛之時苟不攻之其熱不已而變生焉故云雖脉浮數可下不待沉實而攻之夫內傷者經曰趺陽脉浮而數浮則傷胃數則傷脾此非本病醫特下之所為也仲景之意不外是理凡傷寒當下之證皆從太陽陽明在經之邪而入于府故下之今不言陽明病而止云病人無表裏證此非自表之裏而病也但為可下故編于陽明篇中學者宜詳玩焉

病者胸滿脣痿舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脉微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血海云漱水不咽對滿心下手不可近者桃仁承氣湯主之

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脉反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

活前集云傷寒失汗熱畜在裏熱化為血其人善忘而如狂血上逆則善忘血下畜則內急甚者抵當湯丸桃仁承氣湯犀角地黃湯取盡黑物為効又云若用抵當湯丸更宜詳慎審其有無表證若有畜血而外不解亦未可便用宜先用桂枝湯以解外緣熱客膀胱太陽經也

吳凡畜血者瘀血留結于內蓋傷寒病在太陽當汗不汗則瘀血在裏必血結也大抵看傷寒病人心下兩脇少腹但有鞕滿處以手按則痛者便當問其小便何如若小便不利乃水與氣也若小便自利者為

有血也

陶以手按之小腹若痛而小水自利大便黑鞕或身黄譫妄燥渴脉沉實者為畜血桃仁承氣湯下盡黑物則愈若按之小腹脹滿不鞕痛小水不利則溺澁也五苓散加減利之不可大利恐耗減津液也若按小腹连臍鞕痛渴而小水短赤大便實者有燥屎也大承氣湯下之

附

海血證古人用藥雖有輕重之殊而無上下之别今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部血結胸中為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

汗多為衄血脉浮灸之咽燥為唾血當汗不汗熱入于裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黄湯主之涼膈散加生地黄亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳審此證乃足太陰所主脾所不裹越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黄湯虚者黄芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

血結胸中頭痛身痛漱水不欲嚥者衄無熱胸滿漱水不欲嚥者喜忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也桃仁承氣湯主之

畜血下焦其人發狂小腹滿鞕小便自利大便反黑及臍下疼者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黄屎黑者疾之甚也但小腹滿鞕小便利者輕也故有湯丸之别桃仁大黄等分水蛭䖟虫多者作湯三之二者作丸丸之名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

生地黄湯　病人七八日後兩手脉沉細微膚冷臍下滿或狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血證也若老幼氣虚弱者宜此丸主之

生地黄（[illegible]）　乾漆（[illegible]）
生藕（[illegible]汁壹升[illegible]）　藍葉（[illegible]）
䖟蟲（[illegible]炒黄色）　水蛭（[illegible]炒）
大黄（[illegible]）　桃仁（[illegible]）

右八味同一處入水三升慢火熬及二升放冷分二服先投一服至半日許血未下再投之此湯比抵當湯丸其勢甚輕如無地黄與藕汁升數添水同煎抵當丸恐用之太過不止損血故以此湯主之

腹中雷鳴

成腹中雷鳴有二證壞病也其一由傷寒反下之而致者甘草瀉心湯以誤下損陰氣故耳其一由傷寒汗出解之而生者生薑瀉心湯以誤汗損陽氣而然蓋用此二湯以復陰陽之氣耳

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕乾嘔心煩不得安醫見心下痞復下之其痞益甚此非結熱以胃虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

踡

成踡者屈縮不伸是也皆陰寒之極雖在陽經見是證者然有長證亦宜用溫經之劑桂枝附子是也況在三陰果寒下利厥逆者乎四逆之類其可缺諸若有陰無陽者為不治

少陰病下利若利自止惡寒而踡手足溫者可治 或云四逆湯

宜真武湯 古人用柴胡湯 少陰病惡寒而踡時自煩欲去衣被者可治

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治

少陰四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死

四肢拘急

成拘急者拘強難以屈伸也不拘病證在何經凡見是證皆陰寒所致寒主收引故也仲景之法雖太陽表證及風濕相搏而見攣急者亦處以桂枝加附子湯甘草附子湯之類況陰經裏病霍亂之候四逆之劑其可缺諸

太陽病發汗漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯（方見[illegible]）　風濕相搏骨節煩疼不得屈伸汗出短氣小便不利惡風或身微腫甘草附子湯（[illegible]）　傷寒脉浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急本桂枝加附子湯反用桂枝湯攻表誤也作甘草乾薑湯以復其陽若愈足溫更作芍藥甘草湯以伸脚　大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆惡寒者四逆湯　陰陽易病身體重少氣少腹裏急膝脛拘急者燒裩散

〔附〕

〔箕〕凡傷寒大汗已出因而露風則汗不流通風邪乘虛襲于經絡故手足攣搐不能屈伸筋脉拘急也宜牛蒡根散主之

牛蒡根散方

牛蒡根（十段）　麻黃（去根節）　川牛膝

天南星（各[illegible]錢）

右細剉於石器內入好酒一升同研細另用炭火半秤燒一黃土地坑令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭火燒令黑色取出研為細末每服一錢以好酒溫熱調下日三服勿外以百草膏貼之良

瘈瘲

瘈者筋急而縮也瘲者筋緩而伸也或伸縮而不止者瘈瘲也俗謂之搐搦乃風熱甚之病宜以祛風滌熱之涼劑或有可生若妄加灼火及發表之藥則禍不旋踵

太陽發汗已身猶灼熱名風温脉陰陽俱浮自汗身重多眠鼻鼾語言難出不可下不可火若被火者微則發黄劇則驚癎瘈瘲

吳夫瘈瘲者一縮一伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似古人以此證多屬於風蓋風主搖動也駱龍吉言心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相扇則為瘈瘲也若夫不因汗下後所生者當平肝木降心火佐以和血脉之劑主之如羌活防風黄芩柴胡黄連芍藥生地黄當歸川芎天麻之類若兼有痰者必加竹瀝天南星半夏如風邪急搐須加全蝎白殭蠶之類若傷寒曾經汗下後多日傳變而得此證者為病勢已過多難治也蓋因虚極生風所致須用小續命湯或大建中湯增損一二味主之凡傷寒汗出露風則汗不通流遂變筋脉攣急手足搐搦者宜牛蒡根散主之又風温被火微發黄色劇如驚癎時發瘈瘲者宜萎蕤湯主之若瘈瘲戴眼反折絕汗乃出大如貫珠著身不流者此太陽終也不可治又有四肢漐習動而不止似瘈瘲而無力抽搐者此為肝絕蓋汗下後變生此證者多死凡用小續命湯有汗去麻黄無汗去黄芩要在通變而已

風濕相搏

成風濕相搏有二證其一則本是傷寒至八九日復遇風濕相搏者桂枝附子湯以散表中風濕其一則只是風濕相搏骨節煩疼等證宜甘草附子湯以散濕固衛能認此證妙在脉浮虛而濇脉若沉實滑大數者非也

太陽傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯若大便鞕小便自利者桂枝去桂加白朮湯　風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯

奔豚

奔豚有二皆壞病也一由誤汗所致一由誤加燒針所致

太陽發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之方見　燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩

寔夫奔豚者如豕突之狀氣從少腹上衝心而痛也凡欲作奔豚者其氣在臍下築築然而動也宜茯苓大棗湯主之或理中湯去白朮加肉桂主之痛甚者更加吳茱萸亦佳凡燒針令其汗出者針處被寒核起而赤必發奔豚也宜灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之若痛甚手足厥逆者宜當歸四逆湯加肉桂吳茱萸主之惟桂大能泄奔豚凡藥中不可缺也

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤　甘草炙貳兩　大棗拾伍枚擘

桂枝肆兩

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

腫

腫有三證太陽風濕相搏身微腫者宜治濕陽明中風耳前後腫者宜刺大病差後腰以下腫者宜利小便

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差

大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣澤瀉散方

牡蠣 煅　澤瀉　蜀漆

商陸　葶藶 隔紙炒　海藻

栝蔞根 各等分

右為末每服一錢或二錢米飲調下小便利為度

身虛胃弱食少者以五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁之類主之若人不甚弱者以商陸一味煮粥食之亦佳凡病瘥後足腫者不妨但節飲食胃氣強自消也

一方用金毛狗脊煎湯洗之亦效

身癢

太陽病有身癢陽明病言身如蟲行俱為榮衛氣虛微邪在表無從而出故有為癢如蟲行之狀也悉宜各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此久虛故也 宜桂枝麻黃各半湯活人用术附湯黃芪建中湯

趙蟲行皮中狀者即經言身癢是也久虛者以表氣不足津液不充於皮膚使腠理枯澁汗難出也若謂虛則當補畢竟陽明受邪為病邪可補乎如用术附黃芪輩皆收汗藥則榮衛鬱閉邪無從出內熱發矣何况其病又無吐利胃虛等證病不在裏但皮膚中表氣虛之理宜和解可也莫若借用各半湯或有熱者柴胡桂枝湯庶乎甘辛之劑可以和其榮衛通行津液而解未審當否

除中

成除中者藏寒應不能食今反能食者是也有二證悉屬厥陰藏寒其一證由誤服黃芩湯凉藥而致期以必死其一則熱少厥多胃氣在者必愈恐暴來出而復去者死其熱續在者生此不因藥故也

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死　眼睛不慧語言不出而穀食反多者此爲除中口雖欲言舌不能言　凡手足厥冷而利不當食而食者恐爲除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也 詳見厥門

泄利下重　脉浮宜灸火逆　脉遲浮弱誤下下重　診

下重

泄利下重若少陰證欲無四逆者四逆湯加薤白散若熱者白頭翁湯 方論見下利

脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰已下必重而痺名火逆也

脉遲浮弱惡風寒者表證也醫反下之遂不食脇痛身黃項强小便難復與柴胡湯必下重 論見脇痛

下利脉沉弦者下重也

身熱惡寒身寒惡熱

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也皮膚言淺骨髓言深皮膚言外骨髓言內身熱欲得衣者表熱裏寒也身寒不欲衣者表寒裏熱也

丹溪按身大熱欲得衣蓋人之身不能自溫因表氣之實足以自溫雖遇風寒無所畏憚大熱病表氣當實而喜冷今反欲得衣者表氣虛不足以自溫故欲近衣恐是病人陰弱陽無所附飛越而出發為大熱爾當作陰虛治之身大寒反不欲近衣者恐是邪在表不能自發而為熱表雖無熱邪鬱腠表氣大實

故不欲近衣爾當作鬱病治之註言表熱裏寒者當是熱感得淺寒感得深而在內也言表寒裏熱者當是寒感得淺而在外熱感得深而在內也表裏之寒熱為重感病邪重感之病必有其名如傷寒重感寒為溫瘧傷寒更遇風為風溫傷寒更遇溫熱為溫毒傷寒遇溫氣為溫疫病濕更中暍為濕溫未嘗有所謂表裏寒熱也然表熱裏寒表寒裏熱何病邪竊嘗求之論意矣恐為寒熱感之深者發也內經曰亢則害承乃制謂氣盛之極則受勝已之化而為病也熱感得深外必惡寒故曰寒在皮膚非寒也熱也熱在骨髓此火極似水證仲景曰人傷于寒則為病熱熱雖甚不死寒感得深外必發熱故曰熱在皮膚非熱也寒也此傷於寒而熱甚也內經曰甚者反治又曰寒因熱用熱因寒用病氣深者正氣虛也非反治因用邪何由伏病何由安

〔遡〕詳仲景論中止分皮膚骨髓而不曰表裏者蓋以皮肉脉筋骨五者素問以為五藏之合主于外而充于身者也惟曰藏曰府方可言表裏可見皮膚即骨髓之上外部浮淺之分骨髓即皮膚之下外部深沉之分與經絡屬表藏府屬裏之例不同況仲景出此

證在太陽篇首其為表證明矣是知虛弱素寒之人感邪發熱熱邪浮淺不勝沉寒故外怯而欲得近衣此所以為熱在皮膚寒在骨髓藥宜辛溫至於壯盛素熱之人或酒客輩感邪之初寒未變熱陰邪閉于伏熱陰凝于外熱鬱于內故內煩而不欲近衣此所以寒在皮膚熱在骨髓藥宜辛涼必也一發之餘既散表邪又和正氣此仲景不言之妙若以皮膚為表骨髓為裏則麻黃證骨節疼痛其可名為有表復有裏之證耶

〔活〕熱在皮膚寒在骨髓一條仲景無治法宜先與陰

日湯寒已次以小柴胡加桂温其表又云表熱裏寒者脉須沉而遲手或微厥下利清穀也所以陰證亦有發熱者四逆湯通脉四逆湯主之寒在皮膚熱在骨髓一條仲景亦無治法宜先以白虎加人參湯熱除次以桂枝麻黄各半湯以解其外又云表熱裏寒者脉必滑而厥口燥舌乾也所以少陰惡寒而踡時時自煩不欲厚衣用大柴胡下之而愈此皆仲景之遺意也

表熱裏寒表寒裏熱

傷寒脉浮此表有熱裏有寒白虎湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之方見下　既吐且利小便復利大汗出下利清穀内寒外熱脉微欲絶者四逆湯主之成吐利亡津液則小便當少小便復利而大汗出津液不禁陽氣大虛也脉微爲亡陽若無外熱但内寒下利清穀爲純陰此以外熱爲陽未絶猶可與通脉四逆湯救之　下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯成下利清穀爲裏寒身熱不解爲外熱汗出陽氣通行於外則未當厥其汗出而厥者陽氣大虛也與通脉四逆湯以固陽氣也　脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之成浮爲表熱遲爲裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯溫裏

表熱裏寒者脉雖沉而遲手足微厥下利清穀此裏寒也所以陰證亦有發熱者此表解也四逆湯通脉四逆湯　表寒裏熱者脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而踡此表寒也時時自煩不欲近衣此裏熱也大柴胡湯

熱多寒少寒多熱少

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯劉氏云脉遲者小建中加黄芪或温中

太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者爲欲愈脉微惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不得小汗出身必痒宜桂枝麻黄各半湯主之

通悉詳仲景論中熱多寒少止有二證如上文一證仲景之意蓋以得病七八日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少十六字爲自初至今之證以下文乃是已後擬病防變之辭當分作三截看若其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩爲欲愈此一節乃裏和無病而脉微緩者邪氣微緩者陰陽同等脉證皆向安之兆可不待汗而欲自愈也若脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也此一節宜溫之若

而色反有熱者未欲解也以其不能得小汗出其身必痒宜各半湯此一節必待汗而後愈也活人書不詳文意却將其人不嘔清便欲自可九字本是欲愈之證反以他證各半湯汗之又將不可汗吐下及各半湯證語句並脫略而不言反將其中欲愈之證而用彼藥汗其所不當汗何也其第二證仲景云太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者亡陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯活人書于脉微弱上添都大二字豈以仲景脉微弱爲未足而加之乎其第三證尺脉遲者仲景論中無熱多寒少語句但云脉浮緊法當

身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗以榮氣不足血少故也活人書但舉尺中遲血少之語自添寒少熱多四字加于其上因而編入此問中何邪如一證尺遲者止當收入不可汗門中

劉仲景一書只有熱多寒少之條無寒多熱少之證

又云不煩躁手足厥逆爲傷寒脉反浮緩爲傷風大青龍湯或云各半湯

發斑

趙活人云發斑有兩證有溫毒有熱病又云表虛裏實熱毒乘虛出于皮膚所以發斑瘡癮疹如錦紋素問謂之疹愚詳仲景論無此證治但華陀云熱毒未入于胃而下之胃虛熱入爛胃又熱已入胃不以時下之熱不得泄亦胃爛其斑如鷄頭大或隱起喜著兩脇王仲弓云下之太早熱氣乘虛入胃故也下之太遲熱留胃中亦發斑或服熱藥多亦發斑微者赤五死一生劇者黑十死一生皆用白虎加人參湯一名化斑湯及阿膠大青湯又索氏新書云陽毒病人出斑赤如灸跡指面大

青黑並不免于死者古人云胃爛如此可信矣世之人或謂斑有生者非斑也皆疹耳其狀如蚊虫咬小點而赤是也故其多生矣今此癮疹如錦紋者疹也非斑也以斑即是疹亦非也謂表虛裏實者亦非也如上所言豈特兩證而已乎

海陽證發斑有四有溫毒發斑有熱病發斑有時氣發斑有傷寒發斑

斑斑如錦紋或發之四末或發之面部或發之胸背色紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感熱病而發也宜用玄參升麻湯白虎等藥子節奉云赤斑

出五死一生黑斑出十死一生皆用白虎人參湯阿
膠大青湯黑斑與紫草散大妙可下者調胃承氣湯
吳凡發斑有六一曰傷寒二曰時氣三曰溫毒四曰陽
毒五曰內傷寒六曰陰證
一曰傷寒發斑者蓋因當汗不汗當下不下熱毒蘊于
胃中乃發斑也千金方曰紅赤者為胃熱紫赤者為熱
甚紫黑者為胃爛也故赤斑出者五死一生黑斑出者
十死一生也大抵鮮紅起發者吉雖大亦不妨但忌稠
密成片紫赤者為難治雜黑者為尤難也凡斑既出須
得脉洪數有力身溫足煖者易治若脉沉小足冷元氣
弱者多難治凡斑欲出未出之際且與四味升麻湯先

透其毒若脉弱者倍加人參食少大便不實者倍用白
朮主之若斑已出則不宜再升發也又不可發汗汗之
更增斑爛又不宜早下下之則斑毒內陷也如脉洪數
熱盛煩渴者以人參化斑湯主之若消斑毒或以犀角
玄參湯大青四物湯之類如熱毒太甚心煩不得眠錯
語呻吟者以黃連解毒湯加玄參升麻大青犀角之類
主之熱甚煩渴喘咳者解毒合化斑湯主之若斑勢稍
退內實不大便譫語有潮熱者大柴胡湯加芒硝或調
胃承氣湯下之曾治一人傷寒八九日發斑四肢頭輭
昏沉譫語不知人大便四五日不通以調胃承氣湯一

下而愈如未可下有潮熱煩渴者且與小柴胡湯去半
夏加黃連山梔黃芩栝蔞根主之或加大青亦佳如無
以大藍葉代之或真青黛代之亦可大抵解胃熱消斑
之毒必以黃連大青犀角玄參升麻青黛石膏知母黃
芩山梔黃柏之類也要在審察病情合宜而用之
二曰時氣發斑者乃天疫時行之氣也人感之則憎寒
壯熱身體拘急或嘔逆或喘嗽或胸中煩悶或躁熱起
臥不安或頭痛鼻乾呻吟不得眠此皆斑候也先用紙
撚燈照看病人面部胸堂四肢背心有紅點起者乃發
斑也易老曰凡大紅點發于皮膚之上者謂之斑小紅

靨行于皮中不出起者謂之疹蓋疹輕而斑重也大抵
一發鮮紅稀朗者吉若一發如針頭稠密紫赤者凶雜
黑者難治有來勢急者發熱一二日便出斑來勢緩者
發熱三四日而出也凡治例必察病人元氣虛實脉之
有力無力為主若脉微弱元氣虛者必先以三白湯倍
加人參以助真氣次察斑欲出未透者以升麻葛根湯
主之如胃弱人虛者以四君子湯合而用之名曰升君
湯也若斑不透者在指方偏發散亦佳若斑疹初出
有表證憎寒壯熱頭痛骨節疼四肢拘急胸中滿悶者
以三因加味羌活散主之或加紫草亦可若斑出稠密

或咽喉不利者犀角消毒飲玄參升麻湯之類主之凡斑出脉數大煩渴者人參化斑湯主之若發熱或潮熱不解者以小柴胡湯隨證增損用之或人參敗毒散皆可出入用之凡斑出而嘔逆者必用陳皮半夏生薑黃連之類若喘欬不止者必用知母貝母瓜蔞仁黃芩石膏之類若口瘡者必用連翹牛蒡子黑玄參升麻桔梗甘草之類若斑出而毒盛者必用犀角大青玄參黃連黃芩黃蘗山梔石膏知母之類主之也北方謂之紅眼兒瘡氣等名色又多所避忌香臭蓋恐觸之也凡斑已出未出之時切不可便投寒凉之劑以攻其熱并飲

凉水等物恐傷胃氣先作嘔吐也又不可發汗攻下虛其表裏之氣其害尤甚也若脉弱者必先有房事要在審問之如有夾陰者必先助真氣為要也

三曰溫毒發斑者活人云初春病人肌肉發斑癮疹如錦紋或咳心悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已汗吐下而表證未罷毒氣未散以此發斑宜用黑膏主之又有冬月溫暖人感乖戾之氣冬未即病至春或被積寒所折毒氣不得洩至天氣暄煖溫毒始發則肌肉斑疹如錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之　吳冬應大寒而反大溫人感此不正之氣而為病者名曰冬溫也若發斑名曰溫毒也大抵治例與時氣同但溫毒發斑尤甚南活人書謂溫毒斑出如錦紋者以黑膏主之或玄參升麻湯犀角大青湯人參化斑湯青黛一物湯等方皆可選而用之凡溫病發于春熱病發于夏若出斑者治與傷寒同法也此由怫鬱之熱自内而發于外亦非輕也

四曰陽毒發斑者其候狂言下利咽痛面赤斑出如錦紋者以陽毒升麻湯大青四物湯人參化斑湯梔子人湯之類選而用之

五曰內傷寒者此因暑月得之先因傷暑次食凉物并

臥凉處內外皆寒逼其暑火浮遊於表而發斑也海藏治完顏小將軍病寒熱間作有斑三五點鼻中微血出兩手脉沉濇皮膚按之殊無大熱此內傷寒也與調中湯數服而愈凡夾暑者加香薷扁豆主之

六曰陰證發斑略例曰陰證發斑亦出胸背手足但稀少而淡紅也此人元氣素虛或先因慾事內損腎氣或誤服凉藥太過遂成陰證伏寒于下逼其無根失守之火聚于胸中上獨熏肺傳於皮膚而發斑點但如蚊蚋蚤虱咬痕然非大紅點也與調中溫胃加以藿香炒白芍藥主之寒甚脉微者以大建中湯主之則真陽自回

陰火自降而病乃愈此治本不治標也大抵發斑身溫足暖脉數大者爲順身凉足冷脉微細者爲逆也凡治斑不可專以斑治必察脉之浮沉病之虛實而治之則爲善治斑也若孟浪不察一槩論之而曰不誤於人吾未之信也

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絶厥陰脉也服温藥數日不已又以姜附等藥發陽微回脉生因渴私飲水一杯脉復退又見頭不擧目不開問之則犯陽易若只與燒裩散則寒一二不濟矣遂更用吳茱萸湯一大服調燒裩散連進二服出大汗兩晝夜而愈

治陽證發斑之劑

升麻葛根湯　凡發斑欲出未出者以此湯升發之若斑已出者不可用也

升麻叁錢　葛根　白芍藥炒各貳錢　甘草炙壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓通口服直指方加紫草茸半壹錢　治斑不透出者若脉弱加人參貳錢　胃虛食少加白术貳錢　如腹痛倍加炒白芍藥和之

三因加味羌活散　治斑疹初出增寒壯熱或頭疼身痛胸中不利者

羌活上　獨活中　柴胡中　前胡中

枳殼中　桔梗中　人參中　茯苓中

川芎中　升麻上　白芍藥中　甘草下

生薑五片

右煎法同前　若斑未透者加紫草茸半壹錢　若脉虛者倍加人參胃弱食少者加白术錢　大便自利者亦加白术去枳殼若斑出盛或煩熱或咽痛者加荆芥薄荷防風牛蒡子連翹各壹錢　主之若内熱口苦心煩者加黃芩黃連各壹錢半　若熱甚舌燥煩渴者更加石膏貳錢　知母壹錢　若喘嗽者亦用之若有痰熱胸中煩悶加栝蔞仁半壹錢　若斑毒盛出者須加玄參犀角各壹錢以消其毒也

加味小柴胡湯　治發斑肌熱潮熱或往來寒熱口苦咽乾目眩耳聾脇痛胸滿心煩或乾嘔或煩渴或喘或咳嗽不止者宜服之

柴胡上　人參中　黃芩中　半夏中

甘草下　黃連中　升麻上　白芍藥中

玄參中　生薑叁片　大棗六枚

煎法同前　若口燥渴去半夏加栝蔞根壹錢　若咽痛加桔梗六錢　倍用甘草若嘔者還用半夏去栝蔞

根加生地黃減少甘草主之若斑毒出盛加犀角屑壹錢
牛蒡子另炒研壹錢毒甚者更加大青壹錢若胸中煩悶
不利加瓜蔞仁壹錢若痰火上喘加桔梗壹錢知母貝
母各壹錢半瓜蔞仁壹錢桑白皮壹錢主之若喘而舌燥煩渴
脉數大者更加石膏三錢若脇痛胸滿不利者加枳殼
桔梗各壹錢半若心下痞鞕加枳實壹錢半黃連倍之
消毒犀角飲　治發斑隱疹或咽喉腫痛或毒氣壅盛
者
　眞犀角屑一　牛蒡子如無上好炒香研碎用中
　荊芥穗中　防風中　甘草中

右用水二鍾煎至一鍾去柤溫服
若咽痛加苦桔梗壹錢甘草倍之玄參壹錢主之或連翹
薄荷皆可加之內熱者須用黃芩黃連各壹錢主之
解毒防風湯　治發斑隱疹痒痛者
　防風上　地骨皮中　黃芪中
　赤芍藥中　荊芥中　枳殼中
　牛蒡子中炒如常
右煎法同前　一方加當歸黑玄參各壹錢
犀角玄參湯　治發斑毒盛心煩狂言或咽痛者
　犀角屑上　升麻中　射干中

　黃芩中　人參中　黑玄參上
　甘草下　右煎法同前
大青四物湯
　大青壹錢半如無以真青黛代之　阿膠
　甘草各壹錢　淡豆豉壹百粒
右煎法同前
犀角大青湯　治斑出已盛心煩大熱錯語呻吟不得
眠或咽痛不利者
　犀角屑上　大青上　玄參中
　甘草下　升麻下　黃連中

　黃芩中　黃蘗中　山梔子中
右煎法同前
當歸丸　治發斑內實大便不通者
　當歸伍錢　甘草　黃連　大黃各壹錢半
右將當歸用水一鍾煎成濃膏子以三味為細末和
勻為丸如梧桐子大每服五十丸溫白湯下以利為
度不利再服
黑膏　治溫毒時氣發斑如錦紋者
　生地黃肆兩　淡豆豉半升
右二味以猪脂一斤合煎之至濃汁入雄黃伍分麝香

壹分攪勻丸如彈子大白湯化下未効再服

葛根橘皮湯　療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬温始發肌中斑爛癮疹如錦紋而咳心悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根　橘皮　杏仁去皮麩炒　知母

黃芩　麻黃去節湯泡　甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服

漏蘆連翹湯　治熱毒發斑無汗大便實者服之

漏蘆　連翹　黃芩　麻黃

白歛　升麻　甘草各壹錢　枳實貳錢

大黃參錢　若熱甚者加芒硝貳錢

用水二鍾煎至一鍾下芒硝再煎一二沸去滓温服如人行五里地不動者再服一次以利為度

豬膽雞子湯　治熱毒發斑或咽痛或聲音不清或心煩不眠

豬膽　米醋各參合　雞子一枚

右三味合煎三四沸人壯者盡服之弱者須煎六七沸分為三次服之汗出乃愈

黃連一物湯　治熱病發豌豆瘡者

以黃連一兩用水二鍾煎至一鍾去滓適口服

五物木香湯　治豌豆瘡煩疼者

青木香貳錢　薰陸香　丁香

礬石各壹錢　麝香半分

右用水二鍾煎至一鍾去滓温服如熱毒盛者加犀角屑壹錢如無以升麻拾錢代之若病輕者去礬石神驗

孫兆山梔散　治熱毒炎盛遍身發斑甚者發瘡如豌豆

牡丹皮　山梔仁　黃芩

大黃　麻黃各貳錢半　木香五分

右水二鍾煎至一鍾去柤温服

治斑出豌豆瘡塗乃用芒硝爲細末和猪膽汁塗瘡上勿動之待其脫落無痕仍臥黃土末上良若病小便澀有血者內壞瘡皆黑靨不出膿者死

犀角大青湯　治斑毒熱甚煩疼者

大青伍錢　犀角參錢半　梔子拾枚　香豉六撮

右煎服法同前

黃連解毒湯　治發斑熱甚心煩不得眠

黃連參錢　黃芩　黃檗　山梔子各貳錢

右用水二鍾煎至一鍾去柤温服若斑毒盛者加大

青貳錢或真青黛壹錢調入湯內服之亦妙凡脉弦數內外熱甚譫語者合小柴胡湯主之若脉洪數內外熱甚舌燥煩渴者合化斑湯主之

加減三黃石膏湯　治熱發斑紫赤煩渴脉洪數者

黃連上　黃芩中　黃蘗中　山梔子中
石膏中　知母中　升麻中　赤芍藥中
玄參中　甘草下　粳米貳撮

右煎法同前一方斑毒甚者加大青、犀角屑各
乃消熱毒斑瘡之藥也

一方時行發斑瘡以好蜜塗瘡上良又方用蜜煎升

麻塗之

治內傷寒與陰證發斑之劑

通脉四逆湯見下　陰毒升麻湯見陰毒

調中湯

蒼朮壹錢　陳皮　砂仁　藿香
白芍藥炒　甘草炙　桔梗　半夏
白芷　羌活　枳殼各壹錢　川芎柒分
麻黃　桂枝各伍分　生薑叁片

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓溫服

大建中湯

當歸中　白芍藥中　白朮中　麥門冬上
黃芪上　甘草下炙　肉桂中　肉蓯蓉中
人參上　川芎中　附子中　半夏中
熟地黃中　茯苓中　生薑三片　大棗貳枚

右煎法同前

人參三白湯

白朮中　白茯苓中　白芍藥中　人參上
生薑叁片　大棗貳枚　若脉沉足冷加附子半枚

右煎法同前

治傷寒黑斑曾治一人傷寒七八日因服涼藥太過遂

變身涼手足厥冷通身黑斑惟心頭溫暖乃伏火也診其六脉沉細昏沉不知人事亦不能語言狀似尸厥遂用人參三白湯加熟附子半枚乾薑二錢水二鍾煎一鍾與之服下待一時許斑色漸紅手足漸暖而甦醒復有餘熱不清此伏火後作也以黃連解毒竹葉石膏湯調之而愈

狐惑（外證欲眠目不閉聲啞）

狐惑之爲病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目瞑不得閉臥起不安蟲蝕於喉咽爲惑蝕於陰肛爲狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲嗄甘草瀉心湯主之（方見痞）蝕於下部則咽乾苦參湯洗之　蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味爲末取二瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上爲惑蝕下爲狐狐惑病者豬苓散主之（方未考）

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眥（一本作下）黑若能食者膿已成也赤豆當歸散主之（方見下血門）

○附

一婦人狐惑聲嗄多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽胸中有汗腹鳴卽目閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

活狐惑傷寒與濕䘌皆蟲證初得狀如傷寒或因傷寒變成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五藏及下部爲䘌蟲病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五藏則死當數看其上下唇上唇有瘡蟲蝕其藏下唇有瘡蟲蝕其肛殺人甚急多因下利而得治䘌桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之

治䘌桃仁湯

生艾　桃仁（去皮尖炒雙仁不用）　槐花子（碎各壹兩）

大棗（拾伍箇去核）

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後有䘌出下部者

黃連（半兩）　犀角（壹兩）　烏梅（柒箇）

沒藥（貳錢半）

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃丸　治傷寒狐惑微煩默默欲臥毒氣上攻咽乾聲嗄下蝕濕䘌或便膿血

雄黃（研）　當歸（炒各柒錢半）　蘆薈（研）

麝香（研各貳錢半）　檳榔（半兩）

右搗研爲末煮麵糊爲丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食前溫粥飲下日三服

雄黃銳散治下部䘌瘡

雄黃　苦參　青葙子

黃連各半兩　桃仁一去皮尖麸炒半

右為散以生艾搗汁爲丸如棗核大綿裹納下部匿

竹葉汁更佳冬月無艾只用散裹納亦得

百合病

百合病論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人脉微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛淅淅然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨其證治之古人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯病也

百合病發汗後宜服百合知母湯

百合知母湯方

百合柒枚劈　知母參兩切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞煎至一盞去滓又將井水二盞另煎知母取一盞去滓和百合汁一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後若宜用滑石代赭湯

滑石代赭湯方

百合柒枚劈　滑石參兩碎綿裹　代赭石彈丸大碎綿裹

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去水更以井

水二升煎取一升去滓另用水二升煎二石取一升
去滓後合和同煎取一升半分溫再服
百合病吐後宜用百合鷄子湯
百合鷄子湯方
百合 柒枚擘 鷄子黄 壹枚
右先將百合水洗浸如前法煎取一升去滓內鷄子
黄攪勻再煎至五分服
百合病不經吐下發汗病形如初者宜百合地黄湯
百合地黄湯方
百合 柒枚擘 生地黄汁 壹升
右水洗百合浸如前法煎取一升去滓納地黄汁同
煎取一升半分溫再服中病勿更服大便當如漆黑
百合病一月不解變成渴者百合洗方主之
右用百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗巳食
煮餅勿以鹽豉也
百合病渴不瘥者宜括蔞牡蠣散
括蔞牡蠣散方
括蔞根 牡蠣 煆各等分
右為末白飲服方寸匕日三服
百合散 治傷寒百合病一月不解變如渴疾
百合 括蔞根 各壹兩 牡蠣 煆成粉 二
麥門冬 去心焙 山梔仁 炒各柒錢半 甘草 炙半兩
右㕮咀每服五錢水一盞入生薑一錢二分竹葉二
七片煎至六分不拘時溫服
治百合傷寒腹中滿痛宜服
右用百合一兩炒黄為細末每服二錢米飲下無時
百合病變熱一作發寒熱者宜用百合滑石散
百合滑石散方
百合 壹兩 滑石 叁兩
右為末飲服方寸匕日三服當微利止服熱則除
百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之
見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦
為逆也

兩感

論若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行藏府不通而死矣

活龐安常云脈沉大者太陽少陰沉長者陽明太陰沉弦者少陽厥陰也諸方書不載兩感脈安常特設以示後人素問熱論云兩感於寒而病者必不免於死法不過六日黃帝曰有三日而死者何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也若三日而氣盡則死矣仲景亦無治法

活人書五卷序云傷寒惟兩感不治仲景但一說云兩感病俱作治有先後證治論引張氏說與仲景同謂如下利清穀身體疼痛急當救裏宜四逆湯身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯證治論并活人書解仲景治有先後之說皆云治有先後者宜先救裏內纔溫則可醫矣然救表亦不可緩也以上所論並先救裏然後救表愚意當消息之謂如下利不止身體疼痛則先救裏如不下利身體疼痛則先救表此亦謂之治有先後也然則兩感證亦有可治之理而不可必也

趙仲景論兩感為必死之證而復以治有先後發表攻裏之說繼之者蓋不忍坐視而欲覬其萬一之可活也

活人書云宜救裏以四逆湯後救表以桂枝湯殊不知仲景云太陽與少陰俱病則頭痛為太陽邪盛於表口乾而渴為少陰邪盛於裏也陽明與太陰俱病則身熱譫語為陽明邪盛於表不欲食腹滿為太陰邪盛於裏也少陽與厥陰俱病則耳聾為少陽邪盛於表囊縮而厥為厥陰邪盛於裏也三陽之頭痛身熱耳聾救表已自不可三陰之腹滿口乾渴囊縮而厥不可下乎活人書引下利身疼痛虛寒救裏之例而欲施於煩渴腹滿譫語囊縮熱實之證然乎否乎蓋仲景所謂發表者葛根麻黃是也所謂攻裏者調胃承氣是也活人書所謂救裏則是四逆救表則是桂枝今以救為攻豈不相背若用四逆湯是以火濟火而腹滿譫語囊縮等證何由而除藏府何由而通榮衛何由而行而六日死者可立而待也吁兩感雖為不治之證矣然用藥之法助正除邪虛實實虛補不足損有餘之理學者不可不素有一定之法於胸中也

提問兩感從何道而入荅曰經云兩感者死不治一日太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽

者府也自背俞而入人所共知之少陰者藏也自鼻息而入人所不知也鼻氣通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水也水流濕故腎受之經曰傷於濕者下先受之同氣相求耳又云天之邪氣感則害人五藏以是知內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故死矣故云兩感者不治然所禀有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不救者有矣未有不治而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故立此方以待好生君子用之

大羌活湯方

防風　羌活　獨活　防已
黃芩　黃連　蒼朮　白朮
甘草炙　細辛各三錢　知母　川芎
生地黃各一兩

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞半去樝得清藥一大盞熱飲之不解再服三四盞解之亦可病愈則止若有餘證並依仲景隨經法治之

吳兩感必死不治者乃一日傳二經陰陽俱病也欲治陽急而有陰急欲治陰急而有陽急表裡不可並攻陰陽雖同一法故不治也活人書有先後之法急救裏宜四逆湯次救表桂枝湯者此表裏皆寒急救之法非日傳二經之法也保命集曰內傷于寒外傷于風或內傷于食外傷于風或先傷于濕而後傷于風或先傷于風而後傷于濕或先傷于寒而後傷于風之類此亦內外俱病表裏俱傷乃為可治故宜大羌活湯間有可生者易老丹溪豈真賢於仲景哉

傷寒證治準繩帙之六

金壇王肯堂輯　門人南昌張　緯校

勞復食復　女勞復

凡病新差後氣血津液虛耗慎勿爲諸勞動事凡言語思慮勞神梳洗澡類勞力勞則生熱而復病如初也又新差後精髓枯燥切不可爲房事犯房事勞復必死魏督郵顧子獻病差後華佗診之愼勿勞事餘事尚可女勞即死此是女勞復非陰陽易也又素問云病熱而有所遺者是新差後腸胃尚弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差强人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博棊子大五六枚[illegible]

枳實梔子豉湯方

枳實[illegible]　梔子[illegible]　豉[illegible]

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓温分再服覆令微似汗[illegible]

枳實梔子豉湯則應吐劑此云覆令微似汗出者以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之內經曰火淫所勝以苦發之此之謂也

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沉實者以下解之差後餘熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脉浮者熱在表也故以汗解脉沉者熱在裏也故以下解之

海大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內爲中州調中可已此爲有形病也但見外證則謂之復病非爲勞也如再感風寒是已

許記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也盖母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者

與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異
也
補脾湯治傷寒得汗差後脾胃傷冷物胸膈不快尋常
血氣不和
人參　白朮　甘草
橘皮去白　青皮去白　乾薑各等分
右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得
海麥門冬湯治勞復氣欲絕者用之有効能起死回生
麥門冬去心壹兩　甘草炙貳兩　粳米半合
右為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半

入藥五錢匕棗二枚去核新竹葉一十五片同煎至
一盞去滓溫服不能服者綿滴口中又治小兒不能
灌藥者宜用此綿滴法　此方不用石膏以其三焦
無火熱也兼目欲死之人陽氣將絕若故不用石膏
若加人參大妙
外大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲以上黃
牛乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期
十日服不佳佳
肘治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鱉甲服方
寸匕

活雄鼠屎湯　治勞復
梔子拾肆枚　雄鼠屎貳拾粒兩頭尖者是　枳殼炒叁枚
右為細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三
十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎
七味葱白湯　治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多
皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方
葱白連鬚　乾葛　新豉半合
生薑切各壹兩　麥門冬去心　熟地黃各叁錢
流水肆升以杓揚之
右七味用清水煎三分減二去滓分二服漸漸服之

取汗
千金方　治勞復或食復發熱者
梔子仁　石膏各叁錢　豭鼠屎拾肆粒　豉半合
右用水二鍾煎至一鍾去滓通口服之
補中益氣湯　治勞復發熱氣高而喘身熱而煩四肢
怠惰
人參貳錢　白朮　軟苗柴胡
陳皮　白芍藥各壹錢　當歸身
黃芪各壹錢　甘草　升麻各伍分
右作一服用水二鍾煎至八分去滓溫服　若下元

食復

陰火動或夢中失精或虛勞煩盛或自汗陰虛不足者加知母黃蘗各壹錢五味子玖粒麥門冬壹錢主之若兼有宿食不消心下痞者去升麻人參加枳實黃連各壹錢主之若不能眠者加遠志酸棗仁各壹錢茯神壹錢半主之元氣弱人虛倍用人參自汗盜汗倍用黃芪食少胃弱倍用白朮外熱多倍加軟苗柴胡之類

吳夫大病新瘥後血氣虛弱餘熱未盡古人所謂如大水浸牆水退則牆蘇不可犯之但宜安臥守靜以養其氣或或早起動勞則血氣沸騰而發熱也證言脈浮者以汗解之脈實者以下解之若不可汗不可下宜小柴

胡湯隨證增損以和之或濈濈汗出而解或寒顫汗出而解也凡新瘥後虛煩不得眠者麥胡溫膽湯加酸棗仁主之氣虛羸少氣氣逆欲嘔者竹葉石膏湯主之虛熱煩燥者亦用此湯去半夏主之活人書治勞復身熱者豭鼠屎湯主之千金治勞復以麥門冬湯主之易老加人參以益元氣也若身熱食少無力者以參胡三白湯或補中益氣湯增損主之如無熱而下虛有寒者以黃芪建中湯虛甚者以大建中湯人參養榮湯之類主之若陰虛火動者必少加知母黃蘗以救腎水也

凡新瘥後只宜先進白稀粥湯次進濃者又次進糜粥亦須少少與之常令不足則可不可盡意過食之也其諸般肉食等物皆不可食經言病人新差脈已解但日暮微煩者此食穀早或多故也蓋胃弱不能消化宜減穀則愈矣經言食復發熱者以枳實梔子豉湯主之如宿食內結大便不去者加大黃如圍棋子大五六枚下之入門食復發熱不解者以柴胡湯加減隨證用之若食少胃弱痞悶者以四君子湯為主而加味以主之如有表熱加軟苗柴胡內外有熱少佐黃芩心下痞悶心煩有內熱加枳實黃連如不眠更加酸棗仁有痰加橘紅半夏嘔吐者亦加之如米食不化加神麯麥糵肉食

不化加棠求子枳實青皮之類消導之也貴在通變而已

女勞復

凡男子大病瘥後早犯女色而為病者名曰女勞復也其候頭重不舉目中生花腰背疼痛或小腹裏急絞痛或憎寒發熱或時陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶活人書以豭鼠屎湯主之有熱者以竹皮湯燒裩散主之千金方以赤衣散主之虛弱者以人參三白湯調下赤衣散為妙若小腹急痛脈沉逆冷者以當歸四逆湯加附子以吳茱萸送下赤衣散救之仍以吳茱萸一升酒拌炒熨小腹為佳凡卵縮入腹離經脈見者死不可救也

竹皮湯　治女勞復頭重不舉目中生花腹中絞痛有
熱者

青竹皮

右用水二鍾煎至七分温服之

千金赤衣散　治女勞復并陰易

室女月經布近隱處者燒灰用白湯下日三服

凡酒味苦辛乃大熱有毒者也且大寒惟酒不冰其熱
可見也蓋傷寒熱病本熱未解而欲飲酒則轉加熱盛
而病增劇若脉弦大者須用小柴胡湯加葛根黃連烏
梅主之若脉洪大者以人參白虎湯加葛根黃連主之
或竹葉石膏湯黃連解毒湯皆可用多加雞距子尤妙

瘥後諸病

水氣　大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之（大病差後脾胃氣虚不能制約腎水水溢下焦腰以下爲腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也）

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬　澤瀉　栝蔞根　蜀漆洗去腥

葶藶熬　商陸根熬　海藻洗去鹹已上各等分

右七味異擣下篩爲散更入臼中治之白飲和服方
寸匕小便利止後服日三（鹹味涌泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣内經曰濕淫於内平以苦佐以酸辛以苦泄之蜀漆葶藶栝蔞商陸之酸辛與苦以導腫濕）

喜唾　大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥
温之宜理中丸（汗後陽氣不足胃中虚寒不内津液故喜唾不了了與理中丸以温其胃加益智仁便佳）

千金方瘥後口乾喜唾或咽痛用大棗十枚烏梅三
箇共搗細入煉蜜丸如棗核大含口中徐徐嚥下或
咽痛不愈者以山豆根凉水浸含嚥苦汁亦佳

欲吐　傷寒解後虚羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主
之（傷寒解後津液不足而虚羸餘熱未盡熱則傷氣故少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱）

竹葉石膏湯方

竹葉貳把　石膏壹斤　半夏洗半升　人參叁兩

甘草貳兩　粳米半升　麥門冬去心壹升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯

成去米溫服一升日三服

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參粳米之甘以補不足辛者散也氣逆者欲其散半夏之辛以散逆氣

日暮微煩　病人脈已解而日暮微煩以病新差人強與

穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈陽明王於申酉

戌宿食在胃故日暮微煩當小下之以損宿穀　只用梔子豉湯若穀加枳實

以前俱出仲景書　以後續增

補遺

驚悸茯神散　治傷寒後虛羸心氣之力弱驚悸多忘

茯神　黃芪　菖蒲各壹兩

白芍藥　人參各半兩　遠志去心柒錢半

右㕮咀每服五錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓溫服

龍齒丸　治傷寒後伏熱在心心虛驚悸

龍齒　人參　生乾地黃

茯神各壹兩　遠志一分　鐵粉細研各半兩

黃連去須　馬牙硝細研　防風各柒錢半

麝香細研五分　麥門冬去心焙壹兩半

右爲細末都研令勻煉蜜和丸如梧子大每服二十

丸竹葉金銀湯下不拘時服

溫膽湯　治傷寒瘥後調理

半夏湯泡　茯苓去皮　陳皮去白

枳實麩炒各壹錢　竹茹壹錢　甘草半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

加味溫膽湯　治瘥後心膽虛怯觸事易驚夢寐不安

氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自

汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安

枳實麩炒　半夏湯泡　白茯苓去皮

橘紅　人參各壹錢半　竹茹

香附　麥門冬去心　柴胡

桔梗各柒分　甘艸三分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不

拘時服

煩熱柴胡湯　治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手

足無力不能飲食

柴胡　赤茯苓　鱉甲去裙襴醋浸炙

黃芪各壹兩　秦艽　地骨皮

黃芩(去黑心) 枳殼(去瓤麩炒) 葛根(各半兩)
甘草(炙) 人參(各三錢半)
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分不拘時溫服

虛汗鱉甲散 治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向晚發寒

鱉甲(一兩醋炙) 附子(炮去皮臍) 甘草(炙)
肉蓯蓉(酒浸炙) 人參 黃芪
熟地黃 桃仁(去皮尖麩炒) 枳殼(去瓤麩炒)
杜仲(炙) 五味子 柴胡
牛膝(各三錢半) 牡蠣(煆) 蒼朮(炒各半兩)

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分不拘時溫服

治傷寒後虛羸日夜汗出不止心燥口乾咽喉不利

黃雌雞(一隻去腸肚[illegible]) 牡蠣(煆粉)
麻黃根(各二兩) 肉蓯蓉(酒浸一宿刮去皮切)
右先將雞麻黃根以水七大盞煮取汁三大盞去雞麻黃根後下肉蓯蓉牡蠣煎取一盞半去滓分三服空心午前夜後臨臥時服

治大病差後多虛汗

龍骨 牡蠣(煆粉) 麻黃(各等分)
右爲末以粉身

喘嗽紫菀散 治傷寒後肺痿勞嗽唾膿血腥臭連連不止漸將羸瘦

紫菀(洗去土) 天門冬 貝母(炒黃各壹兩)
生乾地黃 桔梗(各半兩) 百合
知母(各半兩)
右㕮咀每服肆錢水一鍾半煎六分去滓溫服無時

夢泄牡蠣散 治傷寒後虛損心多怔悸夜夢泄精

牡蠣(煆粉) 桂心 鹿茸(酥炙)
白芍藥 龍骨(各壹兩) 甘草(炙半兩)

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑壹錢棗三枚煎至五分去滓食前溫服

麢羊角丸 治傷寒夜夢精泄不禁身體枯燥瘦瘠骨立者

麢羊角屑 犀角屑 石龍芮
韭子(炒) 龍骨 硃砂(細研水飛)
鹿茸(酒炙) 澤瀉(各壹兩半) 桂心
木香(各壹兩)
右爲細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒下

失音二瀝湯　治傷寒失音不語

竹瀝　荆瀝　梨汁各叄合

右攪令勻以綿濾過分溫四服空心日晚各一服

嘔噦人參湯　治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆

人參　白茯苓去皮　半夏湯洗七次炒

陳皮去白　白朮各半兩　麥門冬各一兩去心

黃芪各壹兩　甘草炙貳錢半

右㕮咀每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

下利訶梨勒丸　治傷寒後膿血利下部疼痛

訶梨勒煨去核　人參各壹兩　白茯苓去皮

當歸焙　木香　白芷各柒錢半

牡丹皮半兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下日再服

黃連丸　治傷寒熱病後熱毒下利膿血

黃連炒柒錢半　烏梅肉炒貳兩

右為細末煉蜜入少蠟和搗五六百杵丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸空心米飲下

訶梨勒飲　治傷寒後氣不和自利無度

訶梨勒肆枚二生二煨去核　草豆蔻肆枚二生二煨去皮

右㕮咀每服二錢匕漿水一盞煎至六分去滓空心溫服

煖腸丸　治傷寒汗下後大小便自利腹中痛者

附子壹枚炮　乾薑壹兩　龍骨

吳茱萸　訶梨勒去核　御米殼各半兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫水下利止勿服

腰痛治傷發汗吐下後體虛元臟積冷氣刺腰痛轉動艱難

原蠶蛾半斤　糯米半升

右二味同炒令米色焦然後搗羅為末每用半兩以米醋調如稀糊入銚子內煎攪令稠乘熱攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷即易之

杜仲酒　治傷寒後體虛元臟挾風冷腰膝疼痛行履不得

杜仲去麄皮炙貳兩　獨活半兩　附子炮裂去皮臍

牛膝各壹兩　仙靈脾柒錢半

右細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後開每日取三二合溫服日三服未差再浸服

不得眠梔子烏梅湯　治傷寒瘥後不得眠

梔子　黃芩各貳錢　柴胡叁錢

甘草壹錢　烏梅叁箇去核

右作一服水二鍾生薑三片竹葉十四片豆豉三十粒煎至一鍾不拘時服

發豌豆瘡千金方治豌豆瘡只以黃連一味酒炒水煎服之外以赤小豆為末入雞子清和塗瘡上其效如神

遺毒凡傷寒汗出不徹邪熱結耳後一寸二三分或耳下俱腫鞕者名曰發頤此為遺熱成毒之所致也宜速

消散則可若緩則成膿又為害也

連翹敗毒散　治發頤初腫服此消之

羌活中　獨活中　連翹上　荊芥中

防風中　柴胡中　升麻下　桔梗中

甘草下　川芎中　牛蒡子新瓦上炒研中

當歸尾酒洗中　紅花酒洗下　蘇木下

天花粉中

右用水一鍾好酒一鍾同煎一鍾去滓徐徐溫服如未消加穿山甲蛤粉炒壹錢　腫至面者加香白芷壹錢漏蘆伍分如大便燥實者加酒浸大黃壹錢半　壯者倍用之

凡內有熱或寒熱交作者倍用柴胡加酒洗黃芩壹錢酒炒黃連壹錢

消毒救苦散　消腫散毒用米醋調塗傳四圍留頭如乾即又傳

大黃叁錢　黃芩　黃連　黃蘗

芙蓉葉　大薊根　白芨　白斂

天南星　半夏　紅花　檀花

當歸尾　赤小豆　白芷各壹錢半　朴硝

雄黃另研末各壹錢

一方用見腫消草生白芨白斂土大黃生大薊根野苧

麻根共搗成餅入朴硝一錢和勻貼腫上留頭勿貼如乾即換之若更加生山慈菇金線重樓根尤妙

內托消毒散　治發頤有膿不可消者已破未破服之

人參中　黃芪上　防風中　白芷中

川芎中　當歸中　桔梗中　連翹中

升麻中　柴胡中　金銀花中　甘草節中

右用水一鍾好酒一鍾同煎一鍾去滓徐徐溫服瘡破者以玄武膏貼之四圍赤腫不退者仍以前藥塗之兼服蠟礬丸最妙

昏沈凡傷寒汗出愈後漸覺昏昏不醒如鬼祟之狀或

譫語呻吟者此因汗出未盡邪熱伏于心胞所致也活人書用知母麻黃湯以汗之但慮病後血氣俱虛豈可與發汗若羸弱人虛者只宜十味溫膽湯加黃連主之若有寒熱潮熱日晡發熱者以小柴胡湯隨證增損主之

傷寒瘥後虛弱治例

當歸六黃湯　治傷寒新瘥後虛熱盜汗不止

當歸身酒洗 黃蘗炒 黃芩炒各柒分
黃連炒伍分 黃芪蜜水炙壹錢 生地黃酒洗
熟地黃酒蒸各壹錢

右作一服水二鍾煎至八分食遠溫服之

加味黃芪建中湯　治陽虛無熱惡寒盜汗無力下虛者

黃芪 白芍藥各貳錢 當歸壹錢半
人參 白朮 麻黃根 牡蠣粉各壹錢
官桂伍分 飴糖壹匙 大棗貳枚

右煎法同前

滋陰補腎丸　治病後陰虛精血不足四肢少力心神不寧夜夢遺精或虛熱盜汗飲食進少不為肌肉身體羸弱面色青黃而無血色宜服此丸滋腎水制虛火大有益也

熟地黃酒蒸 生地黃酒浸 白朮各貳兩 人參
麥門冬去心 五味子 當歸酒浸 白芍藥酒炒
川芎 黃芪蜜水炙 山藥 蛤粉另研極細
茯神去皮木 砂仁各壹兩 知母炒壹兩半 黃蘗炒貳兩

右十六味共為細末煉蜜和成於石臼內杵千餘下丸如梧桐子大每服五十丸空心淡鹽湯下

加味補陰丸　治證同前

黃蘗鹽酒拌炒四兩 熟地黃 知母鹽酒拌炒
敗龜板酥炙各 虎脛骨 鎖陽酥炙
白芍藥酒炒 當歸酒浸 川牛膝酒洗
杜仲鹽酒炙去絲 砂仁以上各壹兩

若冬月天寒加乾薑炮伍錢

右為末煉蜜入猪脊髓五條共搗和成石臼內杵千餘下丸如梧桐子大每服五十丸空心淡鹽酒或鹽湯下

硃砂安神丸　治病後心神不安夜臥不寧或亂夢不得眠

硃砂另研水飛貳錢用一半為衣 黃連炒
生地黃酒洗焙乾各壹錢半 當歸身酒浸壹錢

甘草炙半錢

右為細末湯浸蒸餅糊為丸如菉豆大硃砂為衣陰乾每服三十丸以口中津液嚥下或燈心湯下

加味枳术丸　治病後胃弱食少服此進飲食強胃氣

枳實炒　神麯炒　大麥蘖炒　棠毬子

陳皮各壹兩　人參　白术各貳兩

右為末荷葉燒飯和丸如梧桐子大每服七八十丸白湯下如夏有熱加薑炒黃連半錢如冬月天寒加砂仁壹兩如氣鬱不舒暢加香附壹兩如痰多加橘紅壹兩去陳皮更加半夏麯壹兩

六君子湯　治傷寒汗下之後將見平復宜服此調理助脾進食辟邪氣大妙

人參　白术　黃耆

白茯苓　山藥　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎至七分去滓溫服

養脾湯　治傷寒後脾胃虛弱不思飲食

茯苓　乾薑炮各壹兩　白术貳兩

丁香　人參　甘草各半兩

右如法事治一處擣羅為末每服三錢水一盞煎至六分溫服日三不拘時候

健脾散　治傷寒後脾胃虛弱不欲飲食縱食不能消化

訶黎勒皮　白术　麥蘖炒令微黃

人參各壹兩　乾薑炮裂半錢　神麯炒

甘草炙　枳殼麩炒　大腹皮各半兩

右㕮咀每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時稍熱服

陰陽易

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩散主之

燒裩散取婦人中裩近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩襠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房室命在須臾用獨參湯調燒裩散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

○附

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛名曰陰陽易其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女並不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒著於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不即死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便恍恍翕翕氣力轉小着床不能動搖起止仰人或牽引歲月方死宜燒裩散豭鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯乾薑湯當歸白朮湯選用之海藏云熱者燒裩散竹皮湯寒者豭鼠糞湯當歸白朮湯至于枝正乃知者也修丁治雜病陰陽易中有牛黃腎應之類是治其熱瘥也

青竹茹湯　婦人病未平復因有所動致熱氣衝胸手足拘急搐搦如中風狀宜此湯

瓜蔞根無黃者二兩　青竹茹刮半升

右以水二升煮取一升二合去滓分二三服

妙香丸　治陰陽易不瘥大便不通心神昏亂驚惕不安者

辰砂另研一兩水飛　水腦　膩粉

麝香　牛黃各半錢半　金箔伍片

巴豆霜一錢半

右為細末入黃蠟一兩蜜一小匙同煉勻和藥為丸每藥一兩作三十丸米飲下五丸弱者三丸壯者或七丸亦可取大便通即止

一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

海藏云若陰陽易果得陰脉當隨證用之　若脉在厥陰當歸四逆湯送下燒裩散　若脉在少陰通脉四逆湯送

下燒裩散　若脉在太陰四順理中丸送下燒裩散所用之藥各隨其經而效自速也

豭鼠糞湯　療傷寒病後男子陰易

韭白根（壹把）　豭鼠糞（拾肆粒兩頭尖者是）

右二味以水五升煮取半升去查再煎三沸温服得効未汗再服亦理諸勞復

當歸白术湯　治婦人未平復因有所動小腹急痛腰胯四肢不任舉動無方發熱者

白术　當歸　桂枝

附子生　甘草　芍藥

黃芪　人參（各貳錢半）　生薑（半兩）

右㕮咀水煎服食頃再服温覆取微汗差

李良佐子病太陽證尺寸脉俱浮數按之無力余見其內陰虛與神术加乾薑湯而愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脉返沉小始見陰候又與已寒加芍藥茴香等丸五六服一日內約服丸六七百丸脉復生又用大建中接之大汗作而解

山因女色病陰證傷寒者用陳皮熟鍋內炒焦以酒烹下濾酒飲之

韭根散　治傷寒後陰陽易頭重百節解痛翕翕氣劣著床不能起動甚者手足拳卵腫疼痛

韭根　括蔞根（各貳兩）　青竹茹

乾薑（炮各半兩）

右細剉和勻分八服每服用水一大盞煎至五分去滓入鼠糞末一字攪勻不拘時服聖濟方揚飾五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前温服一名豐本湯

治傷寒婦人得病雖瘥未滿百日不可與交合為陰陽易之病必身體拘急手足拳欲死丈夫病名曰陰易婦人病名曰陽易速當汗之可痊滿四日不可療宜

令服此藥其病體重小腹急熱上衝胸頭重不能舉眼中生花膝脛拘急

用乾薑（肆兩）為末沸湯調溫進服以衣被覆出汗方解手足伸而愈

二灰散　治傷寒陰陽易

手足指甲（貳拾片男病用女/女病用男者）

中衣襠（用女女病用男/近陰處方寸男病）

右並燒作灰研令細分三服不拘時用溫酒調下或米湯調服亦可

醫林曰雖經脉見多主效太過曰至一呼三至曰至不

及曰損一呼一至曰損二脉惟陰陽易病有之

張假如婦人病新瘥未平復而男子與之交因感外邪而卒病實非餘邪相染醫見病速謂之陰易于法何以別乎夫易病者有上條所見之證存焉其與外所感豈相侔哉設若風寒外傷當有表證安有小腹裏急引陰中拘攣者乎或又云假如男子病新差未平復強合陰陽而自病乃小腹裏急引陰中拘攣證同易病求其理何故不染易他人而自復未審其證治可同何法也病雖自理復與易同亦用燒裩散以[illegible]安其氣夫易病之為合陰陽感動餘邪而其人正氣本虛故能染著不然安得受其邪哉今病自復緣此氣尚虛而餘邪因動悉非外感故與易同亦用燒裩散以安正氣正氣安餘邪自平矣

四時傷寒不同 此文已見首篇總例

冬為傷寒　春為溫病　夏為暑病　秋為瘧

一歲長幼病相似為疫　多眠多汗脉浮為風溫

一身盡痛為濕　身反張為痓

吳夫傷寒之病自霜降之後天令大寒而感之者乃傷寒也若天令溫暖而感之者為冬溫也如至春天令溫暖有人壯熱為病者乃溫病也若天令尚寒冰雪未解而感寒者亦曰傷寒也若三月至七八月之間天道忽有暴寒而感之者此名時行寒疫也若夏至後壯熱脉洪者謂之熱病也如四時天令不正感而為病長幼相似互相傳染者謂之時行之氣也夫時氣者一曰時疫蓋受天地疫癘之氣而為病乃非寒也又有溫瘧風溫溫毒溫疫中風傷風中濕風濕中暑中暍濕溫等證一皆發熱狀似傷寒故醫家通以傷寒稱之者為發熱傳變皆相類也至于用藥則不同矣但發表解肌有差別爾蓋冬月傷寒者人之著寒而即病也若不即病至春變為溫病至夏變為熱病溫病熱病乃因伏寒為變既變不得復言其寒矣其寒疫乃天時之暴寒與冬時之嚴寒又有輕重之不同時氣自是天行疫癘之氣又非寒比也溫病乃山澤蒸氣暑病乃炎日之火風乃天之

傷寒與中寒不同

賊邪傷于人者也有中者爲重傷者爲輕温瘧風温等病又是傷寒壞證更感異氣所變各有其因不同豈可通以傷寒稱而治之如不識其名妄行治療本中暑作熱病治之濕温作風温治之虛實混淆是非紊亂夭人天年可不慎哉

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子湯加發散劑血虛者四物湯加發散劑東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏治風濕無汗者用神朮湯有汗者用白朮湯治剛痓用神朮湯加羌活麻黄治柔痓用白朮湯加桂心芪朮治風濕用白朮湯隨證加藥治中暍脉弦細芤遲者用黄芪湯此皆與仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒同意也

丹仲景論傷寒而未及乎中寒先哲治冒大寒昏中者用附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同者夫傷寒有卽病有不卽病因其舊有鬱熱風寒外來肌膚自密鬱發爲熱病邪循經而入以漸而深初用麻黄桂枝輩微表而安以病體不甚虛也若中寒則倉卒感受其病卽發而暴因其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可發温補自解此氣大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也除傷寒外雜病首卷晰矣

冬爲傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒卽病者謂之傷寒也治法除暑濕瘧疾外皆傷寒法也

春爲温病

從立春節後其中無暴大寒又不氷雪而有人壯熱爲病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變爲温病（春温應常經者相四歲少陽司天之政初之氣太陽司天之政初之氣陽明司天之政終之氣太陰司天之政二之氣皆新温其不合常江二以常者不可復之而遺其寒暑也）

内經曰冬傷於寒春必病温李明之曰冬傷於寒者冬行秋令也當寒而温火勝而水虧矣水既已虧則所勝妄行土有餘也所生受病金不足也所不勝者侮之火太過也火土合德濕熱相助故爲温病所以不病於冬而病於春者以其寒水居卯之分方得其權大寒之令復行於春腠理開泄少陰不藏房室勞傷辛苦之人陽

氣泄於外腎水虧于内當春之月水當發生陽以外泄孰爲鼓舞腎水内竭孰爲滋養此兩者同爲生化之源源既已絶木何頼以生乎身之所存者熱也時强木長故爲温病

論曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲温病釋曰太陽病者脉浮頭項痛而腰脊强也傷於寒者當惡寒若不惡寒而渴者轉屬陽明則表證已罷邪傳于裏矣今不惡寒則非傷寒證似陽明而與太陽兼見則非傷寒之陽明也故決其爲温病

活人書云夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脉浮緊者温病也春月傷寒謂之温病冬傷於寒輕者夏至已前發爲温病蓋因春温煖之氣而發也（又非温疫也）治温病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也（初秋發於陽氣在裏此病當輕緩不用藥治之五六日亦自安）升麻湯解肌湯柴胡桂枝湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝也嗽者小柴胡加五味子也或煩渴發熱不惡寒者並竹葉石膏湯次第服之麻黄桂枝大青龍唯西北二方四時行之無有不驗若江淮間地偏煖處唯冬月及正初乃可用正方自春末至夏

至巳前桂枝麻黄大青龍内宜加減也　按活人所云温病有二其用升麻解肌等者乃正傷寒太陽證惡寒而不渴者特以其發於温煖之時故謂之温病爾其用竹葉石膏湯者乃仲景所謂渴不惡寒之温病也要須細别勿令誤也然不惡寒而渴之温病四時皆有之不獨春時而已

温毒陽脉洪數陰脉實大者遇温熱變爲温毒（冬此熱未已又感温熱者也陽主表陰主裏洪數實大皆熱也兩熱相合變爲温毒）

活人云初春發斑咳嗽爲温毒

冬有非節之煖名曰冬温此即時行之氣也若發

斑者又曰溫毒而亦時氣發斑也又傷寒壞病陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變爲溫毒其病最重也蓋此因前熱多日不解更感溫熱之氣而爲病故曰重也若無汗者以三黃石膏湯汗之若有自汗者宜人參白虎湯主之煩熱錯語不得眠者白虎合黃連解毒湯主之表熱又盛者更加柴胡主之若內實大便不通宜三黃瀉心湯下之或大柴胡湯加芒硝下之亦可若斑出如錦紋者多難治也宜人參化斑湯玄參升麻并黑膏大青四物湯主之方見發斑

發汗不解身灼熱爲風溫其證脈浮汗出身重多眠鼻

病不獨見於春附

故另立風溫門

〔診〕尺膚熱甚脈盛躁者病溫也　夫精者身之本也故藏於精者春不病溫

〔針灸〕凡治溫病可刺五十九穴　成註云所謂五十九穴者刺兩手內外側各三凡十二痏五指間各一凡八痏足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三凡六痏巔上一顖會一髮際一廉泉一風池二天柱二內經云氣口人迎躁者取之若氣口人迎皆躁者勿刺也人迎□□□躁也　王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行五行者以越諸陽之熱逆也謂頭中行上星顖會前頂百會後頂五穴頭第二行兩傍五穴承光通天絡却玉枕十穴第三行兩傍臨泣目窗正營承靈腦空十穴也　大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也　氣街三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也　雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也　五藏俞傍五此十者以瀉五藏之熱也謂背第五行兩傍魄戶神堂魂門意舍志室十穴也

汗下後過經不解溫病

○附

雲傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經之所在而取之　如太陽證汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽溫病也　如身熱目疼汗下後過經不愈

診得尺寸脈俱長者陽明溫病也　如胸脇痛汗下後過經不愈診得尺寸脈俱弦者少陽溫病也　如腹滿嗌乾診得尺寸脈俱沉細過經不愈者太陰溫病也　如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也　如煩滿囊縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而取之隨其證而治之如發斑乃溫毒也

〔汪〕愚謂溫與熱有輕重之分故仲景云若遇溫氣則爲溫病更遇溫熱則爲溫毒熱比溫爲尤重故也苟但冬傷于寒至春而發不感異氣名曰溫病此病之稍輕者

也溫病未已更遇溫氣變為溫病亦可名曰溫病此病之稍重者也傷寒例以再遇溫氣名曰溫疫又有不應冬月傷寒至春而病溫者此特感春溫之氣可名曰春溫如冬之傷寒秋之傷濕夏之中暑相同也以此觀之是春之病溫有三種不同有冬傷于寒至春發為溫病者有溫病未已更遇溫氣則為溫病與重感溫氣相雜而為溫病者有不因冬傷于寒不因更遇溫氣只于春時感春溫之氣而病者若此三者皆可名為溫病不必各立名色只要知其病源之不同也

升麻解肌湯方　治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根壹兩　麻黃去節湯泡柒錢半　黃芩

芍藥各半兩　桂心　甘草炙各貳錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半棗一枚煮八分服日三三四日不解脉浮者宜重服取汗脉沉實者宜下之

升麻葛根湯　治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹已發未發皆可服之

升麻　芍藥　甘草各貳錢半

乾葛叁錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

柴胡升麻湯　治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾咳嗽涕唾稠粘

柴胡去苗　乾葛　荊芥去梗

赤芍藥　石膏各壹錢半　前胡去苗

升麻　桑白皮　黃芩各壹錢

右作一服水二鍾生薑三片豆豉二十粒煎至一鍾不拘時服

三黃石膏湯

石膏叁錢　黃芩　黃連各貳錢

黃蘗　山梔仁各壹錢伍分　香豉百粒

麻黃貳錢若天寒用叁錢　甘艸壹錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾濾清通口服以衣被覆取汗而愈

夏為暑病

按中暍中暑中熱名雖不同實一病也若冬傷于寒至夏而變為熱病者此則過時而發自内達表之病俗謂晚發是也又非暴中暑熱新病之可比或曰新中暑病脉虚晚發熱病脉盛

暍病治法有清熱有解肌

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也 [illegible] 白虎湯

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚 [illegible]

太陽中暍者身熱疼重而脉微弱此亦夏月傷於水水行皮中所致也 經曰脉虚身熱得之傷暑 [illegible]

中暍與傷寒相似而異 張氏曰清邪中上濁邪中下其風寒濕者皆地之氣係濁邪所以俱中足經惟暑乃天之氣係清邪所以中手少陰心經也其證多與傷寒相似但暍與傷寒脉不同耳夫傷寒雖惡寒發熱初病未至於煩渴惟暑則不然初病即渴所以與傷寒為異也且傷寒之脉必浮盛中暑之脉虚弱或弦細芤遲者有之經曰脉盛身寒得之傷寒脉虚身熱得之傷暑此之謂也假如太陽病項背強几几反汗出惡風若當炎暑之時豈不與中暍相似惟其不渴故與桂枝加葛湯主之至居夏秋之令炎暑之時必當依經詳審則無差失之患矣 汪氏證言之傷寒惡寒傷熱惡熱以脉言之傷寒脉盛傷暑脉虚且暑脉虚細與濕痓之脉有相似

者而證則不同暑則自汗而渴濕則不渴痓則身疼也

脉洪身熱惡寒為熱病 活人云夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脉洪盛者熱病也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩躁者宜大青龍湯然夏月藥性須帶凉不可大温桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之比夏月服之必有發黃斑出之失熱病三日外與前湯不瘥脉勢仍數邪氣猶在經絡未入藏府者桂枝石膏

湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍證用也若三月至夏為晚發傷寒梔子升麻湯亦可選用之萬曆癸卯廣化李氏一醫應舉于南京時方盛暑傷寒一太學生斷讀仲景書自說知醫投以桂枝湯入腹即斃大抵麻桂二湯乃隆冬正傷寒之藥施之溫熱病不可況熱病乎

桂枝石膏湯　治法見前論有汗脉緩為桂枝證無汗脉緊為麻黃青龍證

桂枝去皮壹兩半　黃芩各半兩　梔子參錢
白芍藥　升麻　乾葛
生薑[illegible]　石膏碎　甘草炙各壹兩

右㕮咀每服五錢半水一盞半煮至八分去滓溫服

再服若得汗即停後服

梔子升麻湯　治晚發傷寒三月至夏為晚發

生地黃切碎壹斤　梔子拾枚擘　升麻壹兩半
柴胡　石膏各貳兩半

㕮咀每服五錢水一盞半煎八分頓服病不解更作服自夏至以後時令炎暑有人壯熱煩渴而不惡寒者乃熱病也凡脉浮洪者發于太陽也洪而長者陽明也弦而數者少陽也然此發在三陽為可治若脉沉細微小足冷者發在三陰為難治也大抵熱病大熱須得脉洪大有力或滑數有力乃為脉病相應為之可治若小弱無力為之難治若人虛脉弱者宜以人參湯與之而扶其元氣也不可以攻其熱如脉洪身疼壯熱無汗煩亂者宜六神通解散發汗則愈或人參羌活散加葛根淡豆豉生薑以汗之輕者只用十味芎蘇散汗之亦佳如夾暑加香薷扁豆雙解之若兼有內傷生冷飲食停滯或嘔吐惡心中脘痞悶或惡風或增寒拘急者宜藿香正氣散加香薷扁豆葛根以發汗名二香湯也若發散熱不解者在太陽經宜用人參羌活散加黃芩在陽明經宜用升麻葛根湯加黃芩熱甚燥渴脉大者白虎湯加人參主之在少陽宜用小柴胡湯隨證增損治之

若夾暑者加黃連香薷主之若熱而大便自利小便不利煩渴者五苓散去桂加葛根黃連香薷滑石之類主之若表裏俱熱而自利脉浮數而小便不利者小柴胡湯合四苓散主之若其不解或傳經變證或裏實可下或陰寒可溫或發斑黃等證皆從正傷寒條內治之也

凡熱病一二日泄利腹滿熱甚者死三四日目昏譫語熱盛而脉小者死四五日熱盛脉小足冷者死五六日汗不出嘔吐譫語昏沉脉急促者死六七日舌本焦黑燥者死七八日衄血吐血躁熱脉大者死九日發痙搐搦昏亂者死凡熱病脉促結代沉小皆難治也熱病不

得汗而脉躁急者死以得汗而熱反盛脉躁急者死也
脉虛身熱惡寒為中暑治法方論詳雜病本門及後條
脛冷腹滿頭痛渴而無熱者濕溫活人云濕溫者兩脛
逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於濕因而中暑
濕熱相搏則發濕溫其脉陽濡而弱陰小而急治在太
陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面
色變名曰重暍如此死者醫殺之耳白虎加蒼术湯主
之
許癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多
汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之
傷寒夏為暑病 脉之七 三十九
其脉關前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋先受暑後
受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次白虎
加蒼术湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪
誤用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五
邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前
來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微
邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得
之為賊邪今心先受暑而濕邪勝之水尅火從所不勝
斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經曰濕溫之脉陽濡
而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於
陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊
邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漐
漐未嘗乾每服此藥二三盞即愈
海濕溫汗少者白虎加蒼术汗多者白虎加桂枝白虎加桂枝方見
孫保慶門外方汚家姪妻者喜歡得孫愛之忽數日不
見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足
冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急問其所服
藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病
耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏
傷寒夏為暑病 脉之七 四十七
既安詣孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願
聞治法孫曰汝病傷暑也始則陽微厥而脉小無力衆
醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便
則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷兩臂亦冷
汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也
保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微凉自汗
四肢沉重謂之濕溫蒼术石膏湯主之即白虎加蒼术湯
蒼术石膏湯方
蒼术半兩 石膏叁錢 知母半貳錢 甘艸壹錢
右㕮咀水一盞煎至半盞溫服胃內有濕也多不欲

飲水如身熱脉洪無汗多渴者熱在上焦積於胸中
宜桔梗散此非濕溫病乃熱病也

桔梗散方

薄荷　黃芩　甘草　梔子各壹錢
連翹貳錢　桔梗叁錢

右剉每服五錢水煎加竹葉如大便澁加大黃半兩

脉虛身熱得之傷暑　劉純曰按許學士云傷暑其脉弦細芤遲何也内經曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則氣消而脉虛弱所謂弦細芤遲皆虛脉也仲景以弦爲陰而朱肱亦曰中暑脉細弱則皆虛脉也可知矣

暑證有冒有傷有中　戴氏曰冒傷中三者輕重之分或腹痛水泄胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲此二者冒暑也可用黃連香薷飲黃連退熱香薷消暑　或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此爲熱傷肉分當以解毒白虎湯加柴胡氣虛加人參　或咳嗽發寒熱盜汗不止脉數者熱傷肺經火乘金也此爲中暑宜用清肺湯柴胡天水散之類

夏月伏陰在内　丹溪曰夏月陽氣盡出于地人之腹屬地氣於此時浮于肌表腹中虛矣夏月伏陰在内此陰字有虛之義若作陰冷看誤矣前人治暑有用大順散溫熱藥者蓋以凉亭水閣寒泉氷雪所傷也非爲伏陰而用火令之時爍石流金有何陰冷孫眞人令人夏月服生脉散非虛而何　劉氏曰潔古謂靜而得之爲中暑動而得之爲中熱東垣謂避暑於深堂大厦得之曰中暑宜大順散勞役得之曰中熱宜蒼朮白虎湯夫暑熱一也夏令之氣也靜居堂厦而病乃夏月傷冷之病何以中暑而求別于中熱耶　王氏曰竊謂暑熱者夏之令也火行于天地間人或勞役或飢餓元氣虧之不足以禦天令亢極于是受傷而爲病名曰中暑亦名曰中熱其實一也今乃以動靜所得分之何哉夫中暑者

固多在勞役之人勞役則虛虛則邪入邪入則病不虛則天令雖亢亦無由以傷之避暑于深堂大厦得頭疼惡熱等證者蓋亦傷寒之類耳不可以中暑名之其所以煩心與肌膚大熱者非暑邪也身中陽氣受陰寒所遏而作也既非暑邪豈可以中暑名乎苟欲治之則辛溫輕揚之劑發散可也夫大順散一方甘草最多乾薑杏仁肉桂次之除肉桂外其三物皆炒其初意本爲病者伏熱引飲過多脾胃受濕嘔吐水穀不分藏府不調所立故甘草乾薑皆火炒又肉桂而非桂枝盖溫中藥也其杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得

之之證吾恐不能解表反增內煩矣今世俗往往不明類曰夏月陰氣在內大順散為必用之藥夫陰氣非寒氣也蓋夏月陽氣發散在外而陰氣則在內耳豈空視陰氣為寒氣而用溫熱之藥乎陰果為寒何以夏則飲水乎其蒼朮白虎湯雖宜用然亦豈可視為通行之藥乎必參之治暑諸方隨所見之證而用之然後合理夫所謂靜而得之證雖當暑月即非暑病宜分出之勿使後人有似同而異之惑

暑傷五藏為證不同陳氏曰暑入心則噎悶昏不知人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痿躄

入腎則消渴　徐氏曰暑邪之證變異不等非止歸五藏蓋人之形氣有虛實感有輕重輕則後時而發至秋成瘧痢是也重則即時而發如已上證至有輕變重重變輕亦自感有淺深傳有兼併況人之形志苦樂不一豈得無變異乎四時之證皆然

暑病宜補元氣東垣曰脾胃虛弱遇六七月濕旺汗泄身重短氣四肢痿軟脚欹眼黑此腎與膀胱俱竭之狀也況汗大泄則亡津液津者庚大腸所主三伏庚金受因木無可制故風濕相搏骨節煩疼也夫壬膀胱已絕于巳癸腎水已絕于午今更逢濕旺助熱為邪西北方之寒清絕矣聖人立法夏宜補者為熱傷元氣以人參麥門冬五味滋水之源瀉內火補庚金益元氣也

中暑發為痿厥諸證東垣曰長夏濕熱蒸人損傷元氣四肢困倦精神短少兩脚痿軟遇早晚之際則發寒厥日高之後復熱如火乃陰陽氣血俱不足也或心胸痞滿肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩小便黃而少大便溏而頻或利或渴自汗體重此血先病而氣不病也若濕氣相搏脈必洪緩而遲病雖互換少差其天暑濕令則一宜以清燥之劑治之或遠行大熱而渴則熱舍于腎故水不勝火發為骨痿此濕熱成痿也或熱厥而陰

虛或寒厥而氣虛四肢如火為熱厥四肢寒冷為寒厥寒厥腹中有寒熱厥腹中有熱為脾主四肢故也　徐氏曰此論暑熱證候則同冬月傷寒傳變為證之不一彼為寒傷形此為熱傷氣若元氣虛甚受病忽于一時不救者與傷寒陰毒頃刻害人實同故東垣啓是病例大開後人之盲瞶也宜與痿門互看

暑風賈氏曰此由火熱制金不能平木搐搦不省人事其脈虛浮浮者風也虛者暑也俗名暑風乃相火甚而行令也先以溫水化蘇合香丸次以黃連香薷飲加羌活或雙解散加香薷尤良

治暑大法 賈氏曰暑者相火行令也人感之其脉虛外證頭疼口乾面垢自汗倦怠或背惡熱甚者迷悶不省而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛泄利下血發黃生斑皆是其證治法清心利小便為上汗多者不可利宜白虎湯次分表裏以治如在表頭疼惡寒雙解加香薷及二香散十味香薷散如在半表半裏瀉泄煩渴飲水吐逆五苓散熱甚煩渴益元散若表解裡熱宜半夏解毒湯下神芎丸或老人及素弱人冒暑脉微下利渴而喜溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附半個冷飲次以來復丹五苓散治之凡夏月暑證不可服諸熱燥劑

致斑毒發黃小便不利悶亂而死矣 徐氏曰此言治暑之法可謂詳備然於暑風相火為病而用蘇合香丸至用雙解皆當審諦脉證不可差失詳蘇合丸但可用於陰寒所遏或內傷生冷及氣中或中惡者此等又不可謂暑風相火之證矣學者當之 陶氏曰中暑脉虛而伏身熱背惡寒面垢自汗煩躁大渴毛聳惡寒昏冒倦怠而身不痛與傷寒諸證不同內外俱熱口燥煩渴四肢微冷而身不痛用白虎湯 痰逆惡寒橘皮湯 熱悶不惡寒竹葉石膏湯 頭痛惡心煩躁心下不快小便不利五苓散下消暑丸 中暑用小柴胡湯最良

秋為瘧

夏傷於暑秋必病瘧 脉陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧 凡傷寒壞病前熱未除其脉陰陽俱盛重感寒邪變為溫瘧也寒熱往來口苦胸脇滿者小柴胡湯加芍藥少加桂枝主之若熱多者倍用柴胡寒多者倍用桂枝若熱甚而煩渴人參白虎湯少加薄桂主之若單熱無寒者不用桂也但有寒必少佐之如熱多者小柴胡湯合白虎湯主之痰多而熱者小柴胡合二陳湯主之若食少胃弱者加白木心下痞加枳實黃連脉虛者必倍人參口渴者去半夏加括蔞根主之若邪熱蘊結于

裏大便秘實脉滑大有力者以大柴胡湯下之若變瘧已正宜於雜病中求之

一歲長幼疾狀相似為疫

春應暖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時行疫病也　按說文民皆疾為疫從疒役聲今省作殳爾雅名厲癘也病氣流行中人如磨礪傷物也疫役也言有鬼行役役不住也後人有溫疫寒疫時氣大頭傷寒等名其實皆疫也俗謂之瘟病即溫病之訛而名實淆矣　按傷寒例云傷寒病熱未已再遇風寒濕而各變為一病也何至于溫瘧曰再遇溫熱變為溫毒矣又曰再遇溫氣變為溫疫是獨溫之再遇而有二病

之異且疫者特感非時之氣眾人病一般也如冬應寒而反大溫人感冬溫而病則所謂溫疫如春夏應溫熱而反大寒人感暴寒而病則所謂寒疫也何待再遇於異氣耶然云再遇溫氣變為溫疫是傷寒再遇異氣而變病也再遇異氣而變病未必眾人病相似安可以疫名之溫疫因陽脈濡弱陰脈弦緊此溫疫之脈也活人書注卻于冬溫條下是以溫疫冬溫合為一病殊不知冬溫特感非時之氣耳溫疫是傷寒再遇於異氣也豈可合為一病耶此理未明故贅此以似明哲愚謂感溫熱而為溫毒感溫氣而為溫疫此乃有微甚之分但

非時熱者之

疫字疑誤恐當作疾字若作疫字則冬溫又何一字長幼病相似也一家病相似方可言疫況此傷寒病熱未已再遇溫氣而病何至于一家傳染病相似哉

溫疫陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變為溫疫以此冬傷於寒發為溫病脈之變證方治如說此前熱未已又感溫氣者也溫熱相合變為溫疫

丹眾人病一般者天行時疫也有宜補宜散宜降

大黃　黃芩　黃連　人參

桔梗　防風　滑石　香附

蒼朮　人中黃

右麪糊為丸每服五七十丸分氣血痰作湯使送下氣虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

本藥清臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁浸阜角甘蔗治天行熱疾

丹解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少酒取無灰酒一處研去滓溫服須臾大瀉毒亦隨出雖十分渴亦不可飲水飲水難救

柴胡石膏湯　治時行溫疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

非時之寒為疫之

柴胡　石膏（煅）　赤芍藥
前胡　乾葛（各拾伍兩）　升麻（貳拾伍兩）
黄芩　桑皮（各叁拾柒兩半）　荊芥穗（叁拾柒兩）

右㕮咀每服五錢水一盞生薑三片豆豉十餘粒同煎七分去滓熱服小兒分三次更量大小加減不拘時候

右三方熱多寒多者宜之

按温疫之治與傷寒陽證相同然經所謂温疫者即温病也宜參温病條處之

寒疫活人云一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨證施行所以聖散子不問陰陽表裏也（傷寒寒疫辨之也）

老君神明散
白朮（壹兩）　桔梗（貳兩半）　附子（炮去皮臍）
細辛（各壹兩）　烏頭（肆兩炮去皮尖）

右五味為麤末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫癘者温酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄三寸匕以水一碗煮令大沸分三服

聖散子　蘇内翰序全文見活人書時毒流行用聖散子者一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一盞即時氣不入
草豆蔻（拾個麵裹煨去皮）　猪苓（去皮）　石菖蒲
茯苓　良薑　獨活（去蘆）　附子（炮裂去皮臍）
麻黄（去根）　厚朴（去皮薑汁炙）　藁本　芍藥
枳殼（麩炒去穰）　柴胡　澤瀉　細辛
防風（去叉蘆）　白朮　藿香　半夏
吳茱萸（湯洗）　蒼朮　甘草（各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎取八分去滓熱服餘查再煎空心服之（傷寒寒疫辨之也）

右二方治疫寒多表多者宜之

按寒疫之證必與傷寒陰證同乃可用煎熱藥至謂不問陰陽表裏無不取效決無此理後世以過信蘇長公故施聖散子殺人如麻者屢矣嗟乎可不慎哉

吳氏寒疫乃天之暴寒為病也凡四時之中天令或有暴風寒之作人感冒而即病者名曰寒疫也其證與正傷寒同但暴寒為輕耳治法若初作頭疼憎寒拘急或嘔逆惡心中脘痞悶或飲食停滯不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散增損一二味主之若已發熱者宜

用十味芎蘇散汗之若身痛骨節疼而發熱者宜人參羌活散加葱白葛根生薑以汗之或神术湯亦可若有自汗不宜再汗之宜九味羌活湯主之若熱不解或變別證宜從正傷寒條內治之也

龐病源載從立春節後其中無暴大寒又不氷雪而人有壯熱病者此屬春時陽氣發外冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病暑病相似但治有殊耳其治法初用摩膏火灸唯二日法鍼用崔文行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而更不解者勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若用藜蘆丸不吐者服赤小豆瓜蔕散吐之已解視病尚未了了者復一法鍼之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日入胃乃可下也熱在胃而下外之熱乘虛而入胃然要當復下之不得下多致胃爛發斑者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生人有強弱相倍也病者過日不時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法在可水五苓散證中　此巢氏載若時行寒疫之法云與溫病暑病相似但治有殊者據溫病無摩膏火灸又有冬溫瘡豆更有四時藏府陰陽毒又夏至後有五種熱病時令盛暑用藥稍寒故治有殊也

崔文行解散　治時氣不和傷寒發熱

桔梗　細辛各肆兩　白术捌兩　烏頭壹觔炮

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知為度若時氣不和只服一錢五銖匕辟惡欲省病一服了去此時行寒疫通用之無病預服以辟寒為佳皆酒調下

藜蘆散　辟溫疫附千金赤散

藜蘆　躑躅　乾薑各壹兩　牡丹皮

皂角各叁兩陸銖　細辛拾捌銖　附子　桂枝

朱砂另研各壹兩

末之絳囊中帶一方寸匕男左女右臂上著之覺有病之時更以粟米大內鼻中酒服一錢匕覆取汗日再

赤小豆瓜蒂散方見

鷄子湯　治時氣熱盛狂語欲走

生鷄子柒枚　芒硝壹兩

右用井花水一大升內二味同攪千遍去沫頓服之快利為度

禦法雄黃丸　治疫不相染

雄黃研壹兩　赤小豆炒熟　丹參　鬼箭羽各貳兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心以溫水下五丸可與病人同床共衣亦不相染

治務成子螢火丸　主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火　鬼箭羽去皮　蒺藜各壹兩

雄黃　雌黃各貳兩　礬石枯壹兩燒

羚羊角　鍛竈灰　鐵錘柄入鐵處燒焦各壹兩半

右九味搗為散以雞子黃并雄鷄冠一具和之如杏仁大作三角縫囊盛五丸帶左臂上仍可掛於門戶

治時疫不相傳染方

用水磨雄黃塗于鼻上或以明雄黃一塊重五錢以絹帛包繫頭頂心亦妙　一方或以上好香油塗鼻中亦可　一方以桃樹葉上蟲搗爛以涼水調服之亦可　一方以赤小豆同糯米浸水缸中每日取水用之　一方用貫仲浸水用之

四時非時之氣　時氣者乃天疫暴厲之氣流行凡四時之令不正者乃有此氣行也若人感之則長幼相似而病及能傳染於人其作與傷寒相似蓋傷寒因寒而得之此乃疫氣不可與寒同論也治法要當辛散疫氣扶正氣為主若多日不解邪熱傳變何證宜從傷寒變證條內詳而用之惟發散之藥則不同矣凡發散湯劑藿香正氣散芎芷香蘇散十神湯人參敗毒散十味芎蘇等方皆可選而用之也

春溫　活人曰春應溫而清氣折之責邪在肝或身熱頭疼目眩嘔吐長幼率相似升麻葛根湯解肌湯四時通用敗毒散　陶氏曰交春分後至夏至前不惡寒而渴者為溫病用辛涼之藥微解肌不可大發汗急證見者用寒涼之藥急攻下不可誤汗誤下常須識此表證不與正傷寒同治裏證同

夏溫　活人曰夏應暑而寒氣折之責邪在心或身熱頭痛腹滿自利長幼率相似理中湯射干湯半夏桂甘湯　陶氏曰交夏至後有頭疼發熱不惡寒而渴此名溫病愈加熱者名熱病止用辛涼之藥解肌不

宜大汗裏證見急攻下表證不與正傷寒同治裏證治法同

秋温　活人曰秋應凉而大熱抑之責邪在肺濕熱相搏民多病瘅咳嗽喘金沸草散白虎加蒼木湯病癉發黄茵蔯五苓散　陶氏曰交秋至霜降前有頭疼發熱不惡寒身體痛小便短者名濕病亦用辛凉之藥加躁以解肌亦不宜汗裏證見者宜攻下表證不與正傷寒同

冬温　活人曰冬應寒而反大温折之責邪在腎宜萎蕤湯

丹溪云冬温為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黄方　用竹筒兩頭留節一節中作一竅内甘草於中仍以竹木釘塞其竅冬月置大糞缸内浸一月取出晒乾用治温毒（用此藥一味入補藥帶表同煎服之）

活人曰仲景云冬温之毒與傷寒大異盖傷寒者傷寒氣而作冬温者感温氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒之過其治法不同所施寒熱温凉之劑亦異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒温而行之治温以清冷而行之治寒以熱凉而行之治清以温熱而

行之以平為期不可以過此為大法

神効沃雪湯（刪）治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳服之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼木（去皮 堅者 炮）　乾薑（炮製）　甘草（炙 各陸兩）

厚朴（去皮 薑製）　防風（去蘆者）　白芍藥（去皮）　乾葛（各肆兩）

右㕮咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不拘時少頃取生薑葱作羹投之避風坐卧身體微潤即愈如疫氣正用傳染清晨進一服為佳常服每用二錢水一盞煎至八分服

多眠多汗脉浮爲風温

陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變爲風温此前熱未歇又感於風者也難經曰中風之脉陽浮而滑陰濡而弱風來乘熱故變風温

若發汗已身灼熱者名曰風温風温爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘈瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期[illegible]

[illegible]之脉起目内眦内經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絶小便不利直視失溲爲下焦不足[illegible]温外[illegible]熱發者熱[illegible]發黃[illegible]瘈也先曾[illegible]火爲一逆[illegible]尚猶延引時日[illegible]促命期

附

活人風温者脉尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即譫語獨語内煩燥不得卧若驚癇目亂無精如此死者醫殺之耳　風温忌發汗宜萎蕤湯身灼熱者知母乾葛湯如渴甚者括蔞根湯脉沉身重汗出者漢防巳湯

萎蕤湯　治風温兼療冬温及春月中風傷寒發熱頭眩疼喉咽乾舌強胸内疼痞腰背強

葛根　白芷　麻黃用沸湯泡
杏仁去皮尖雙仁者　甘草炙各半兩　萎蕤[illegible]錢半
石膏杵碎　羌活[illegible]各　川芎[illegible]錢
青木香壹錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

又方

萎蕤　白薇　麻黃[illegible]
獨活　杏仁　川芎
青木香　甘草[illegible]　石膏[illegible]兩

傷寒風温[illegible]

右㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗若一寒一熱加朴硝二錢半大黃三兩下之如無木香可用麝香一分小品方云萎蕤湯治冬温春月中風傷寒則發頭腦疼痛咽喉乾舌強肉疼心胷痞滿腰背強

知母乾葛湯　治風温身體灼熱甚者

知母　萎蕤[illegible]錢　天南星生
麻黃去根節　防風　杏仁

羌活各貳錢 甘草 黄芩
木香 升麻 人參
川芎各壹錢 石膏陸錢 葛根捌錢
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服
防己湯 治風溫脈浮身重汗出一方無人參
防己肆兩 甘艸炙 黄芪參兩炙
人參各壹兩 生薑參兩 白朮參兩
右㕮咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去滓飲訖
仍坐被中汗出如蟲行或被卧取汗出
許學士云風溫汗用防己黄芪湯治之

括蔞根湯 治風溫灼熱大渴
石膏 人參 乾葛各貳錢 括蔞根參錢
防風 知母各壹錢半 甘草壹錢
右作一服水二鍾煎至一鍾通口服柤再煎
葛根龍膽湯 治風溫脈浮身重汗出
石膏五分 甘草柒分 龍膽草 桂枝各壹錢無汗不用
白芍藥 大青各壹錢半 葛根 升麻各貳錢
萎蕤參錢 生薑參片
右煎服法同前
海治風溫活人本方萎蕤湯以有麻黄不敢用宜白朮
湯主之方見前太陽病發熱條 若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡
蠣 若腰背強鞕者加羌活 若舌乾發渴者加人參
若身灼熱甚者加知母 若身體重多汗者加黄芪
若內傷冷者不加

一身盡痛爲濕

成濕有數種有濕痺者痺者痛也濕則關節疼但當利其小便者是也有寒濕相搏其證但頭汗出背強欲得被覆向火者是也有風濕相搏者一身盡痛法當汗出而解者是也有頭中寒濕此中之淺者故鼻塞納藥鼻中者是也有先傷濕而後感風者身痛發熱日晡劇者此名風濕者是也太陽家病與太陽病相似其不同者有脉沈而細者是也痓家脉亦沈而細疑若相似荅曰脉雖相似而證有異濕則身疼痓則身不疼也

脉法脉經曰沉而緩沉而細皆中濕　脉大或脉浮虛

而濇者皆寒濕　脉來滑疾濕熱　脉洪而緩陰陽兩虛濕熱自甚　脉浮風濕　趙氏曰仲景論風濕之脉浮虛而濇夫浮者風也濇者濕也脉經亦曰脉來濇者爲病寒濕也活人書以一浮脉爲風濕之脉浮可言風不可言濕當從仲景浮虛而濇可也

風濕病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也（一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出當風而得之者則先客濕而後感風若久傷取冷得之者則先傷冷而後中濕可與麻黄杏仁薏苡仁甘草湯）

麻黄杏仁薏苡仁甘草湯方

麻黄去節　薏苡仁各半兩　甘草炙貳錢半

杏仁拾枚去皮尖炒

水三盞煎至一盞半去滓分二服避風取微汗

風濕相搏傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之（[illegible]）若大便鞕小便自利者去桂加白朮湯主之（[illegible]）風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也荅曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也（[illegible]明其[illegible]內經曰陽受風氣陰

受濕氣又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之風濕相搏則[illegible]大出者其氣暴暴則外邪出而裏邪不能出故[illegible]其氣緩緩[illegible]甘草湯[illegible]白朮黄[illegible]）　風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之（活人書用[illegible]）

寒濕相搏濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也（濕勝則多汗傷寒則[illegible]頭汗出也[illegible]太陽之[illegible]太陽客寒濕表氣不利而背強也裏有邪者則不惡寒表有邪者則惡寒欲得被覆向火者寒濕在表而惡寒也若下之早則傷

動胃氣損其津液故致咳而胃燥小便不利下後裏虚上焦陽氣因虚而陷於下焦為丹田有熱表中寒凍而入于胸中為胸上有寒使舌上生白苔滑也欲得則欲飲水以胸上客寒濕故不能飲而但口燥煩也○或云小陷胸湯甘草附子湯小便不利五苓散理中去朮加朮湯選用　小便利者桂枝加附子理中加茯苓茯苓白朮湯選用

【頭中寒濕】濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞内藥鼻中則愈　成云病有淺深證有中外此則邪氣淺者何以言之濕家不云關節煩疼而云身上疼痛是濕氣不流關節而外客肌表也不云發熱身似熏黃復云發熱面黃而喘是濕不干於脾而薄於上焦也陰受濕氣則濕邪為深今頭痛鼻塞而煩是濕客於陽而不客於陰也濕家之脉當沉細為濕氣內流脉大者陽也則濕不內流而外在表也又以自能飲食胸腹別無蘊積中和無病知其濕氣微淺內藥鼻中以宣泄頭中寒濕○瓜蒂散

[illegible]

【濕熱】濕家之為病一身盡疼發熱身色如熏黃也　成云身黃如橘子色者陽明瘀熱也此身似熏黃即非陽明瘀熱身黃發熱者梔子蘗皮湯主之一身盡疼表裏有熱則身不疼痛此一身盡疼非傷寒客熱也知濕邪在經而使之脾惡濕濕傷則脾病而色見是以身發黃者為其黃如烟熏非正黃色也○許氏曰此本是身疼而發黃不可熱無治法或治以白朮附子湯甘草附子湯桂枝加桂等藥意恐與濕熱病不宜

【濕痺】濕痺太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺濕痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便　或云甘草附子湯麻黃連翹赤小豆湯千金翼細作緩○金匱曰霧傷皮腠濕流關節疼痛而煩者是濕氣內流也濕同水也脉沉而細者水性趨下也痺痛也因其關節煩疼而名曰濕痺非脚氣之痺也內經曰濕勝則濡泄小便不利大便反快者濕氣內勝也但當利其小便以宣泄腹中濕氣古云治濕不利小便非其治也○趙氏曰活人云一身盡疼發熱身黃小便不利大便反快此名中濕又注云脉細者非也愚詳仲景上文脉沉而細為濕痺今活人却以脉細為非豈濕痺與中濕異歟且曰身黃又不言其色如熏黃與黃如橘子色豈中濕與陽明瘀熱同至於治法曰不可火攻不可發汗而仲景有濕家下之早則噦又下之早則額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死此又有不可下者也

風寒濕雜至合而為痺為痙○活人曰風寒濕雜至合而為痺身重汗出惡風痛如歷節狀防已黃芪湯○經曰病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張者此太陽中風重感寒濕為痙也或云白朮黃芪附子湯　余氏曰錯雜之邪合至當論其先後以分治可也

[illegible]

濕病與傷寒相似○黃氏曰太陽濕家病與太陽傷寒相似其不同者濕脉沉而細也　愚按脉經曰脉大或浮虛皆寒濕是濕脉亦不專於沉細豈可恃此以差別傷寒還當以證參之庶幾無失濕脉與痙脉亦有相似者而證則不同濕則身疼痙則身不疼也　趙氏曰頭疼發熱背強身痛似與傷寒相似其不同者脉沉而細頭汗面黃能飲食所以為異也夫太陽傷寒脉必浮盛今脉沉細而非濕證即陽證得陰脉也蓋有面黃頭汗其為濕也明矣其濕家能飲食者為病在經而不干於裏也然大便反快而小便滯者亦經絡濟滞不能施化所

致也

濕溫活人曰其人傷濕又中于暑名曰濕溫兩脛逆冷胸滿頭目痛妄言多汗其脉陽浮而弱陰小而急茯苓白朮湯白虎加蒼朮湯切勿發汗汗之名重暍必死

趙氏曰活人云嘗傷于濕因而中暑濕熱相搏則發濕溫許學士云先受暑後受濕雖所言感受先後不同而其證治則一也又論脉曰陽濡而弱陰小而急許學士以關前爲陽關後爲陰紀氏則以浮爲陽沉爲陰雖所言部位不同而其脉狀則一也要之二說皆通不可偏廢然于用藥則白虎加蒼朮誠爲至當但活人書兩不

可表門無言朮附湯此濕溫門却但言白虎而不言朮附何耶龐氏方云感暑脉於冷熱之脉見足脛冷多行四逆輩如此醫殺之耳濕溫脉小緊有類傷寒脉但證候有異數進白虎則脛自溫而瘥朱氏之意豈以朮附與四逆藥物相類恐犯龐氏之戒而此門不載歟若濕氣勝藏府虛大便滑朮附其可廢乎詹氏藥法見前

本義云一身盡痛不能轉側者謂之濕溫　吳氏曰經曰濕溫之脉陽濡而弱陰小而急活人書謂其人先傷於濕後傷於暑暑濕相搏其證多汗妄言雙脛逆冷者宜朮附湯加人參香薷扁豆主之若脉大有力自汗煩渴者人參白虎湯加白朮主之輕者或十味香薷飲清暑益氣湯增損主之但在除濕益元氣清暑而已方見中暑門

死證濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死宜以汗發汗則愈金匱要畧曰濕家身煩疼可與麻黃加朮四兩發其汗爲宜若妄下則大逆之額上汗出而微喘者乃陽氣上逆也小便自利或下利者陰氣下流也陰陽相離故云死矣內經曰陰陽離決精氣乃絕

麻黃加朮湯方

麻黃去節參兩　桂枝去皮貳兩　甘草炙各貳兩

杏仁去皮尖柒拾箇　白朮肆兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗

此外治濕方論雜病首冊已詳不復贅敘

身反張爲痙

有汗爲柔痙無汗爲剛痙證治詳見雜病五冊不復贅敘

婦人傷寒

婦人傷寒六經傳變治例皆與男子同法惟經水適來適斷熱入血室與夫胎前產後崩漏帶下則治有殊別也

〔熱入血室〕婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之（東垣云妄見妄聞夜夢亡人皆肝木大盛而為邪言語刺期門與此義同）

許學士治一婦人患熱入血室醫者不識用補血調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲不可行也無已則有一焉刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膻中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既妊則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於膻中結於乳下故手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈（宜小柴胡湯和之無犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也）

衍義云一婦人溫病已十二日診其脉六七至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂乾薑一日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼脉漸勻尚不了了仍復與小柴胡次日又云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不樂時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯

主之

○附

〔遺〕婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室姙娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之

〔預防熱入血室〕婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脉浮而緩恐熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝壹兩半　赤芍藥叁兩　生薑壹兩半切

甘草炙壹兩　大棗擘陸枚

右剉細每服五錢水煎服

婦人傷寒　六　脉浮也　本方

婦人傷寒脉浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室宜麻黃加生地黃湯

麻黃去節兩半　桂枝壹兩半　甘草半兩炙

生地黃貳兩　杏仁去皮尖伍拾枚

右㕮咀每服五錢水煎服

〔寒多者〕婦人傷寒經脉方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜用乾薑柴胡湯

柴胡壹兩　栝蔞根　桂枝各壹兩半

牡蠣煅　乾薑　甘草炙各壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去查溫服初服微煩再服汗出而愈

〔熱多者〕〔羅〕小柴胡加地黃湯　治婦人室女傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露方來忽悶斷欲死

柴胡壹兩貳錢半　人參　黃芩

甘草炙　半夏湯洗柒次　生地黃各柒錢

右為麁末每服五錢生薑三片棗二枚水煎服

〔雲〕婦人傷寒身熱脉長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加牡丹皮湯主之大實滿者桃仁承氣湯下之

婦人傷寒　六　脉沈也　本方

小柴胡加牡丹皮湯方

柴胡　人參　牡丹皮各貳兩

甘草炙　生薑各柒錢半　半夏[illegible]錢湯洗陸次

大棗擘叁枚　黃芩柒錢半

右剉細每服一兩水煎服

婦人傷寒頭痛脉浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉不行心下結鞕口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脉沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡貳兩　半夏湯洗壹兩半　黃芩

生薑各柒錢半　大黃　芒硝各柒錢

甘草炙伍錢半　大棗叁枚擘

右剉每服一兩水煎去滓下芒硝再沸溫服若脉不沉數即不可下

許辛亥中寓居毗陵學官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日涎生不省人事予曰此熱入血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀發作有時此

名熱入血室醫者不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上脘喘急息高昏冒不知人事當先化其痰後除其熱予急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黃湯三服而熱除不汗而自解矣

雲婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脉沉而遲太陽標病少陽本病經水適斷桂枝加附子紅花湯

桂枝壹兩半　芍藥　生薑各壹兩半

甘草炙壹兩　附子炮　紅花各伍錢

右剉細每服一兩水三盞煎服

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草　芍藥　生地黃　川芎各壹兩

右㕮咀每服壹兩水三盞煎至一盞半去滓入髮灰五錢調勻溫服不止者刺隱白

妊娠傷寒　凡妊娠傷寒六經治例皆同但要安胎為主凡藥中有犯胎者則不可用也如藿香正氣散十味芎蘇散參蘇飲小柴胡湯之類有半夏能犯胎如用須去之若痰多嘔逆必用之以半夏麴則可如無滌湯泡七次去皮臍生薑自然汁拌晒乾方可用也凡川烏附子天雄側子肉桂乾薑大黃芒硝芫花甘遂大戟蜀漆

水蛭䖟虫桃仁牡丹皮乾漆代赭石瞿麥牛膝等類之物皆動胎之藥凡用必須斟酌仔細而詳之也其餘詳見各條治例不錄凡護胎之法傷寒熱病熱甚者宜用井底泥塗臍二寸乾仰又塗之一方以白藥子為末水調塗之一方以伏龍肝末水調塗之可護胎也大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩白朮二味能安胎也或以此二味煎湯與之或為細末白湯調下二三錢亦佳如妊婦素禀弱者藥中四物湯佐之不可缺也且如用小柴胡湯去半夏加白朮合四物湯用之可以保胎除熱也其效如神餘皆倣此用之則妙矣

潔古黃芪解肌湯治婦人妊娠傷風自汗

人參　黃芪　當歸　川芎

甘草炙各半錢　芍藥陸錢　加蒼朮生地黃亦可

右為麄末每服五錢水煎溫服無時

海藏若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯肆兩　桂枝　地骨皮各柒錢

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯肆兩　麻黃　細辛各半兩

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛者太陽標病也宜風濕六合湯

四物湯肆兩　防風　蒼朮炙各柒錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑如錦紋宜升麻六合湯

四物湯肆兩　升麻　連翹各柒錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽證宜柴胡六合湯

四物湯肆兩　柴胡　黃芩各柒錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯四兩　大黃伍錢　杏仁去皮尖麩炒胎放

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯四兩　人參　五味子各伍錢

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛宜厚朴六合湯

四物湯四兩　厚朴　枳實麩炒各伍錢

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯四兩　梔子　黃芩各伍錢

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脉長而大者宜石膏六合湯

四物湯二兩　石膏　知母各伍錢

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯四兩　茯苓　澤瀉各五錢

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血者宜琥珀六合湯

四物湯四兩　琥珀　茯苓各伍錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損動者宜膠艾六合湯

四物湯四兩　阿膠　艾各五錢一方加甘草同上一方

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病也宜附子六合湯

附子炮去皮　乾薑

四物湯(二兩) 附子(炮去皮) 桂(各伍錢)
若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯
下之
四物湯(二兩) 生地黃 大黃(酒浸各五錢)
婦人妊娠或畜血抵當桃仁勿妄施要教子母俱無損
大黃四物對分之
丹施孺人傷風未解兩足下脛冷嗽多不吐痰頭眩盖
其性急又當臨月
黃芩(半錢) 陳皮 白朮(各一錢) 蘇梗(半分)
木通 枳殼(各伍分) 麻黃(去節) 甘草(分)

桔梗 蒼朮(各八分) 右水煎服無時
〔云〕婦人有孕傷寒脉浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當
歸湯
桂枝 芍藥 當歸(各等分 兩)
右剉細每服一兩水煎
婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者太陰病
也宜芍藥湯
芍藥 白朮 甘草 茯苓(各壹兩)
右如前修服
〔活〕治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參 白茯苓 阿膠(炒)
桑寄生 白朮(各等分)
右搗羅為細末糯米飲調下二錢日二服
治妊娠傷寒安胎宜白朮散
白朮 黃芩(新瓦上炒香 各等分)
右為末每服三錢水一鍾生薑三片大棗一枚擘破
同煎至七分去滓溫服但覺頭疼發熱便可服二三
服即瘥惟四肢厥冷陰證見者未可服
治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯
葱白(拾莖) 生薑(貳兩 切)

右剉水二盞煎至一盞連服取汗
〔海〕葱白一物湯用葱白二把以水一升煮取汁令食
盡亦主安胎若胎損須臾即出
紫蘇散 胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸
能安活胎亦下損胎又治傷寒頭疼發熱遍身疼痛
紫蘇葉 當歸(各壹兩) 人參
甘艸(炙各半兩) 大腹皮 川芎
白芍藥 陳皮(各)
每服八錢水一鍾半生薑五片葱白三莖連須煎至
一鍾去滓食前熱服若心腹甚痛者加木香玄胡索

研同煎服
芎蘇散　治妊婦傷寒頭痛增寒壯熱身痛項強
紫蘇葉　川芎　白芍藥　白朮
陳皮　乾葛　甘草　麥門冬各等分
剉散每服四錢薑四片葱白三莖煎熱服
治婦人傷寒妊娠服藥例　若發熱惡寒不離桂枝芎
藥　若往來寒熱不離柴胡前胡　若大渴者不離知
母石膏五味子麥門冬　若大便泄者不離桂附乾薑
白朮　若大便燥結者不離大黃黃芩　若月經適來
適斷者不離小柴胡　若胎不安者不離人參阿膠白

朮黃芩　若發汗者不離葱豉生薑麻黃旋覆　若頭
痛者不離石膏山梔前胡　若傷暑頭痛者不離柴胡
甘草石膏　若滿悶者不離枳實陳皮　若胎氣不安
者不離黃芩麥門冬人參　若斑黑者不離黃芩梔
子升麻
大治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方
伏龍肝研為極細末調塗臍下三寸乾即易瘥即止
又方　井水泥塗乾即易之此二方出本
又方　浮萍　藍根　朴硝　蛤粉　大黃微炒
右為末水調傅臍上安胎解熱極妙

又方白藥子為末水調傅腹上
治妊娠霍亂二方附少陰壯熱門
治妊娠發斑變為黑色宜梔子大青湯
黃芩　升麻　梔子仁各貳
大青　杏仁各半兩
右㕮咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎至一
盞去滓溫服
產後傷寒　吳新產後患傷寒不可輕易發汗蓋有產時
傷力發熱去血過多發熱惡露不去發熱三日蒸乳發
熱或有早起動勞飲食停滯一皆發熱狀類傷寒要在

仔細詳辨切不可輒便發汗大抵產後大血空虛若汗
之則變筋惕肉瞤或鬱冒昏迷而不省或風搐搦而不
定或大便秘澀而難去其害非輕切宜精審凡有發熱
且與四物湯以川芎當歸為君最多白芍藥須炒過酒
蒸熟地黃佐之如發熱加軟苗柴胡人參乾薑主之最
效蓋乾薑之辛熱能引血藥入血分氣藥入氣分也且
能去惡養新有陽生陰長之道以熱治熱深合內經之
旨于嘗用之取效如神故錄以勸之如有惡露未盡者
益母丸黑神散必兼用之若胃虛食少者必加白朮茯
苓有痰嘔逆者必加陳皮半夏其餘六經各條治例皆

同但藥中必加四物湯為主乃養血務本之要也
產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶
乾嘔汗出雖多陽旦證耳可與陽旦湯即桂枝湯方見太陽病
產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之
竹葉壹把　葛根叁兩　防風
桔梗　桂枝　人參
甘草各壹兩
右㕮咀每服五錢棗一枚薑五片水一盞半煎一盞
去滓服溫覆使汗出若頸項強用大附子半錢煎藥
揚去沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒宜補虛

丹產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脉不足補血右手
脉不足補氣凡惡寒發熱又腹痛當去惡血惡寒發熱
乳汁不通及膨者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯
作四服調下有子當下用木通通草猪蹄汁調煎服

忌發表忌寒藥味

產後纔見身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾薑治
之大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

腹痛者宜活血

大凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多
是血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露
散或四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹
葉石膏湯之類竟不救者多矣

乳不通者宜發乳

玉露散治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大
便澁滯悉治之凉膈壓熱下乳
人參　茯苓　甘草各半兩
苦梗炒　川芎　白芷各壹兩
當歸貳錢半　芍藥柒錢半
右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚
大便秘者加大黃二錢半

小兒傷寒

冒傷寒表裏攻發　有表證惡風惡寒者當發表海藏云惡風者白术散惡寒者神术湯　如氣盛能食不大便無表證者可攻裏　春主溫屬木身溫當發汗海藏云神术湯　夏主長屬火身熱而煩躁合大發散海藏云神术加知母黃芩湯　長夏主化屬土及居四季同當調其飲食海藏云四君子湯　秋主收屬金身涼內溫合微下海藏云通膈丸金花丸　冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外海藏云熱在內者調胃承氣湯寒在內者調中湯丸

冒凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升浮則順發之收藏則下之　有汗發熱惡風脈浮緩者風傷衛桂枝湯　無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮緊者寒傷榮麻黃湯　有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯　無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其厥與不厥量寒熱淺深而治之　有汗四肢厥脈沉微者名陰厥四逆湯　無汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉　如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦宜涼藥三五服下之　黃芩甘草湯　黃芩白术湯　黃芩蒼术湯　黃芩梔子湯　連翹飲子　小柴胡湯　八正散　涼膈散　白虎湯　五黃散　此上中下三焦藥宜選用之　中暑脈虛背惡寒自汗而渴者白虎湯身涼脈緊熱在內者急下之口燥咽乾不大便是也　無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏　有汗身大熱者桂枝湯惺惺散解肌湯小柴胡湯白术防風湯可選用之　發汗者量四時瘟暑燥濕風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之

錢傷風昏睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表證也潔古補遺云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮毛主口中氣熱者當發散秋冬用溫熱藥春夏用涼寒藥

大青膏方

天麻　青黛研各壹錢　白附子生壹錢半　蝎尾去毒生半錢　硃砂研　天竺黃研　麝香各一字匕　烏梢蛇肉酒浸焙乾取末半兩

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲

雄黃小棗大研蘿蔔汲水并醋一大盞煎十盞　甘草末　川甜硝各叁錢　寒水石研細五錢匕　腦子一字匕

朱砂伍分

右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皁子大

右前大青膏發散食睡口氣熱呵欠煩悶表證者蓋為三歲已下小兒未能言者設也

（活）尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱

桔梗 細辛 人參 白朮

甘草 括蔞根 白茯苓 川芎各等分

右爲末每服二錢薑二片薄荷二葉煎服三歲已下作四五服凡小兒不問傷風傷寒風熱與此即愈

（海）傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛瓜蔞桔梗各一分生薑薄荷煎或加防風川芎各一分內有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蔞加桔梗多虛汗夜啼者加麥門冬 傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防風等分細辛羌活減半同煎

（活）咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

（雲）人參羌活散治小兒寒邪及癍氣時疫瘡疹頭痛體疼壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活 獨活 柴胡 人參

芎藭 枳殼炒 甘艸炙 白茯苓去皮各一兩

前胡 桔梗 天麻酒浸 地骨皮洗各半

右爲散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去滓溫服不拘時候

七寶散 治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉 香附炒各二兩 陳皮 甘草炙

桔梗 白芷 川芎各壹兩

右吹咀薑棗煎服

（海）麻黃黃芩湯 治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

麻黃 赤芍藥 黃芩各半兩 甘艸炙

桂枝各二錢半

右爲麁末水煎服

升麻黃芩湯 治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻 葛根 黃芩 芍藥各伍錢半

甘草壹錢半

右吹咀每服二錢水煎溫服

右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋爲三歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗惡寒第六方治有汗惡風

（錢）與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲

水不止而善食者可微下餘不可下也（此裏證也錢氏補遺云大熱飲水能食不大便用大黃丸作散子與服之如清便自調慎不可妄下恐外熱逐於內而變結胸危證多矣）

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止有下證者宜服之

川芎 黑牽牛（半兩半生半熟炒） 大黃（酒蒸壹兩）

甘草（炙）

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十丸溫蜜水下乳後服以溏利為度未利加丸數

活。頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲三黃丸主之（三方並見瘡疹門） 身體潮熱頭目昏痛（小兒傷寒 缺之也）心神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主之（洗心散見瘡門）

食積

頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主之（方見幼科食癖門）

小便不利

溺如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝濕藥白朮白茯苓之類利小便則其熱自退

云小兒傷寒煩熱小便赤澁大便秘色面赤熱者導赤散

傷風兼藏

錢傷風兼藏兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣嗽兼腎則畏明各隨補母藏虛見故也

兼脾則肢冷或利或服或吐下

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發散大青膏主之（此治傷風有汗脈沉微者若湯脈無汗脈沉滑者不宜此法宜大承氣湯）而加膩粉

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏主之未瘥調中丸主之有下證大黃丸下之後服溫驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去腹塌氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉（治見幼科叢吐瀉門瀉用益黃散白朮散發散用大青膏）

兼心則驚搐

湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散（小兒傷寒 缺之也）

薄荷葉（半兩） 羌活 全蝎（八枚）

麻黃（去根節） 甘草（炙各壹錢二分半） 天竺黃

僵蠶 白附子（炮各一錢半）

為細末每服一錢水半盞煎至三分加竹瀝少許妙

云小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之宜大青膏

兼肺則喘嗽

肺藏復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散散風大青膏主之若止傷寒則不胸滿

腎虛則畏明宜補腎地黃丸（有表者當用地黃膏發散之）
傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生胃中津液多服白术散　小兒結熱於内口乾而渴身黃體重者宜白术散
湯傷寒發渴宜白虎湯
潔大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之
右三方白术散治虛渴為下後而食少胃虛者設也白虎湯大黃丸治實渴為未經下而能食不大便者設也
潔傷寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也合用阿膠散面白如枯骨者死不治　身熱咳嗽吐痰者當用褊銀丸（方見幼科欬嗽門）
小兒傷寒門怯之七　人古
右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為哽氣長出氣者設也褊銀丸治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表證惡風寒而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是也
陰厥陽厥（見
潔身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯（即小半夏加茯苓湯方見嘔門）
湯傷寒嘔者枳殼半夏湯
枳殼　半夏（各半兩）

右水一碗薑十片煎至半碗十歲已下作五服
藿香正氣散治傷寒發嘔
藿香葉　厚朴（製）　半夏（製）
甘草（炙）　陳皮　蒼术（米泔浸各等分）
右㕮咀每服二錢水半盞薑三片棗一枚煎至二分去查溫服
潔大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸（三方俱見幼科腹痛門）
潮熱有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸（方見幼科積熱門）
右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘二方治表寒而吐也
小兒傷寒門怯之七　今人
湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參地黃
黃芪（壹兩）　白芍藥（炙二兩）　甘草
人參　熟地黃（各半兩）
右㕮咀每二錢水半盞煎至三分去查服
小兒傷寒形證　頭痛　體痛　鼻塞或流涕　喉内喘息　兩手脉洪數　頰赤眼澁　身上寒毛起　口鼻出水　眼赤黃　口乾澁　咳嗽　山根青色　噴嚏

活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也
雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷身氣熱為斑疹也與傷寒表證相似此胎氣始發自內之外若與傷寒表證同治者悞也當作斑疹治之
異小兒傷寒六經治例皆同但有胎熱驚熱血熱客熱寒熱潮熱痰熱食熱變蒸熱疳熱發熱傷風發熱一皆發作狀似傷寒要在明辨之而况兒軀嫩弱血氣未定脉法不同藥劑輕小之別故畧其節要另開錄于左以便覽焉

凡小兒察面色為先要宜詳察色要略也

凡小兒視虎口脉紋者以男左女右手食指第一節為初關二節為中關三節為末關即寅卯辰三位也凡脉紋見初關者輕中關者重末關者病危也以紫脉為驚熱紅脉為傷寒為熱白主疳熱少血青主驚主風主寒主腹中痛主搐搦黃主傷乳食脾虛黑主冷氣主中惡主病沉困也凡紫赤青黑脉紋直透末關者死

凡小兒四五歲以一指按其三部脉六七歲以二指按切三部脉十歲已上當密排三指而切之宜詳脉訣要略也脉經曰四五歲已上者呼吸七八至細數者吉九至為熱十至為困五至為寒四至困也十歲左右者五六至為平也

凡胎熱驚熱客熱血熱痰熱寒熱潮熱等治法並見幼科準繩宜詳玩之茲不具錄

凡食熱傷乳者則吐哯妳瓣不消口中酸氣傷食則心下滿鞕噯氣作酸惡食右手氣口脉盛手心熱手背不熱則肚背先熱以此別之

凡治傷食發熱必以六君子湯為主或加神麯麥芽宗求子砂仁香附之類如內實者加枳實青皮熱不解者加軟前柴胡炒黃連或黃芩之類以解如無熱宜服香砂保和丸

凡變蒸發熱者以長氣血也夫變者氣上蒸者體熱也輕者發熱虛驚耳冷微汗唇中有白泡如珠子是也三日而愈重者寒熱脉亂腹疼啼叫不食凡乳食輒吐哯五日愈也

凡傷風發熱則貪睡脾澁呵欠頻悶鼻塞噴嚏或鼻流清涕口中氣熱或咳嗽聲重或自汗怕風也宜人參羌活散加減主之其餘治例宜傷風表證例也要在詳辨而治之爾

凡傷寒則怕寒拘急發熱翕翕然在表晝夜不止直待汗出方解錢氏曰男子則面黃體重女子則面赤喘急

憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急也大抵傷寒則手背熱手心不熱左手人迎脉緊盛也其餘六經為病詳見六經發熱例同但藥劑宜輕小也亦有失驚失食傷寒要在審辨而已

凡痘疹發熱錢氏曰腮赤多躁噴嚏眼澁呵欠頓悶時發驚悸身重發熱耳尖鼻尖手足稍冷也或乍涼乍熱睡中驚惕起卧不安者乃其候也切不可認作傷寒輙用發汗或重被蓋覆取汗則大誤矣須仔細辨之

凡壯熱痘疹欲出未出者宜用升麻葛根湯主之胃弱食少者必加人參白术白茯苓主之若欲透斑更加紫

草茸為妙丹溪言但見紅點便忌葛根恐發得表虛瘡出爛慢也錢氏治斑瘡未透者以四君子湯加糯米煎先助胃氣也一方更加升麻紫草茸以透斑出凡痘瘡三日至足謂之出齊若小大不等根窠紅活者不必服藥至五日當灌漿若漿來肥滿光澤者不必服藥若五六日漿不來便當救之以人參黃芪當歸三味為君佐以白术陳皮白芷川芎白芍藥防風炙甘草之類必須加肉桂三分或五分能引藥入血分化膿為妙若氣逆滿悶出不快者少加木香二三分主之如惡心嘔逆不食者須加丁香三粒以透胃氣升發痘毒外出然此皆秘傳之法用之累驗者也若有痒塌寒戰咬牙手足冷或嘔或喘或大便下利者此表裏之氣俱虛也宜加肉荳蔻訶子各五分熟附子二分或五分主之或十宣內托散加此三味亦佳凡欲靨未靨頭溫足冷或瀉渴或氣促四肢冷悶亂不寧卧則哽氣寒戰咬牙無熱證者宜陳氏十二味異功散主之凡青乾紫陷有熱者不可用此宜八珍湯加黃芪升麻紫草茸生地黃之類主之其餘詳見幼科準繩痘疹門宜詳玩而用焉一方治痘瘡未透漿不至者以烏骨白雄雞冠上取血和白酒漿溫與之最効凡有痒塌抓損宜房中常燒乳香尤妙

宜多用芪歸等湯大抵痘瘡變黑或青乾或紫陷漿不來昏沉汗出不止煩躁熱渴腹脹啼哭聲嗄大小便不通者皆難救也凡瘡外黑裏赤者重外白裏黑者極重瘡端裏黑點如針孔者難治惟外肥紅者最吉若一發並出及一發如針頭密者皆難治也要在詳辨而已

溫病

田春日溫病　未滿三日先用惺惺散一服後四五日不解煩渴嘔用白术散如自汗口燥用製白虎湯至六七日大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌終

傷寒證治準繩帙之八

金壇王肯堂輯　門人南昌張　綍校

脉法

問曰脉有陰陽者何謂也荅曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

成陽道常饒大浮數動滑五者比之平脉也有餘故謂之陽陰道常虧沉濇弱弦微五者比之平脉也不及故謂之陰傷寒之爲病邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉病見陽脉而主生者則邪氣自裏之表欲汗而解也如厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈者是也陽病見陰脉而主死者則邪氣自表入裏正虛邪勝如讝言妄語脉沉細者死是也　大綱當以靜躁處言下後靜者生躁者死不可拘以陰病見陽脉邪氣外散也陽病見陰脉邪氣乘虛而入也　丹

謹按經言大浮數動長滑爲陽沉濇弱弦短微爲陰論之略去長短二脉其意何在若以傷寒爲病無長短脉耶仲景之書言長短者蓋不少也脉經二十四種形狀亦無長短二脉又何耶見字恐當作得字說猶言表病得裏脉裏病得表脉若作自表入裏說莫

有疑否夫太陽病不解以漸次傳入陽明少陽又三陽經之病不解以漸次傳入于府悉是可愈之病又有不傳經不加異氣者七日後自太陽以漸次傳入陽明少陽與三陽經亦皆爲不治自愈之證非自表入裏者乎初未嘗死此吾之所以不能無疑也考之論中陽病得陰脉有本病自得者有因醫而得者仲景著治法甚詳如太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少不嘔清便欲自愈一日二三度發脉微緩者爲欲愈也夫脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也夫太陽病如瘧狀發熱惡寒

非陽病乎曰脉微非陰脉乎又傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脉細者此爲陽微結必有表復有裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此名半在裏半在表也脉雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯夫仲景行小柴胡湯非陽病乎曰脉微曰脉沉非陰脉乎此皆陽病之得陰脉者悉是非逆證之陰陽如此者不一未暇枚舉誠恐論意因之因病察脉求其所謂陰陽而爲生死之辨爲之傳經者必須推廣先賢之意以開

後學倘非推明證之陰陽惟以脉與病參之則後學
何所適從此吾之所以重有疑也 〔張或謂經言大
浮數動滑此名陽也沉濇弱弦微此名陰也夫高陽
生又以弦脉編入七表而為陽者何也弦者不足之
脉也乃發汗後病在表裏之候也故云弦則為減所
以為陰也夫高陽生以弦為陽者因仲景云脉浮而
緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也只因一
箇浮字故編入表脉也殊不知脉浮而弦病方在表
當未汗之時則為緊也已經發汗之後則為弦也此
一定之論大緊與緊相類然其時則不同但脉候玄

微不若以未汗已汗為法則無差失之患矣 〔許仲
景之意以弦脉為陰者兼合乎衆脉而言之也且浮
大者陽也兼之以濇弱弦微之類安得不為陰也若
夫沉微而弦沉濇而弦沉細而弦皆為陰證之脉也
蓋少陽之脉弦者仲景之意以一脉而言之也然少
陽之氣通于春春脉弦者以應春陽時令之脉也豈
得不為陽乎如浮大而弦洪長而弦浮滑而弦浮數
而弦者皆為陽也仲景以弦脉分陰陽二用之理其
義微矣王叔和以弦脉為陽而不言弦為陰者是以
獨指一脉而為雜病也故仲景之脉不可與雜病同

日而語也

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而數能
食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脉
沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結也期十四
日當劇

〔成結者氣偏結固陰陽之氣不得而雜之陰中有陽
陽中有陰陰陽相雜以為和不相雜以為結浮數陽
脉也能食而不大便胃實也為陽氣結固陰不得而
雜之是名陽結沉遲陰脉也不能食身體重陰病也
陰病見陰脉則當下利今大便鞕者為陰氣結固陽

不得而雜之是名陰結傷寒之病一日太陽二日陽
明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰至六日
為傳經盡七日當愈七日不愈者謂之再經言再經
者再自太陽而傳至十二日再至厥陰為傳經盡十
三日當愈十三日不愈者謂之過經言再過太陽之
經亦以次而傳之也陽結為火至十七日傳少陰水
水能制火火邪解散則愈陰結屬水至十四日傳陽
明土土能制水水邪解散則愈彼邪氣結甚水又不
能制火土又不能制水故當劇內經曰一候後則病
二候後則病甚三候後則病危也○一候五日受邪

之初明惡寒發熱自有偏勝故下文云云

問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何荅曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足荅曰假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也曰何謂陰不足荅曰假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也

〔成〕一陰一陽之謂道偏陰偏陽謂之疾陰偏不足則陽得而從之陽偏不足則陰得而乘之陽不足則陰氣上入陽中爲惡寒者陰盛則寒矣陰不足陽氣下陷入陰中爲發熱者陽盛則熱矣○陽脉不足則惡寒也陰脉不足則發熱也　〔丹〕按經言凡傷于寒則爲病熱蓋寒客于經陽氣怫鬱而成熱故發熱寒傷于榮血血既受傷故惡寒屬太陽證又曰發熱惡寒發于陽也合此二者而觀明是體雖熱自惡寒宜解表則麻黃青龍等方之今曰灑淅惡寒而復發熱當是寒熱往來其屬表者宜小柴胡其屬裏者宜大柴胡其或已汗已下者宜桂枝乾薑湯此三陽證論寒熱往來之平等者如寒熱之或多或少又當輕重較量而施治法今曰陰不足則陽勝而熱陽不足則陰勝而寒又曰陽往從之陰往乘之當是陽併于陰陰併于陽岐伯曰瘧氣者更盛更虛似與經文陰勝陽勝之意合未審爲傷寒立論耶爲瘧立論耶孰爲是否　張氏云經言陰脉不足陽得從之陽脉不足陰得乘之不足乃陽脉微弱之謂所以惡寒發熱也又云脉盛身寒得之傷寒夫傷寒表病未有脉不浮盛者設或微弱即陽病見陰脉也二說參差必有其理

此章論所以然之理非病已發於外而言也凡病傷寒者皆因榮衛不足是以尺寸之脉皆微弱外邪因得相襲使陰陽相乘故灑淅惡寒而復發熱也凡已病之脉則不然若風併於衛則衛實而榮虛故桂枝證脉陽浮而陰弱若風寒併於榮衛則脉皆浮盛所以麻黃證當發其汗也仲景之書各有所指非淺見薄識所能知也

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急也

〔成〕陽爲氣陰爲血陽脉浮者衛氣強也陰脉弱者榮血弱也難經曰氣主呴之血主濡之血虛則不能濡潤筋絡故筋急也

其脉沉者榮氣微也

〔成〕內經云脉者血之府也脉實則血實脉虛則血虛此其常也脉沉者知榮血內微也

其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也
成鍼經云衛氣者所以溫分肉充皮毛肥腠理司開闔者也脉浮汗出如流珠者腠理不密開闔不司爲衛氣外衰也浮主候衛沉主候榮以浮沉別榮衛之衰微理固然矣然而衰甚於微所以於榮言微而衛言衰者以其汗出如流珠爲陽氣外脱所以衛病甚於榮也

榮氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而躁煩也
衛陽也榮陰也燒鍼益陽而損陰榮氣微者謂陰虚也内經曰陰虚則内熱方其内熱又加燒鍼以補陽不惟兩熱相合而榮血不行必更外發熱而内躁煩也

脉藹藹如車蓋者名曰陽結也
成藹藹如車蓋者大而厭厭聶聶也爲陽氣鬱結於外不與陰氣和雜也　按車蓋言浮大即前浮數之陽結也

脉纍纍如循長竿者名曰陰結也
成纍纍如循長竿者連連而強直也爲陰氣鬱結於内不與陽氣和雜也　按長竿者緊弦也即前沉遲之陰結也

脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微也
成輕浮而主微也

脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也
成縈縈滯也若縈縈惹惹之不利也如蜘蛛絲者至細也微爲陽微細爲陽衰脉要曰微爲氣痞是未至於衰内經曰細則氣少以至細爲陽衰宜矣　按縈說文曰收卷也有回旋之義

脉綿綿如瀉漆之絶者亡其血也
成綿綿者連綿而軟也如瀉漆之絶者前大而後細也正理論曰天樞開發精移氣變陰陽交會胃和脉生脉復生也陽氣前至陰氣後至則脉前爲陽氣後爲陰氣脉來前大後細爲陽氣有餘而陰氣不足是知亡血　按瀉漆之絶已縱而忽收亡血之脉如之

脉來緩時一止復來者名曰結脉來數時一止復來者名曰促陽盛則促陰盛則結此皆病脉
結促代皆動而中止但自還爲結促不能自還爲代無常數爲結促有常數爲代結促爲病脉代爲死脉不可不辨雜病脉結促多有痰飲瘀血阻滯隧道而然不然者病多難治也太陽病下之脉促不結胸爲欲解未必盡凶也少陰病手足厥冷脉促宜灸之非

必皆陽盛也
陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也
陽升陰降二者交通上下往來於尺寸之內方且沖和安靜焉覩所謂動者哉惟夫陽欲降而陰逆之陰欲升而陽逆之兩者相搏不得上下鼓擊之勢隴然高起而動脉之形著矣然必見於關上者何也以三部言之寸陽也尺陰也關陰陽之中也故曰陽出陰入以關為界是為陰陽升降往來之位者關也然則相搏而動不於此見之而誰見乎內經手少陰脉動甚者為妊子謂手少陰俞神門穴中脉動甚為有妊之兆非言動脉言動脉自仲景始龐安常曰關位占六分前三分為陽後三分為陰若當陽寸口動而陰靜法當有汗而解素問曰陽加於陰謂之汗若當陰連尺動而陽靜則發熱素問曰尺麤為熱中若大汗後形冷惡寒者三焦傷此是死證按陰陽之氣寧謐則實躁動則虛或動乎陽或動乎陰陽動則陽虛矣故不能衛于腠而汗出陰動則陰虛矣故不能濡於肌肉而發熱仲景又云陽微則惡寒陰弱則發熱

是也厥厥動搖者自為動搖不與三部脉混如人在衆中不與衆合名之厥厥也後之說脉者指下尋之似有舉之還無再再尋之不往不來曰動則與仲景之言相反矣
陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名曰緩也
緩有遲緩之意又有和緩之意獨陽獨陰緩無自而見矣緩者非獨陰也有陽焉非獨陽也有陰焉二者合而成體緩脉之名自此而生方其陰陽雜以成和也其色黃其顏光其聲商毛髮長乃沖氣之洋溢者也若夫疾而為病則為虛為痹為氣戴氏曰每居中部或下部關深軟而慢但小於沉脉按之緩爽此有邪之診為不及之緩陰陽氣和時寸陰尺上下同等同浮大而軟無有偏勝此無邪之診為陰陽和緩之緩緩與遲二脉相類遲脉一息三至緩脉一息四至
脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也
弦何以為肝脉耶肝木也以日言之甲者物始甲而未拆乙者陽尚乙屈而未伸以經言之少陽陽之少也厥陰陰之盡也以時言之春者萬物始生而未長

素問曰脉耎弱輕虛以滑端直以長曰弦以陰中有陽也此曰浮而緊名曰弦浮者陽也緊者陰也陽而未離乎陰也故脉訣列之于陽而仲景列之于陰戴氏則以為半陰半陽之脉也浮字當以耎弱輕虛四字體會之脉訣泥之而曰指下尋之不足舉之有餘則是有浮弦而無沉弦也經曰脉沉而弦者主懸飲內痛是沉中亦有弦也弦緊之狀並如引繩此既以緊釋弦又恐人混而無別故又別之曰指下不移如弓弦者弦脉也無常如轉索者緊脉也狀如弓弦按之不移即所謂端以長也端直以長者不轉也轉索

無常者不端也端便是有常無常便是不端直耳凡病脉弦而軟為易治不軟為難治又仲景曰脉至如轉索者其日死為其緊急不軟無胃氣也轉索一也有死生之分宜詳辨之

脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血失精易曰革去故也革者改故從新之意夫人之脉方其水穀腐化心榮肺衛流行灌溉而充溢於百骸之中固自無變者夫虛寒停留經久不去則昔之充溢者今且改易而為勞傷枯瘁矣其脉弦而大是其體也何者弦則為減減則陽氣不足而為寒大則為芤芤則陰血不足而為虛寒虛相搏氣血變易此名為革婦人得之則半產漏下男子得之則亡血失精也然諸脉為名多矣特此以革名之者豈非諸脉雖能為病此則既久而有改故之意歟然亦有暴而變此脉者雖名曰革但病未成有不藥而愈之道焉故經曰三部脉革長病得之死卒病得之生也脉訣云指下尋之則無按之則有此可以言革脉所見之位而失言革脉之本狀經言有似沉伏者革脉所居之位也實而長微弦者革脉之形也要之大似實而弦似長

總不離乎弦之與大而已惟其雜乎沉伏實長故又有牢之意此經以革與實相類而孫真人以革為牢諸脉書有牢則無革有革則無牢者皆為是歟

問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解也若脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不發戰也問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液此

陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也
邪氣將出其人本虛邪與正爭故發戰戰已然後汗出而解其人不虛邪不能與正爭故不發戰而汗出解虛不虛以脉之芤不芤別之芤乃草之有孔者正如卧蔥管於皮中輕取重取皆有而中取則無也經云榮行脉中故以爲血脫之候此所謂按即脉書所謂尋在浮舉沉按之間者也若邪氣已衰正氣又弱其脉自微則不戰不汗而解矣微脉原爲吐下亾血之診凡得之者陽微禁發汗陰微禁下以陰陽不足故也或問此三者皆以脉决不審於何時候之曰發

表之脉候其始欲解之脉觀其止假如柴胡湯證六七日每見弦脉今則反浮欲解之候也若浮而芤者戰而汗出浮而數不芤者不戰而汗出夫脉凡與邪併則浮大弦數必因汗下吐亾而後微今脉自微此以曾經汗下内無津液陰陽自和故不戰不汗出而解矣此三脉皆於病將解之時而候之也右發戰云戰而後解者

問曰傷寒三日脉浮數而微病人身凉和者何也荅曰此爲欲解也解以夜半脉浮而解者濈然汗出也脉數而解者必能食也脉微而解者必大汗出也
成傷寒三日陽去入陰之時病人身熱脉浮數而大邪氣傳也若身凉和脉浮數而微者則邪氣不傳而欲解也解以夜半者陽生於子也脉浮主濈然汗出而解者邪從外散也脉數主能食而解者胃氣和也脉微主大汗出而解者邪氣微也　上言脉微故不汗出而解此言脉微而解必大汗出二說相左何耶曰上以曾經吐下亾血邪正俱衰不能作汗而解此以未經汗下血氣未傷正盛邪衰故大汗出而解不相左也

問曰脉病欲知愈未愈者何以别之荅曰寸口關上尺

中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲和平雖劇當愈
陰陽偏而爲病平而爲和故雜病之脉内傷外感之不同則氣口人迎不等上下盛衰之不同則浮中沉尺寸不等況傷寒乎今寸關尺脉皆同等故爲陰陽和平而自愈也針經禁服篇云寸口人迎兩者相應若引繩大小齊等者名曰平人言手之寸口脉與喉旁之人迎脉齊等爲平人後條云六脉陰陽俱停必先振慄汗出而解者是也或曰寸關尺各有本部當見之脉如前章所謂菽數輕重者春夏秋冬升降浮

沉亦各有本部當見之脉各得其位而不踰其等故
曰同等病當愈如成註所釋則寸浮而尺浮尺浮則
反等矣何謂病愈
立夏得洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發
其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濈濈自出
者明日便解矣何以言之立夏得洪大脉是其時脉故
使然也四時倣此
此論不即病之傷寒也春弦夏洪秋毛冬石當其時
得之則爲平脉不治自愈非其時得之則爲病脉須
兼視其證而治之乃愈也夏得洪脉而其人病身體

疼重此爲邪客之故亦須治乃解倣此推之則春弦
秋毛冬石有應脉之證者皆當治之而愈也
問曰凡病欲知何時得何時愈荅曰假令夜半得病明
日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得病夜半
愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中愈者以陰
得陽則解也
太陽病巳至未解陽明病申至戌解少陽病寅至辰
解太陰病亥至丑解少陰病子至寅解厥陰病丑至
卯解三陽晝解三陰夜解
寸口脉浮爲在表沉爲在裏數爲在府遲爲在藏假令

脉遲此爲在藏也
前云凡脉浮大數動滑此名陽也沉濇弱弦微此名
陰也九難曰何以別知藏府之病然數者府也遲者
藏也數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒故以
別知藏府之病也此傷寒分三陽三陰證之總訣歟
若夫雜病則脉之數者藏亦有熱脉之遲者府亦有
寒勿泥此也
趺陽脉浮而濇少陰脉如經也其病在脾法當下利何
以知之若脉浮大者氣實血虚也今趺陽脉浮而濇故
知脾氣不足胃氣虚也以少陰脉弦而浮纔見此爲調

脉故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也
趺陽脉一名會元一名衝陽在脚背上去陷谷三寸
脉動處乃足陽明胃經之動脉也胃者水穀之海五
藏六府之長若胃氣以憊水穀不進穀神以去藏府
無所稟受其脉不動而死也故必診趺陽脉以察胃
氣焉切脉下指輕重以爲氣血之分浮而大者輕取
有餘重取不足故爲氣實血虚之診也若輕取之便
不大而濇知脾胃之氣不足也脾胃之氣不足則轉
輸失職而下利之證見矣下利屬少陰證故云少陰
脉如經也少陰之脉微細沉緊而此乃以弦而浮爲

調脈寂宜活看滑浮弦而反滑數知其便膿此桃花湯證也少陰動脈名太谿在足內踝後跟骨上

寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗也

風陽物也其體在外其傷在衛飄然流行于上者其脈不得不浮也寒陰物也其體在中其傷在榮拳然斂急而斂縮者其脈不得不緊也榮衛俱病骨節煩疼當開戶以逐之故以麻黃發汗

趺陽脈遲而緩胃氣如經也趺陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數

先微脈反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞕氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則飢數脈不時則生惡瘡也

胃脈遲緩其本也若浮而數則病矣胃氣傷故虛虛故浮脾氣動故躁躁故數知為誤下之過也榮衛之氣脾胃之氣所為也胃傷脾動則內虛榮衛之邪乘虛而內陷則浮數二脈數脈先退而浮脈獨存其人必大便鞕氣噫而除也何以言之本以數脈動脾脾雖躁動不能持久故數脈先改而微因數改微故知脾氣不治脾氣不治則難為津液津液少胃中乾燥故知大便鞕脾病亦當得後與氣乃除故知氣噫而除也本以浮脈為胃傷則止于傷而已故浮脈獨存不與數脈俱退邪氣獨留于脾無與于胃胃中空虛故飢而甚然也胃能納脾不能化則食而不消所以然者脾中真火乃能殺穀邪熱不能殺穀也穀不化反留胃中之熱則潮熱而渴勢所必至矣[illegible]若數脈不改微而徑改為遲緩病退之後與未病之前一息四至度數如法如是而飢飢而能食食即能

化不為患也若數脈不改遲緩又不改微非時而見則脾氣躁動不已脾主肌肉必生惡瘡也

師曰病人脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知血亡也

大發其汗傷陽也宜其脈微而惡寒又數大下之傷陰也宜其脈濇而發熱於陽兩傷則氣血俱損而首末獨言亡血者何也曰下之亡陰不必言汗亦血類故也內虛之人夏月陽氣在表則其內無陽也故不勝其寒冬月陽氣在裏裏陰既虛不能當陽之灼爍也故不勝其熱然諸脈弦細而濇按之無力者往往惡寒苦振慄不止或時發躁蒸蒸而熱如坐甑中必得去衣居寒處或飲寒水則便如故其振寒復至非必遇寒乃寒遇冬乃熱也此但立其例論其理耳

王海藏曰六月大熱之氣反得大寒之病氣難布息身涼脈遲何以治之答曰病有標本病熱為本大寒為標用涼則順時而失本用熱則順本而失時故不從乎標本而從乎中治中治者何用溫是也然既曰溫則不能治大寒之病治大寒者非熱藥不可若用熱藥又似非溫治之例然當以熱藥冷飲之此脈得四至之治病便與冷之氣少熱或用熱藥亦中治也非溫而何孫子和朱彥修皆嘗治六月惡寒之證以寒涼藥而愈不可拘於海藏之說大抵用藥之寒熱全視脈之遲數也此言持以時令故取海藏之說爾　陰虛則發熱冬月發熱者當補其陰使濟于陽而熱自

除矣茯苓補心湯之類是也若誤用寒涼之藥火無所附而升走必發躁欲坐井中宜熱藥治之

脈浮而大心下反鞕有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻

論言脈浮大應發汗反下之為逆此以心下鞕有熱知傳邪入裏故捨脈而從證也屬熱者宿屎在藏也屬府者小便不利也大便則許攻之小便則不許何也曰利大便則內藥除利小便則不能也徒走其津液耳故傷寒治小便不利惟汗後脈浮煩渴始用五苓散利之耳其它或溫或下或和解或泄濕熱或固下散寒或溫經散濕或解錯雜之邪或散傳陰之熱閉未嘗輕事乎分利也既云不令發汗不令溲數故又繼之曰溲數則大便鞕汗多則熱愈其汗少則大便難以發汗利小便亡其津液致有此失故不可不慎也遲為陰為寒為藏藏者至陰之藏故病之所主門腎虛若遽攻之恐損腎氣所以得此脈者雖其當攻之證未可遽攻徐俟之以觀其變可也或曰論言結胸脈浮大不可下下之則死而此又言宜下何矛盾也曰心下鞕與結胸不同結胸又與痞不同病發

于陽下之成結胸病發于陰下之成痞結胸爲痞不痛所謂發于陰者謂更已受邪但下證未全而遂下之故結而爲痞視結胸爲稍輕痞與結胸既有陰陽輕重之别則結胸之藥不可施之痞也故太陽病誤下之心下痞按之濡其脉關上浮者大黄黄連瀉心湯主之則夫按之鞕未經下者其當攻可知也如陽明病心下鞕滿不可攻之攻之利遂不止者死要須詳審勿令誤也

脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下體形不仁乍靜乍亂此爲命絶也

火之將滅也必明脉來浮洪涌盛此將去人體之兆也然得此脉者又必兼下一二證而後可斷其命絶也

又未知何藏先受其災若汗出髮潤喘不休者此爲肺先絶也

肺主氣上皮毛故也經曰病人肺絶三日死何以知之口張但氣出而不還

陽反獨留形體如煙熏直視搖頭此心絶也

心之于卦離也陽外而陰内也陽反獨留則心血已盡而惟浮游之火獨光耳經曰病人心絶一日死何以知之肩息回視立死一云目停停二日死

唇吻反青四肢漐習者此爲肝絶也

肝脉支者從目系下頰裏環唇内經曰病人肝絶八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗出如水不止一云二日死

環口黧黑柔汗發黄者此爲脾絶也

脾其華在唇四白環口黧黑其華萎矣經曰病人脾絶十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹泄利不覺出無時度一云五日死

溲便遺失狂言目反直視者此爲腎絶也

經曰病人腎絶四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目中黄色腰中欲折自汗出如流水一云人中平七日死

又未知何藏陰陽前絶若陽氣前絶陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絶陽氣後竭者其人死身色必赤腋下温心下熱也

靈樞經曰人有兩死而無兩生故陰竭則身青而冷陽竭則身赤而温又云五陰氣俱絶則目系轉轉則目運目運者爲志先死志先死則遠一日半死矣六陽氣絶則陰與陽相離離則腠理發泄絶汗乃出故

旦占夕死夕占旦死此所謂陰陽即藏府也
寸口脉浮大而醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令大汗出水得寒氣冷必相得其人必䭇趺陽脉浮浮則為虛浮虛相搏故令氣䭇言胃氣虛竭也脉滑則為噦此為醫咎責虛取實守空迫血脉浮鼻中燥者必衄也

脉大病當熱而反寒者假借所傷之邪而言也然下文曰水得寒氣冷必相搏則似又以寒為胃中之虛寒矣既是真寒而非邪熱又何以見大脉邪寒氣相搏氣是何氣浮脉也虛浮脉之因也脉與因何以相

搏甚皆吾所不能解也成氏亦依回釋之而不復致疑何哉䭇與噎通噦即俗謂之吃逆者是也李東垣王海藏以噦為乾嘔而陳無擇又以噦名欬逆皆失之按靈樞經云噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已今之吃逆以此三法施之則立止若以施之乾嘔嘔不為止也且嘔自有嘔條而又別出此不已贅乎若古之所謂欬即今之所謂嗽與吃逆又無干也䭇與噦皆因妄下之後復與之水以發其汗胸中虛氣逆而作輕則為䭇重則為噦以趺陽脉候之浮則為䭇滑則為噦䭇即東垣書所

載咽喉噎塞口開目瞪之證然無聲也噦則氣自臍下直衝上出於口而吃吃然作聲頻頻相續為實可治半時噦一聲為虛難治也夫䭇者壯為水寒相搏以小青龍湯去麻黃加附子散其水寒而可矣至于噦則又有熱氣擁鬱氣不得通而成者輕則和解之重則有攻下之候熱病至噦則病已極非若渴煩等輕緩之候也論云脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄黃芩湯主之

諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也

傷寒書舉類傷寒四證為脚氣為痰飲為傷食為虛煩至于癰疽之發憎寒壯熱大似傷寒仲景已論及而後人乃忽之甚可歎也然人身有焮腫痛楚之處未有不自覺者此條所舉必是內癰故曰畜積有膿也素問云肝滿腎滿肺滿皆實即為腫王注云滿謂脉氣滿實腫謂癰腫大抵口中欬即胸中隱痛心胸甲錯振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者肺癰也小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脉滑而數者腸癰也胃脘隱隱而痛手不可近胃脉沉細人

迎逆而感者胃脘癰也內傷外感以人迎氣口別之故內傷之脉人迎平而胃脘癰之脉人迎反盛未有不誤以爲傷寒者宜辨之異也京口錢氏室女患腸癰發熱庸醫作傷寒治之絕其飲食旬餘而斃垂斃之日下膿數升方知是癰欲救已無及矣嗚呼仲景之書豈可以弗讀哉

脉浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者差遲遲爲無陽不能作汗其身必痒也

脉浮而遲陽氣虛所以遲也氣怫鬱不得越故面熱赤並與邪爭故戰惕猶天氣將蒸而成雨豈不可以

汗乎而陽氣衰微不能作汗故當六七日傳經盡當汗出而解之時而反發熱其身不痛而痒也經曰諸痒爲虛是也論云太陽病如瘧狀若脉微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小汗之

寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所爲陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相溷內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛蝕斷也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲濁榮衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則爲癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入嚏而出之聲嗢咽塞寒厥相逐爲熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令便數難臍築湫痛命將難全

成氏注以沉浮分陰陽爲太陽少陰俱有緊脉俱浮而緊者太陽也沉而緊者少陰也又論文但言寸口則於得以關前爲陽關後爲陰故不得不以浮沉分

之然古人所云寸口多兼關尺而言如難經及後章所云水下二刻一周循環當復寸口虛實見焉皆謂手太陰之經渠穴也知此則不必曲爲疏解而無診下焦于寸部之謬矣此所言邪似是濕邪蓋有天之濕霧露雨是也天本乎氣故中上中表中經絡有地之濕水泥是也地本乎形故中下中裏中筋骨今既明言清邪爲霧露之氣矣則所謂濁邪者非地之濕氣而何內經曰風者上先受之濕者下先受之又云清濕地氣之中人也必從足始若濁邪是寒邪則足太陽當先受之不應獨由下焦而見足膝逆冷便溺

妄出之證也或曰痛痺則與濕痺脉證不同何也曰
濕痺重而此輕惟重則濕氣內流而趨下故其脉沉
細其證關節疼痛而煩身色如熏黃惟輕則所傷者
陰冷之氣而已故其脉緊其證頭痛項強腰痛與傷
寒同也惟濁邪中下焦則與傷寒異以其徑犯藏府
筋骨肌肉而不止于經絡故耳內慄者身不戰而但
心惕惕然慄也難經論五邪以中濕為腎邪其病足
脛寒而逆則此云足膝逆冷為腎中濕邪明甚其便
溺妄出者則河間所謂邪客於腎部手足厥陰之經
廷孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痺神無所用
故津液滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也然則治
之奈何曰治天之 當同司天法濕上甚而熱者平
以苦溫佐以甘辛以汗為故而止當於傷寒法中選
用治地之濕當同在泉法濕淫於內治以苦熱佐以
酸淡以苦燥之以淡泄之如四逆白通之類亦可也
三焦者原氣之別使主通行上中下之三氣經歷於
五藏六府也通行三氣即紀氏所謂下焦與真元之
氣即元氣也上達至於中焦中焦受水穀精悍之氣
化為榮衛榮衛之氣與真元之氣通行達於上焦也
三焦通則上下內外左右皆通也今表氣微虛裏氣

微急三焦相溷則內外不通矣上焦病則鬱熱內發
而為口糜蝕齗中焦病則脾不能化胃之所納而胃
中為之濁胃中濁則無水穀之精氣以為榮無水穀
之悍氣以為衛而榮衛何由通也榮衛不通則血凝
泣而不流矣夫人之所以生者榮衛耳榮衛不通而
可以久乎榮行脉中衛行脉外不能一時而通必有
先後欲知榮與衛之孰為先通則於何而驗之若衛
氣先通者必先小便赤黃而後發癰膿若榮氣先通
者必先嚏唱咽塞而後下血如豚肝也內經謂三焦
者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉
氣化則能出矣夫豈獨從下焦膀胱之氣化而已肺
主通調水道下輸膀胱而脾病者九竅不通小便不
利是小便亦從上中二焦之氣化者也故衛氣通則
小便赤黃也內經論嚏或因寒氣下臨心氣上從或
因熱氣下臨肺氣上從李明之云陽氣不得出者曰
塞陰氣不得下降者曰噎又曰塞者五藏之所主陰
也血也噎者六府之所主陽也氣也二者皆由陰中
伏陽而作也由此觀之則嚏塞皆陰陽寒熱相搏之
候耳故曰寒厥相逐為熱所擁血凝自下狀如豚肝
衛氣者溫分肉充皮膚肥腠理司開闔故其通也以

濆脹榮氣者其津液注之于脉化以為血以榮四末
注五藏六府故其通也以下血也若榮衛之氣畢竟
不通則陰陽俱厥脾氣孤弱不能散精上歸于肺通
調水道故五藏之液注下下焦不闔散至圊而難無
氣以出之故也臍中如築拘急而痛腎間動氣將絶
人故也故曰命將難全

脉陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥踡卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日已來其人微發熱手足温者此為欲解或到八日已上反大發熱者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹内痛者必欲利也

此脉此證表裏陰陽混殽未的疑似之間慎勿妄投
藥餌徐而俟之若七日之外當解之候微熱手足温
則為邪氣解而自愈矣若八日以上當解不解反發
大熱此為逆證不可治也

脉陰陽俱緊至於吐利其脉獨不解緊去入安此為欲解若脉遲至六七日不欲食此為晩發水停故也為未解食自可者為欲解

〔成〕脉陰陽俱緊為寒氣甚於上下至於吐利之後緊
脉不罷者為其脉獨不解緊去則人安為欲解若脉
遲至六七日不欲食者為吐利後脾胃大虚内經曰
飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺
通調水道下輸膀胱水精四布五經並行脾胃氣强
則能輸散水飲之氣若脾胃氣虚則水飲内停也所
謂晩發者後來之疾也若至六七日而欲食者則脾
胃已和寒邪已散故云欲解○緊病脉當作三節看

病六七日手足三部脉皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也

〔成〕煩熱也傳經之時病人身大煩口噤不能言内作
躁擾則陰陽爭勝若手足三部脉皆至為正氣勝邪
氣微陽氣復寒氣散必欲解也

若脉和其人大煩目重瞼内際黄者此為欲解也

〔成〕脉經曰病人兩目眥中有黄色起者其病方愈病
以脉為主若目黄大煩脉不和者邪勝也其病為進
目黄大煩而脉和者為正氣已和故云欲解

脉浮而數浮為風數為虚風為熱虚為寒風虚相搏則洒淅惡寒也

〔成〕内經曰有者為實無者為虚氣并則無血血併則
無氣風則傷衛數則無血浮數之脉風邪并於衛衛
勝則榮虚也衛為陽風搏於衛所以為熱榮為陰榮
氣虚所以為寒風并於衛者發熱惡寒之證具矣

張云今皆以數脈為熱今仲景以數脈為虛寒何也數則為虛乃陰陽偏負之理非專寒而專熱也浮為陽浮數為陽虛沉為陰沉數為陰虛陽虛者則惡寒藥用溫熱抑陰扶陽陰虛者則發熱藥用寒凉抑陽扶陰使二氣平其病自愈且如病在表脈浮而數乃陰盛陽虛汗之則愈下之則死病在裏脈沉而數乃陽盛陰虛下之則愈汗之則死經論昭然非有差別

脈浮而滑浮為陽滑為實陽實相搏其脈數疾衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此為不治

成浮為邪氣并於衛而衛氣勝滑為邪氣并於榮而榮氣實邪氣勝實擁於榮衛則榮衛行速故脈數疾一息六至曰數平人脈一息四至衛氣行六寸今一息六至則衛氣行九寸計過平人之半是脈數疾知衛氣失其常度也浮滑數疾之脈發熱汗出而當解若不解者精氣脫也必不可治經曰脈陰陽俱盛大汗出不解者死

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也

成千金方以喘嗽為欬逆上氣者肺病散者心脈是心火刑於肺金也內經曰心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日而死以形見其損傷故也○此內傷也

問曰脈有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作効象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分明師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關

成寸為上部關為中部尺為下部　按此下後人以為出王叔和今按脈經載張仲景論脈止此一條則知非叔和自撰也

榮衛流行不失衡銓

成衡銓者稱也可以稱量輕重內經曰春應中規夏應中矩秋應中衡冬應中權榮行脈中衛行脈外榮衛與脈相隨上下應四時不失其常度也

腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

成腎北方水王於冬而脈沉心南方火王於夏而脈洪肺西方金王於秋而脈浮肝東方木王於春而脈弦此為經常銖分之不差也

出入升降漏刻周旋水下二刻一周循環

成人身之脈計長一十六丈二尺一呼脈行三寸一吸脈行三寸一呼一吸為一息脈行六寸一日一夜

漏水下百刻人一萬三千五百息脉行八百一十丈
五十度周於身則一刻之中人一百三十五息脈行
八丈一尺水下二刻人二百七十息脉行一十六丈
二尺一周於身也脉經之行終而復始若循環之無
端也
當復寸口虛實見焉
成經脈之始從中焦注于手太陰寸口二百七十息
脉行一周身復還至於寸口寸口爲脉之經始故以
診視虛實焉經曰虛實死生之要皆見于寸口之中
變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉潛水畜支

飲急弦動則爲痛數則熱煩
成風傷陽故脉浮虛寒傷陰故脈牢堅滀積於內者
謂之水畜故脈沉潛支散於外者謂之支飲故脉急
弦動則陰陽相搏相搏則痛生焉數爲陽邪氣勝陽
勝則熱煩焉
設有不應知變所緣三部不同病各異端
成脉與病不相應者必緣傳變之所致三部以候五
藏之氣隨部察其虛實焉
太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸審察表裏三
焦別焉知其所舍消息診看料度藏府獨見若神爲子

條記傳與賢人
成太過不及之脉皆有邪氣干於正氣審察在表在
裏入府入藏隨其所舍而治之
師曰呼吸者脉之頭也
成難經曰一呼脈行三寸一吸脉行三寸以脉隨呼
吸而行故言脉之頭也　此乃胗脉入門之要法
初持脉來疾去遲此出疾入遲名曰內虛外實也初持
脉來遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也
成外爲陽內爲陰內經曰來者爲陽去者爲陰是出
以候外入以候內疾爲有餘有餘則實遲爲不足不

足則虛來疾去遲者陽有餘而陰不足故曰內虛外
實來遲去疾者陽不足而陰有餘故曰內實外虛
問曰上工望而知之中工問而知之下工脉而知之願
聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼病人自
卧師到診其脉沉而遲者知其差也何以知之表有病
者脉當浮大今脉反沉遲故知愈也
成望以觀其形證問以知其病所苦脈以別其表裏
病苦發熱身疼邪在表也當卧不安而脉浮數今病
人自卧而脈沉遲者表邪緩也是有裏脈而無表證
則知表邪當愈也

假令病人云腹内卒痛病人自坐師到脉之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脉當沉而細今脉浮大故知愈也

〔成〕腹痛者裏寒也痛甚則不能起而脉沉細今病人自坐而脉浮大者裏寒散也是有表脉而無裏證也則知裏邪當愈是望證問病切脉三者相參而得之可為十全之醫鍼經曰知一為上知二為神知三神且明矣

師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脉自和處言已愈

發熱煩極則不能靜卧今向壁靜卧知熱已去

設令向壁卧聞師到不驚起而盻視若三言三止脉之嚥唾者此詐病也設令脉自和處言汝病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

〔成〕詐病者非善人以言恐之使其畏懼則愈醫者意也此其是歟　此非治法亦為詐病規模彼以詐病此以詐治

師持脉病人欠者無病也

〔成〕鍼經曰陽引而上陰引而下陰陽相引故欠陰陽不相引則病陰陽相引則和是欠者無病也

脉之呻者病也

呻為呻吟之聲身有所苦則然也

言遲者風也

〔成〕風客於中則經絡急舌強難運用也

搖頭言者裏痛也

〔成〕裏有病欲言則頭為之戰搖

行遲者表強也

〔成〕表強者由筋絡引急而行步不利也

坐而伏者短氣也

〔成〕短氣裏不和也故坐而喜伏

坐而下一脚者腰痛也

〔成〕内經曰腰者身之大關節也腰痛為大關節不利故坐不能正下一脚以緩腰中之痛也

裏實護腹如懷卵物者心痛也

〔成〕心痛則不能伸仰護腹以按其痛

師曰伏氣之病以意候之今月之内欲有伏氣假令舊有伏氣當須脉之若脉微弱者當喉中痛似傷非喉痺也病人云實咽中痛雖爾今復欲下利

〔成〕冬時感寒伏藏於經中不即發者謂之伏氣至春分之時伏寒欲發故云今月之内欲有伏氣假令伏

氣已發當須脉之審在何經得脉微弱者知邪在少陰少陰之脉循喉嚨寒氣客之必發咽痛腎司開闔少陰治在下焦寒邪內甚則開闔不治下焦不約必成下利故云雖爾咽痛復欲下利

問曰人病恐怖者其脉何狀師曰脉形如循絲累累然其面白脫色也

成內經曰血氣者人之神恐怖者血氣不足而神氣弱也脉形似循絲累累然面白脫色者鍼經曰血奪者色夭然不澤其脉空虛是知恐怖為血氣不足

問曰人不飲其脉何類師曰其脉自濇脣口乾燥也

成濇為陰雖主亡津液而脣口乾燥以陰為主內故不飲也　此節疑有闕文

問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色乍白乍赤

成愧者羞也愧則神氣怯弱故脉浮而面色改變不常也

問曰經說脉有三菽六菽重者何謂也師曰脉者人以指按之如三菽之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨者腎氣也

成菽豆也難經曰如三菽之重與皮毛相得者肺部也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也各隨所主之分以候藏氣

假令下利寸口關上尺中悉不見脉然尺中時一小見脉再舉頭者腎氣也若見損脉來至為難治

成脉經曰冷氣在胃中故令脉不通下利不見脉則冷氣客於脾胃今尺中時一小見為脾虛腎氣所乘脉再舉頭者脾為腎所乘也若尺中之脉更或損為腎氣亦衰脾復勝之鬼賊相刑故云難治是脾勝不應時也

問曰脉有相乘有縱有橫有逆有順何也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

成金勝木水勝火縱者言縱任其氣乘其所勝橫者言其氣橫逆反乘所不勝也縱橫與恣縱恣橫之義通水為金子火為木子子行乘母其氣逆也母行乘子其氣順也

問曰脉有殘賊何謂也師曰脉有弦緊浮滑沉濇此六者名曰殘賊能為諸脉作病也

成為人病者名曰入邪風寒暑濕傷於外也飢飽勞
逸傷於內也經脉者榮衛也榮衛者陰陽也其爲諸
經脉作病者必由風寒暑濕傷於榮衛客於陰陽之
中風則脉浮寒則脉緊中暑則脉滑中濕則脉濇傷
於陰則脉沉傷於陽則脉浮所以謂之殘賊者傷良
曰殘害良曰賊以能傷害正氣也
問曰脉有災怪何謂也師曰假令人病脉得太陽與形
證相應因爲作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下
利腹中痛師曰我前來不見此證今乃變異是名災怪
又問曰何緣作此吐利荅曰或有舊時服藥今乃發作

故名災怪耳
成醫以脉證與藥相對而反變異爲其災可怪故名
災怪　自二菽六菽已下至災怪脉凡五段皆診治
之法
問曰東方肝脉其形何似師曰肝者木也名厥陰其脉
微弦濡弱而長是肝脉也肝病自得濡弱者愈也
成難經曰春脉弦者肝東方木也萬物始生未有枝
葉故脉來濡弱而長故曰弦是肝之平脉肝病得此
脉者爲肝氣已和也
假令得純弦脉者死何以知之以其脉如弦直是肝藏
傷故知死也
成純弦者謂如弦直而不軟此中無胃氣爲真藏之
脉內經曰死肝脉來急益勁如新張弓弦
南方心脉其形何似師曰心者火也名少陰其脉洪大
而長是心脉也心病自得洪大者愈也
成心王於夏夏則陽外勝氣血淳溢故其脉來洪大
而長也
假令脉來微去大故名反病在裏也脉來頭小本大者
故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則
爲關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死

成心脉來盛去衰爲平來微去大是反本脉內經曰
大則邪至小則平微爲正氣大爲邪氣來以候表來
微則知表和去以候裏去大則知裏病內經曰心脉
來不盛去反盛此爲不及病在中頭小本大者即前
小後大也小爲正氣大爲邪氣則邪氣先在裏今復
還於表故名曰覆不云去而止云來者是知在表脉
經曰在上爲表在下爲裏汗者心之液上微爲浮之
而微頭小爲前小則表中氣虛故主汗出下微沉之
而微本大爲後大沉則在裏大則病進內經曰心爲
牡藏小腸爲之使今邪甚下行格閉小腸使正氣不

通故不得尿名曰關格脈經曰陽氣上出汗見於頭
今關格正氣不通加之頭有汗者則陽氣不得下通
而上脫也其無汗者雖作關格然陽未衰而猶可治
也

西方肺脉其形何似師曰肺者金也名太陰其脉毛浮
也肺病自得此脉若得緩遲者皆愈若得數者則劇何
以知之數者南方火火尅西方金法當癰腫爲難治也

成輕虛浮曰毛肺之平脉也緩遲者脾之脉脾爲肺
之母以子母相生故云皆愈數者心之脉火尅金爲
鬼賊相刑故劇肺主皮毛數則爲熱熱客皮膚留而
不去則爲癰瘍經曰數脉不時則生惡瘡

問曰二月得毛浮脉何以處言至秋當死師曰二月之
時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝
脉屬木應濡弱反得毛浮者是肺脉也肺屬金金來尅
木故知至秋死他皆倣此

成當春時反見秋脉爲金氣乘木肺來尅肝奪王脉
而見至秋肺王肝氣則絕故知至秋死也

師曰脉肥人責浮瘦人責沉肥人當沉今反浮瘦人當
浮今反沉故責之

成肥人肌膚厚其脉當沉瘦人肌膚薄其脉當浮今
肥人脉反浮瘦人脉反沉必有邪氣相干使脉反常
故當責之

師曰寸脉下不至關爲陽絕尺脉上不至關爲陰絕此
皆不治決死也若計其餘命死生之期期以月節尅之
也

成脉經曰陽生於寸動於尺陰生於尺動於寸寸脉
下不至關者爲陽絕不能下應於尺也尺脉上不至
關者爲陰絕不能上應於寸也內經曰陰陽離訣精
氣乃絕此陰陽偏絕故皆決死期以月節尅之者謂
如陽絕死於春夏陰絕死於秋冬也

師曰脉病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人
者短命則死人病脉不病名曰內虛以有穀神雖困無
苦

成脉者人之根本也脉病人不病爲根本內絕形雖
且強卒然氣脫則眩運僵仆而死不曰行尸而何人
病脉不病則根本內固形雖且羸止內虛爾穀神者
穀氣也穀氣既足自然安矣內經曰形氣有餘脉氣
不足死脉氣有餘形氣不足生

問曰翕奄沉名曰滑何謂也沉爲純陰翕爲正陽陰陽
和合故令脉滑關尺自平陽明脉微沉食飲自可少陰

脉微滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股内汗出陰下濕也

[成]脈來大而盛聚而沉謂之翕奄沉正如轉珠之狀也沉為藏氣故曰純陰翕為府氣故曰正陽滑者陰陽氣不為偏勝也關尺自平陽明脈微沉者當陽部見陰脈則陰偏勝而陽不足也陽明胃脈胃中陰多故食飲自可少陰脈微滑者當陰部見陽脈則陽偏勝而陰不足也以陽湊陰分故曰陰實股與陰少陰之部也今陽熱湊陰必熏發津液泄達於外股内汗出而陰下濕也 [評]沉為純陰翕為正陽陰陽和合

故名滑古人論滑脉雖云往來前却流利宛轉替替然與數相似仲景三語而足也 按翕奄沉三字狀得滑字最好夫翕者合也奄者忽也當脉氣合聚而盛之時奄忽之間即已沉去是名滑也仲景恐人誤認滑脉為沉故下文又曰滑者緊之浮名也曰沉曰浮若異而同更須慧解觀上文緊者如轉索無常也一句則知浮為轉索無常之浮非輕手便得有常之名也沉為翕奄之沉非重取乃得一定之説也仲景下字具有史筆不可草草看過故趙嗣真曰今人不解作秦漢文字觀可謂善讀仲景之書矣

問曰曾為人所難緊脉從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊也假令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃中虚冷故令脉緊也

陽舒緩陰縮急陰化為寒攣然收斂氣血以堅其為脉也寧得不急經曰緊脉帶數如切繩狀一曰如轉索無常故有寒則見

寸口衛氣勝名曰高

寸口通關尺而言高謂脉來浮而有力衛氣主表浮以候之其體在上今浮中有力是衛氣盛也以其在上故謂之高有升而不降之義焉

榮氣盛名曰章

章明也條也往來分明有條理也今滑脉為血實之診殆近是乎

高章相摶名曰綱

綱總也以榮衛俱盛故謂之總

衛氣弱名曰惵

舉之濡弱恍忽故謂之惵

榮氣弱名曰卑

榮主血為陰按以候之其脉沉而無力故謂之卑

惵卑相摶名曰損

慄卑相搏陰陽俱虛總謂之損舉按俱無力也

衛氣和名曰緩

緩爲胃脉胃合衛氣衛氣和故見緩脉

榮氣和名曰遲

遲爲脾脉脾合榮氣榮氣和故見遲脉

遲緩相搏名曰強

榮衛俱和故遲緩相搏不亦強乎

寸口脉緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮鞕陰陽相抱榮衛俱行剛柔相搏名曰強也

此釋上一句之義此爲平脉非病脉也

趺陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘡也

[成]趺陽之脉以候脾胃滑則穀氣實是爲胃實緊則陰氣勝是爲脾強以脾胃一實一強而相搏擊故令痛也若一強一弱相搏則不能作痛此脾胃兩各強實相擊府藏自傷而痛譬若以手把刃而成瘡豈非自貽其害乎 按此則敦阜大過之脉也

寸口脉浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆

[成]經曰浮爲虛內經曰大則病進浮則爲正氣虛大則爲邪氣實在尺則邪氣關閉下焦裏氣不得下通故不得小便在寸則邪氣格拒上焦使食不得入故吐逆 [丹]謹按難經云吸入腎與肝夫盈天地之間者一元之氣也氣之升者爲陽氣之降者爲陰腎足少陰也肝足厥陰也位居下主吸與入其所吸之氣不能達腎至肝而還者此陰之弱也浮大之脉屬陽見于寸者陽氣偏盛陰不得配之也爲格主吐逆此無陰則嘔謂見于尺者陰血不足陽往乘之也爲關主不得小便此東垣滋腎丸之意趺陽胃脉氣不宣

血不濡名曰關格主水穀不化與食不得入亦陽有餘陰不足故有升而無降也何註文不之及而以邪氣關格閉拒爲言歟

趺陽脉伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格

[成]伏則胃氣伏而不宣中焦關格正氣壅塞故吐逆而水穀不化濇則脾氣濇而不布邪氣拒于上焦故食不得入 有婦人病吐逆大小便不通煩亂四逆漸無脉一日與大承氣湯二盞至半夜漸得大便脉漸生翼日乃安此是關格也宜審之

脈浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癮疹身體為痒痒者名泄風久久為痂癩

成痂癩者眉少髮稀身有乾瘡而腥臭內經曰脈風成癘

寸口脈弱而遲弱者衛氣微遲者榮中寒榮為血血寒則發熱衛為氣氣微者心內飢飢而虛滿不能食也

成衛為陽榮為陰弱者衛氣微陽氣不足也遲者榮中寒經中客邪也榮客寒邪搏而發熱也陽氣內微心內雖飢飢而虛滿不能食也　緩遲與弱遲雖止一字之差却有千里之謬成氏不合註而分解無怪其上下不相同也

趺陽脈大而緊者當即下利為難治

成大為虛緊為寒胃中虛寒當即下利下利脈當微小反緊者邪勝也故云難治經曰下利脈大者為未止

大為實大為虛上下紛紛更易不一者只要識得虛者正氣虛實者邪氣實之義　已上以脈知病

寸口脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上也

成弱者陽氣不足陽能消穀陽氣不足則不能消化穀食緩者胃氣有餘則胃中有未消穀物也故使噫而吞酸食卒不下氣填于膈上也金匱要略曰中焦未和不能消穀故令噫　弱緩與遲緩亦不同

趺陽脈緊而浮浮為氣緊為寒浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下少陰脈不出其陰腫大而虛也

成浮為胃氣虛緊為脾中寒胃虛則滿脾寒則痛虛寒相搏腸鳴而轉轉則膈中之氣因而下泄也若少陰脈不出則虛寒之氣至于下焦結於少陰而聚于陰器不得發泄使陰腫大而虛也

寸口脈微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不足榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢呑中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

成夫養三焦者血也護三焦者氣也榮衛俱損不能相將而行三焦無所依仰身體為之頑痺而不仁內經曰榮氣虛則不仁鍼經曰衛氣不行則為不仁榮為血血不足則煩疼榮屬心榮弱心虛則口難言衛為陽陽微則惡寒衛為氣氣虛則數欠三焦因榮衛不足無所依仰其氣不能歸其部金匱要略曰上焦

竭善噫上焦受中焦氣中焦未和不能消穀故令噫耳下焦竭卽遺溺失便以上焦在膈上物未化之分也不歸者不至也上焦之氣不至其部則物未能傳化故噫而酢吞中焦在胃之中主腐熟水穀水穀化則思食中焦之食不歸其部則水穀不化故云不能消穀引食下焦在膀胱上口主分別清濁溲小便也下焦不歸其部不能約制溲便故遺溲　三焦病各分其證自有三法存焉

趺陽脉沉而數沉爲實數消穀緊者病難治

成沉爲實者沉主裏也數消穀者數爲熱也緊爲肝

脉見於脾部木來尅土爲鬼賊相刑故云難治　按緊與弦當有分別恐未可便以緊爲弦也首卷曰弦則爲減金匱要略曰脉緊如轉索無常者有宿食也以義求之則弦爲虛而緊爲實矣

寸口脉微而濇微者衛氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黄榮氣不足面色青榮爲根衛爲葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

子能令母虛肺主氣氣虛則脾色見於面而黄心主血血衰則肝色見於面而青肺臭腥脾液涎也榮虛則寒慄衛虛則欬逆

趺陽脉浮而芤浮者衛氣衰芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絶

成經曰衛氣盛名曰高高者暴狂而肥榮氣盛名曰章章者暴澤而光其身體瘦而不肥者衛氣衰也肌肉甲錯而不澤者榮氣傷也宗氣者三焦歸氣也四屬者皮肉脂髓也榮衛衰傷則宗氣亦微四屬失所滋養致斷絶矣

寸口脉微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脉道乃行而入於經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絶經名曰血崩

成衛爲陽微爲亡陽脉微者衛氣疎衛溫分肉肥腠理衛氣既疎皮膚不得溫肌則空虛也經曰緩者胃氣有餘有餘爲實故云緩者胃氣實内經曰食入於胃淫精於脉是穀入於胃脉道乃行也鍼經曰飲而液滲於絡合和於血是水入於經其血乃成也胃中穀消水化而爲血氣今衛疎榮盛是榮氣強而衛氣弱也衛氣弱者外則不能固密皮膚而氣爲之疎内則不能衛護其血而血爲之崩經常也三焦者氣之道路衛氣疎則氣不循常度三焦絶其常度也　按經文曰而入於經則而字乃承上文穀字水亦在其

中矣註引鍼經水入於經乃是互文以見意仲景獨重於穀故用而字若欠理會則血爲水所化也豈理也哉玩合和於三字則成氏之說欠瑩

趺陽脉微而緊緊則爲寒微則爲虛微緊相搏則爲短氣

成中虛且寒氣自短矣

少陰脉弱而濇弱者微煩濇者厥逆

成煩者熱也少陰脉弱者陰虛也陰虛則發熱以陰部見陽脉非大虛也故生微煩厥逆者四肢冷也經曰陰陽不相順接便爲厥厥者手足厥冷是也少陰脉濇者陰氣濇不能與陽相順而接故云逆也　此段不當作二證

趺陽脉不出脾不上下身冷膚鞕

成脾胃爲榮衛之根脾能上下則水穀消磨榮衛之氣得以行脾氣虛衰不能上下則榮衛之氣不得通營於外故趺陽脉不出身冷者衛氣不温也膚鞕者榮血不濡也

少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥當刺期門巨闕

成尸厥者爲其從厥而生形無所知其狀若尸故名尸厥少陰脉不出則厥氣客於腎而腎氣微少精血厥氣上奔填塞胸膈壅遏陽氣使宗氣反聚而血結心下鍼經曰五穀入于胃其糟粕津液宗氣分爲三隧宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸又曰榮氣者泌其津液注之於脉化而爲血以榮四末今厥氣大甚宗氣反聚而不行則絶其呼吸血結心下而不流則四體不仁陽氣爲厥氣所擁不能宣發退下至陰股間與陰相動仁者柔也不仁者言不柔和也爲寒熱痛痒俱不覺知者也陽氣外不爲使内不得通榮衛俱不能行身體不仁狀若尸也内經曰厥氣上行滿脉去形刺期門者以通心下結血刺巨闕者以行胸中宗氣血氣流通厥氣退則甦矣

寸口脉微尺脉緊其人虛損多汗知陰常在絶不見陽也

成寸微爲亡陽尺緊爲陰勝陽微陰勝故云虛損又加之多汗則愈損陽氣是陰常在而絶不見陽也

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊爲寒諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾濇不通口急不能言戰而慄也

成衛陽也微為衛氣微故云亡陽榮血也濡為榮氣弱故云亡血弱為陰虛虛則發熱緊為陰勝故為寒諸乘寒者則陰陽俱虛而為寒邪乘之也寒乘氣虛抑伏陽氣不得宣發遂成厥也甚則為鬱冒不知人也不仁為強直而無覺也為尸厥焉以胃無穀氣致脾澀不通於上下故使口急不能言戰者寒在表也慄者寒在裏也

問曰濡脉何以反適十一頭師曰五藏六腑相乘故令十一

成濡弱者氣血也往反有十一頭頭者五藏六府共有十一也

問曰何以知乘府何以知乘藏師曰諸陽浮數為乘府諸陰遲濇為乘藏也

成府陽也陽脉見者為乘府也藏陰也陰脉見者為乘藏也　陽濡而弱則乘于府陰濡而弱則乘于藏

藥性傷寒方藥雖成氏註釋頗為明了而未能盡藥性之奧故特以仲景一百一十三方中所用九十種藥性采諸家之說以發明之學者誠能熟玩而詳究焉則長沙用藥製方之遺意庶幾不昧而亦可以引而伸之觸類而長之矣

風升生　味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也

麻黃　氣溫　味苦辛　氣味俱薄陽也升也無毒手太陰之劑　入足太陽經　走手少陰經陽明經藥　發太陰少陰經汗　垣輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之邪客於陽分皮毛之間腠理閉拒營衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣不可不禁　海麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥二物雖為太陽證藥其實榮衛藥也心主榮為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為手少陰心之劑傷寒傷風而咳嗽用麻黃桂枝即湯液之源也

珍仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代名醫解釋皆隨文傅會未有究其精微者時珍常繹思之似有一得與昔人所解不同云津液為汗汗即血也

在榮則為血在衛則為汗夫寒傷榮榮血內濇不能外通於衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒夫風傷衛衛氣外泄不能內護於榮榮氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身天之象也是證雖屬乎太陽而肺實受邪氣其證時兼面赤怫鬱欬嗽有痰喘而胸滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻而肺氣膹鬱故用麻黃甘草同桂枝引出榮分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱肱活人書夏至後加

石膏知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾泄東所以補西也使以薑棗行脾之津液而和榮衛也下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加人參以益肺氣也朱肱加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也　修治去蘆及根節剉細以流水煮二三沸掠去上沫不爾使人心煩

服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍以撲前湯止之　凡服麻黃藥須避風一日不爾病復作也

細辛　氣溫　味大辛　氣厚於味陽也無毒　少陰經藥　手少陰引經之藥　主治少陰頭痛如神當少用之獨活為使溫少陰經散水寒以去內寒　治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯也易老治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明則白芷厥陰則川芎吳茱萸少陽則柴胡用者隨經不可差細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活相類

修治揀去雙葉者以瓜水浸一宿曬乾剉細用

柴胡　氣平　味微苦　氣味俱輕陽也升也無毒

少陽經厥陰經引經之藥　除虛勞煩熱　解肌熱去往來寒熱早晨潮熱　婦人產前產後必用之藥　善除本經頭痛非他藥能止　治心下痞胸脇痛　海在經主氣在臟主血前行則惡熱却退則惡寒唯氣之微寒味之薄者故能行經　能去臟府內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮為嫩陽故以少陽當之　修治去蘆剉細竹篩齊之用

葛根　氣平　味甘　無毒　陽明經引經藥　足陽

明經行經的藥　治脾胃虛而渴除胃熱解酒毒
陶生葛搗汁飲解温病發熱　須仲景治傷寒有葛
根湯以其主大熱解肌發腠理故也　潔升陽生津
脾虛作渴者非此不除勿多用恐傷胃氣張仲景治
太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根又有葛根黃
芩黃連解肌湯是用此以斷太陽入陽明之路非即
太陽藥也頭顱痛如破乃陽明中風可用葛根葱白
湯為陽明仙藥若太陽初病未入陽明而頭痛者不
可便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明為引賊
破家也　珍本草十劑云輕可去實麻黃葛根之屬

蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽
明經藥兼入脾經脾主肌肉所以二味藥皆輕揚發
散而所入迥然不同也　修治鋤細竹篩齊之用

升麻　氣平　味苦甘　味薄氣厚陽中之陰也無毒

陽明經本經藥　亦能解肌肉間熱此手足陽明
經傷風之的藥也若補脾胃非此為引用不能補若
得葱白白芷之類亦能走手陽明太陰　發散本
經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣上行　升
麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽
明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽
明矣投湯不當非徒無益而又害之也　朱氏云瘀
血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥
也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同
何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明
耳　仲景云　陽明病若發汗若利小便亡津液胃
中乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽几几
無汗者葛根湯發之若几几自汗者表虛也不宜用
此朱氏用升麻者以表實無汗也　修治刮去黑皮
去腐爛裏白者佳剉細竹篩齊之用

葱白　氣平　味辛　無毒　氣厚味薄升也陽也入
手太陰足陽明經專主發散以通上下陽氣故活人
書治傷寒頭痛如破用連鬚葱白湯主之張仲景治
少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆脈微者白通湯主
之內用葱白若面色赤者四逆湯加葱白腹中痛者
去葱白成無己解之曰腎惡燥急食辛以潤之葱白
辛溫以通陽氣也　珍葱乃釋家五葷之一生辛散
熟甘溫外實中空肺之菜也肺病宜食之肺主氣外
應皮毛其合陽明故所治之證多屬太陰陽明皆取
其通氣發散之功通氣故能解毒及理血病氣者血
之帥也氣通則血活矣故金瘡等用之皆有殊効

瓜蒂甜瓜蒂也　氣寒　味苦　有毒　病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此為胸中有寒也當吐之太陽中暍身熱疼重而脉微弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脉微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實煩當吐之宿食在上脘者當吐之並宜以瓜蒂散主之惟諸亡血虛家不可與瓜蒂散也　成高者越之在上者涌之故越以瓜蒂香豉之苦涌以赤小豆之酸酸苦涌泄為陰也　同難經云上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死此飲食內傷塡塞胸中食傷太陰風木生發之氣伏于下宜瓜蒂散吐之素問所謂木鬱則達之也吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣若尺脉絕者不宜用此恐損眞元令人胃氣不復也　珍瓜蒂乃陽明經除濕熱之藥故能引去胸脘痰涎頭目濕氣皮膚水氣黃疸濕熱諸證　甜瓜蒂以圓而短者良若長如瓠子者此名菜瓜不可用也氣足時其蒂自然落在蔓上采得繫屋東有風處吹乾用

桔梗　氣微溫　味苦辛甘　有小毒　味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經　治咽喉痛利肺氣　潔桔梗淸肺氣利咽喉其色白故為肺部引經與甘草同行為舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也　珍朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中消穀破積又治肺癰唾膿用桔梗甘草取其苦辛淸肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯　去蘆米泔浸一宿焙乾剉片竹篩齊用

熱浮長也氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是

桂枝　氣熱　味甘辛　有小毒　陽中之陽浮也仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者乃枝條也非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃嫩小桂條也尤宜入治上焦藥用　潔氣之薄者桂枝也氣

之厚者桂肉也氣薄則發泄桂枝上行而發表氣厚
則發熱桂肉下行而補腎此天地親上親下之道也
〔海〕桂枝入足太陽經桂心入手少陰經血分桂肉
入足少陰太陰經血分細薄者為枝為嫩厚脂者為
肉為老去其皮與裏當其中者為桂心　〔冠〕素問云
辛甘發散為陽故仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此
藥正合辛甘發散之意本草三種之桂不用牡桂菌
桂者此二種性止於温不可以治風寒之病也然本
經止言桂仲景又言桂枝者取枝上皮也　〔海〕或問
本草言桂能止煩出汗而張仲景治傷寒有當發汗

凡數處皆用桂枝湯又云無汗不得服桂枝汗家不
得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用桂枝甘
草湯此又用桂枝閉汗也一藥二用與本草之義相
通否乎曰本草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脉
止煩出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風
陰弱者汗自出衛實榮虛故發熱汗出又云太陽病
發熱汗出者此為榮弱衛強陰虛陽必湊之故皆用
桂枝發其汗此乃調其榮氣則衛氣自和風邪無所
容遂自汗而解非桂枝能開腠理發出其汗也汗多
用桂枝者以其調和榮衛則邪從汗出而汗自止非

桂枝能閉汗孔也昧者不知出汗閉汗之意遇傷寒
無汗者亦用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗字當認
作出字汗自然發出非若麻黄能開腠理發出其汗
也其治虛汗亦當逆察其意可也　〔成〕桂枝本為解
肌若太陽中風腠理緻密榮衛邪實津液禁固其脉
浮緊發熱汗不出者不可與此必也皮膚疎泄自汗
脉浮緩風邪干於衛氣者乃可投之發散以辛甘為
主桂枝辛熱故以為君而以芍藥為臣甘草為佐者
風淫所勝平以辛苦以甘緩之以酸收之也以薑棗
為使者辛甘能發散而又用其行脾胃之津液而和

榮衛不專於發散也故麻黄湯不用薑棗專於發汗
不待行其津液也　心桂枝氣味俱輕故能上行發
散於表內實則肉桂補腎用柳桂枝辛熱散經寒引
導陽氣若正氣虛者以辛潤之散寒邪治奔豚　按
經云桂枝入咽陽盛則斃故陽盛者為禁藥也桂能
動血血熱者為禁藥也木得桂而枯肝不足者為禁
藥也　修治桂之毒在皮故方中皆去皮用
附子　氣熱　味辛　有大毒　潔大辛大熱氣厚味
薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至為諸經引
用之藥　海入手少陰三焦命門之劑其性走而不

守非若乾薑止而不行　〔珍〕熟附配麻黃發中有補
仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附
配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脈四逆湯是
也　〔珍〕凡用烏附藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰
寒在下虛陽上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治
之以熱則拒格而不納熱藥冷飲下嗌之後冷體既
消熱性便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反
治之妙也昔張仲景治寒疝內結用蜜煎烏頭近効
方治喉痺用蜜炙附子含之嚥汁朱丹溪治疝氣用
烏頭梔子並熱因寒用也東垣治馮翰林姪陰盛格

陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈來七八至但按之則
散用薑附湯加人參投半斤服之得汗而愈此則神
聖之妙也　〔吳〕附子乃陰證要藥凡傷寒傳變三陰
及中寒夾陰雖身大熱而脈沉者必用之或厥冷腹
痛脈沉細甚則唇青囊縮者急須用之有退陰回陽
之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似不敢
用附子直待陰極陽竭而用之已遲矣且夾陰傷寒
內外皆陰陽氣頓衰必須急用人參健脈以益其元
佐以附子溫經散寒捨此不用將何以救之　〔虞摶〕
附子稟雄壯之質有斬關奪將之氣能引補氣藥行

十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以滋
養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風
寒引溫暖藥達下焦以祛除在裏之冷濕　按八味
丸用桂附乃取其大辛以潤腎燥丹溪謂行地黃之
滯海藏云補命門相火皆非也　童子小便中浸透
濕紙包裹灰火內煨熟如芋香為度去皮臍切片子
用

乾薑　氣溫　味辛　無毒　〔潔古〕氣薄味厚半浮半沉
可升可降陽中之陰也　大辛大熱陽中之陽其用
有四通心助陽一也去臟府沉寒痼冷二也發諸經

之寒氣三也治感寒腹痛四也腎中無陽脈氣欲絕
黑附子為引水煎服之名薑附湯亦治中焦寒邪寒
淫所勝以辛散之也又能補下焦故四逆湯用之乾
薑本辛炮之稍苦故止而不移所以能治裏寒非若
附子行而不止也理中湯用之者以其回陽也　〔垣〕
乾薑生辛炮苦陽也生則逐寒邪而發散炮則除胃
冷而守中多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣
故也須以生甘草緩之辛熱以散裏寒同五味子用
以溫肺同人參用以溫胃也　〔海〕乾薑心脾二經氣
分藥也故補心氣不足或言乾薑辛熱而言補脾今

理中湯用之言泄不言補何也蓋辛熱燥濕泄脾中寒濕邪氣非泄正氣也　白淨結實者良宜炮用

生薑　氣微溫　味辛　氣味俱厚浮而升陽也　無毒　成薑棗味辛甘專行脾之津液而和榮衛藥中用之不獨專於發散也　垣生薑之用有四制半夏厚朴之毒一也發散風寒二也與棗同用辛溫益脾胃元氣溫中去濕三也與芍藥同用溫經散寒四也孫真人云薑為嘔家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃口曰俗以心下為胃口者非也咽門之下受有形之物及胃之系便是胃口與肺系同行故能入肺而開胃口也曰人云夜間勿食生薑令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反開發之違天道矣若有病人則不然也生薑屑比之乾薑則不熱比之生薑則不濕以乾生薑代乾薑者以其不僭故也俗言上牀蘿蔔下牀薑薑能開胃蘿蔔消食也

吳茱萸　氣溫　味辛　有小毒　海辛苦熱氣味俱厚陽中陰也半浮半沉入足太陰經血分少陰厥陰經氣分　潔其用有三去胸中逆氣滿塞止心腹感寒疛痛消宿酒為白豆蔻之使也　垣治寒在咽嗌噎塞胸中經言噎膈不通食不下食則嘔令人口開目瞪寒邪所結氣不得上下此病不已令人寒中腹滿彭脹下利宜以吳茱萸之苦熱泄其逆氣用之如神諸藥不可代也　海衝脈為病逆氣裏急宜此主之震坤合見其色綠故仲景吳茱萸湯當歸四逆湯方治厥陰病及溫脾胃皆用此也　湯洗去苦味曬乾搗用

蜀椒　氣溫　味辛　有毒　主邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目利五藏　寶凡人嘔吐服藥不納者必有蚘在膈間蚘聞藥則動動則藥出而蚘不出但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良蓋蚘見椒則頭伏也觀此則仲景治蚘厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也許學士云大凡腎氣上逆須以川椒引之歸經則安　去目及閉口者炒去汗手搓細用

巴豆　氣溫　味辛　有大毒　潔氣薄味厚體重而沉降陰也　垣性熱味辛有大毒浮也陽中陽也　潔乃斬關奪門之將不可輕用　海若急治為水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治為消堅磨積之劑炒去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知

也張仲景治百病客忤備急丸用之

厚朴　氣溫　味苦辛　無毒　氣味俱厚體重濁而微降陰中陽也　埴可升可降　能除腹脹若虛弱人雖腹脹宜斟酌用之寒脹是也大熱藥中兼用結者散之神藥也誤服脫人元氣切禁之　海本草言厚朴治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹滿果泄氣乎果益氣乎蓋與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉利藥同用則厚腸胃大抵其性味

苦溫用苦則泄用溫則補也故成氏云厚朴之苦以泄腹滿　苦能下氣故泄實滿溫能益氣故散濕滿

去皮銼碎薑汁浸透微炒竹篩齊用

濕化成

戊濕其本氣平　其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之
己土其本味鹹　其兼味辛甘鹹苦在人以脾應之

人參　氣溫　味甘微苦　氣味俱薄浮而升陽也陽中微陰　無毒　埴人參甘溫能補肺中元氣肺氣旺則四藏之氣皆旺精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景云病人汗後身熱亡血脉沉遲者下利身凉脉微血虛者並加人參古人血脫者益氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也若單用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補形形與氣者有無之象也

李人參生用氣寒熟用氣溫味甘補陽微苦補陰氣主生物本乎天味主成物本乎地氣味生成陰陽之造化也凉者高秋清肅之氣天之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升甘者濕土化成之味地之陽也其性浮微苦者火土相生之味地之陰

也其性沉人參氣味俱薄氣之薄者生降熱升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則宜生參凉薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛而渴脉洪而大者用黃蘗佐人參　孫真人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痿厥用生脉散以瀉熱火而救金水君以人參之甘寒瀉火而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎津而收耗氣此皆補天元之眞氣非補熱火也　余每治傷

寒温熱等證爲庸醫妄汗誤下已成壞病死在旦夕者以人參一二兩用童便小便煎之水浸冰冷飲之立起　去蘆剉細用

朮

氣温　味甘　[illegible]也可升可降入足太陰陽明手太陰[illegible]太陽[illegible]　垣本經止言朮未分蒼白而蒼朮[illegible]注壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不傳入脾也以其經泔浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之異其餘主治則同　潔蒼朮與白朮主治同但比白朮氣重而體沉若除上濕發汗功最大若補中焦除脾胃

濕力少不如白朮腹中窄狹者須用之

白朮能除濕益燥和中益氣利腰臍間血除胃中熱

潔其用有九温中一也去脾胃中濕二也除胃中熱三也強脾胃進飲食四也和胃生津液五也止肌熱六也四肢困倦嗜卧目不能開不思飲食七也止渴八也安胎九也凡中焦不受濕不能下利必須白朮以逐水益脾非白朮不能去濕非枳實不能消痞故枳朮丸以之爲君　搗碎紗羅子羅過用

當歸　氣温　味甘辛　氣味俱輕陽也　陽中微陰無毒　入手少陰經　足太陰經厥陰經　和血補血尾破血身和血　潔其用有三一心經本藥二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸之甘温能和血辛温能散內寒苦温能助心散寒使氣血各有所歸　海入手少陰以其心生血也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參黃芪則補氣而生血從牽牛大黃則行氣而補血從桂附茱萸則熱從大黃芒硝則寒佐使分定用者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬木故以血藥主之　修治酒製焙曬乾去蘆剉細用

生地黃　氣寒　味甘微苦　味厚氣薄陰中之陽無毒　入手太陽經少陰經之劑　垣涼血補血補腎水真陰不足　錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血亦治之入四散例　病人虛而多熱宜加用之　戴陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬爲虛火之證者宜地黃之屬以滋陰退陽　本經所謂乾地黃者或陰乾或日乾或火乾皆謂之乾地黃今藥肆所謂生地黃是也故本草又云生者尤良若取涼血退熱之功非新掘鮮者搗汁用之不得奇效　搗碎用忌

鐵器萊菔

甘草　氣平　味甘　氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰經　〔垣〕陽不足者補之以甘甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其平

〔海〕五味之用苦泄辛散酸收鹹軟甘上行而發而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沉可

上可下可外可內有和有緩有補有泄居中之道盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃補之之意又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之是矣　補中宜炙用瀉火宜生用

萎蕤　氣平　味甘　無毒　能升能降陽中陰也主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒熱去虛勞客熱頭痛不安加而用之良　〔垣〕潤肺除熱　〔珍〕萎蕤性平味甘柔潤可食故朱肱活人書治風溫自汗身重語言難出用萎蕤湯以之爲君藥予每用治虛勞寒熱痁瘧及一切不足之證用代參芪不寒不燥大有殊功不止于去風熱濕毒而已此昔人所未闡者也　與黃精鈎吻二物相似萎蕤節上有鬚毛莖斑葉尖處有小黃

點爲不同采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸焙乾用

大棗　氣平　味甘　無毒　氣味俱厚陽也溫以補不足甘以緩陰血　〔成〕邪在榮衛者辛甘以解之故用薑棗以和榮衛生發脾胃升騰之氣張仲景治奔豚用大棗滋脾土以平腎氣也治水飲脇痛有十棗湯益土而勝水也　〔珍〕素問言棗爲脾之果脾病宜食之謂治病和藥棗爲脾經血分藥也若無故頻食則生蟲損齒爲害多矣按王好古云中滿者勿食甘甘令人滿故仲景建中湯心下痞者減餳棗與甘草

同例此得用棗之方矣 〔陶〕道家方藥以棗為佳餌
其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也
粳米 氣平 味甘苦 無毒 有早中晚三收以晚
白米為第一新熟者動氣經年者亦發病惟江南人
多收火稻貯倉至舂舂米食之即不發病宜人溫中
益氣補下元也 〔海〕本草諸家共言益脾胃如何白
虎湯用之入肺以其陽明為胃之經色為西方之白
故入肺也然治陽明之經即在胃也色白味甘寒入
手太陰又少陰證桃花湯用此甘以補正氣竹葉石
膏湯用此甘以益不足

食蜜 氣平 味甘 無毒 〔珍〕蜂采無毒之花釀以
大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五
清熱補中解毒潤燥止痛也生則性涼故能清熱熟
則性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故
能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和
可以致中故能調和百藥而與甘草同功仲景治陽
明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也
膠飴 氣溫 味甘 無毒 入太陰經 〔成〕脾欲緩
急食甘以緩之膠飴之甘以緩中也 〔海〕飴乃脾經
氣分藥也甘能補脾之不足 〔寇〕宗奭云多食動脾

氣亦助胃火
阿膠 氣平 味甘 無毒 氣味俱薄浮而升陽也
入手少陰足少陰厥陰經 得火良 藏器曰諸膠
皆主風止洩而驢皮主風為最 〔寇〕驢皮煎膠取其
發散皮膚之外也用烏者取烏色屬水以制熱則生
風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然 〔珍〕阿膠大要
只是補血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明
云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成氏云陰不足者
補之以味阿膠之甘以補陰血楊氏云凡治喘嗽不
論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性

和平為肺經要藥 剉如豆大或以蛤粉或以麩或
以草灰皆炒成珠研末用或以湯酒鎔化各從本方
半夏 氣平 味辛 有毒 生微寒 熟溫 生令
人吐 熟令人下 氣味俱薄沉而降陰中陽也
辛厚苦輕陽中陰也入手陽明太陰少陰三經 治
寒痰及形寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除胃寒進食
治太陰痰厥頭痛非此不能除 〔成〕辛者散也潤也
半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行水氣而
潤腎燥 〔海〕經云腎主五液化為五濕自入為唾入
肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為涕有痰曰嗽無

痰曰欬痰者因欬而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕潤燥也俗以半夏為肺藥非也止嘔吐為足陽明除痰為足太陰柴胡為之使故小柴胡湯中用之雖為止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又為足少陽陽明也　湯洗盡滑剉細用諸血證及口渴者禁用為其燥津液也孕婦忌之用生薑則無害

杏仁　氣溫　味甘苦冷利　有小毒　【象】氣薄味厚濁而沉墜降也陰也入手太陰經其用有三潤肺也

消食積也散滯氣也　【垣】杏仁散結潤燥除肺中風熱欬嗽杏仁下喘治氣也桃仁療狂治血也俱治大便秘當分氣血晝則便難行陽氣也夜則便難行陰血也故虛人便秘不可過泄脉浮者屬氣用杏仁陳皮脉沉者屬血用桃仁陳皮手陽明與手太陰為表裏賁門主往來魄門主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之　海仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆並用杏仁者為其利氣瀉肺解肌也　【修治】以湯浸去皮尖麩炒杵細用

桃仁　氣平　味苦甘辛　無毒　【垣】桃仁苦重於甘氣薄味厚沉而降陰中之陽手足厥陰經血分藥也苦以泄滯血甘以生新血故破凝血者用之其功有四治熱入血室一也泄腹中滯血二也除皮膚血熱燥痒三也行皮膚凝聚之血四也　成肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之桃仁之甘以緩肝散血故張仲景抵當湯用之以治傷寒八九日內有畜血發熱如狂小腹滿痛小便自利者又有當汗失汗熱毒深入吐血及血結胸煩躁譫語者亦以此湯主之與䖟蟲水蛭大黃同用　【修治】行血連皮尖潤燥活血去皮尖麩炒俱搗細用

麻子仁　氣平　味甘　無毒　手陽明足太陰藥也陽明病汗多胃熱便難三者皆燥也故用之以通潤也　寇宗奭云麻仁極難去殼取帛包置沸湯中浸至冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中曬乾新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完　先藏地中者食之殺人

雞子黃　氣溫　味甘　無毒　本草云陰不足補之以血若咽有瘡雞子一枚去黃苦酒傾殼中以半夏入苦酒中取殼置刀環上熬微沸去柤旋旋呷之又主除熱火瘡癇痓　卵白為肺肉皮毛卵黃為藏府

卵白象天卵黃象地故有陰陽表裏氣血之分焉

甘爛水　氣平　味甘　無毒　傷寒汗後臍下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之煎以甘爛水揚之無力取不助腎氣也　虞摶曰甘爛水甘溫而性柔故烹傷寒陰證等藥用之

潦水　卽霖雨後行潦之水亦取其發縱之極流而不滯不助濕也

漿水　氣微溫　味甘酸　無毒　卽酸泔水也或云煮粟米飲釀成　主調中引氣宣和強力通關開胃解煩去睡　[丹]漿水性涼善走故解煩渴而化滯物

按漿水能止渴以其酸也能化滯以其米味之變也亦猶神麴麥芽之消食非性涼善走之謂

燥降收氣之薄者陽中之陰[illegible]發[illegible]辛甘散平實涼是也

茯苓　氣平　味甘　無毒　潔性溫味甘而淡氣味俱薄浮而升陽也　[垣]止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍間血爲主治小便不通溺黃或赤而不利如小便利或數服之則大損人目如汗多人服之損眞氣夭人壽醫云赤瀉白補上古無此說　淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥也味甘平補陽益脾逐水濕淫所勝小便不利淡味滲泄陽也治水緩脾生津導氣　[海]入足少陰手足太陽色白者入辛壬癸赤者入丙丁伐腎邪小便多能止之小便澁能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明朱砂同用能祕眞味甘平如何是利小便　去皮搗細紗羅過用

澤瀉　氣平　味甘　無毒　潔沉而降陰也　[垣]甘鹹寒降陰也　[海]陰中微陽入足太陽少陰經　除濕之聖藥也治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目盲　[寇]澤瀉之功長於行水張仲景治水畜渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知

其長於行水本草引扁鵲云多服病人眼誠爲行去其水也凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用之仲景八味丸用之者亦不過接引桂附等歸就腎經別無他意　[海]本經云久服明目扁鵲云多服昏目何也易老云去脬中宿垢以其味鹹能瀉伏水故也瀉伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故昏目　[王]寇宗奭之說王好古體之猶謂八味丸以地黃爲君餘藥佐之非止補血兼補氣也所謂陽旺則能生陰血也地黃山茱萸茯苓牡丹皮皆腎經之藥附子官桂乃右腎

命門之藥皆不待澤瀉之接引而後至也則八味丸之用此蓋取其瀉腎邪養五藏益氣力起陰氣補虛損五勞之功而已雖能瀉腎從于諸補藥羣衆之中則亦不能瀉矣　珍澤瀉氣平味甘而淡淡能滲泄氣味俱薄所以利水而洩下脾胃有濕熱則頭重而目昏耳鳴澤瀉滲去其濕則熱亦隨去而土氣得令清氣上行天氣明爽故澤瀉有養五藏益氣力治頭旋聰明耳目之功若久服則降令太過清氣不升真陰潜耗安得不目昏耶仲景地黄丸用茯苓澤瀉者乃取其瀉膀胱之邪氣非引接也古人用補藥必兼

瀉邪邪去則補藥得力一闢一闔此乃玄妙後世不知此理專一于補所以久服必致偏勝之害　搗碎紗羅過用

猪苓　氣平　味甘微苦　無毒　潔氣味俱薄升而微降與茯苓同　珍淡甘平降也陽中陰也　海甘重於苦陽也入足太陽足少陰經　燥除濕比諸淡滲藥大燥亡津液無濕證勿服　須仲景治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐名爲水逆冬時寒嗽如瘧狀者亦與猪苓此即五苓散也猪苓茯苓朮各三兩澤瀉五分桂二分細搗篩水服方寸匕日三多飲暖水汗出即愈利水道諸湯劑無如此駛今人皆用之　垣苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除濕利小便　去黑皮裏白者佳搗羅過用

通草　氣平　味辛甘而淡　無毒　氣平味薄降也陽中陰也　治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用　潔瀉肺利小便甘平以緩陰血　垣本草十劑通可去滯通草防已之屬是也夫防已大苦寒能瀉血中濕熱之滯又通大便通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也肺受熱邪津液氣化之

源絕則寒水斷流膀胱受濕熱癃閉約縮小便不通宜此治之其證胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或閉塞不通脛痠脚熱並宜通草主之凡氣味與之同者茯苓澤瀉燈草猪苓皂角瞿麥車前子之類皆可以滲濕利小便泄其滯氣也又曰木通下利泄小腸火利小便與琥珀同功無他藥可比　去麤皮剉細竹篩齊之用

滑石　氣寒　味甘　無毒　潔性沉重能泄上氣令下行故曰滑則利竅治前陰竅澁不利利竅不比與滲淡諸藥同　海入足太陽經滑能利竅以通水道

為至燥之劑猪苓湯用滑石阿膠同爲滑劑以利水
道葱豉生薑同煎去滓澄清以解利淡味滲泄爲陽
故解表利小便也若小便自利者不宜用 【珍】滑石
利竅不獨小便也上能利毛腠之竅下能利精溺之
竅蓋甘淡之味先入于胃滲走經絡遊溢津氣上輸
于肺下通膀胱肺主皮毛爲水之上源膀胱司津液
氣化則能出故滑石上能發表下利水道爲蕩熱燥
濕之劑發表是蕩上中之熱利水道是蕩中下之熱
發表是燥上中之濕利水道是燥中下之濕熱散則
三焦寧而表裏和濕去則闌門通而陰陽利劉河間

之用益元散通治表裏上下諸病蓋是此意但未發
出耳 白者佳擣水飛用

芍藥 氣微寒 味酸而苦 氣薄味厚陰也降也
陰中之陽有小毒 入手足太陰經 【垣】補中焦之
藥得炙甘草爲佐治腹中痛夏月腹痛少加黄芩如
惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半
此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二
盞煎一半去皮用 脾經之藥收陰氣能除腹痛酸
以收之扶陽而收陰氣泄邪氣扶陰與生薑同用温
經散濕通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收甘
緩下利必用之藥 白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行
經止中部腹痛 東垣云但澁者爲上或問古今方
論中多以澁爲收今本經有利小便一句者何也曰
芍藥能停諸濕而益津液使小便自行本非通行之
藥所當知之又問有緩中一句何謂緩中曰損其肝
者緩其中又問當用何藥治之曰當用四物湯以
其内有芍藥故也赤者利小便下氣白者止痛散氣
血入手足太陰經大抵酸澁者爲上爲收斂停濕之
劑故主手足太陰經收降之體故又能至血海而入
於九地之下後至厥陰經也後人用赤瀉白補者以

其色在西方故補色在南方故泄也 難經云損其
肝者緩其中卽調血也 本草云能利小便非能利
之也以其腎主大小二便既用此以益陰滋濕故小
便得通也 腹中虛痛脾經也非芍藥不除補津液
停濕之劑 【修治】剉片肉熱者生用中寒者酒炒用

五味子 氣温 味酸 無毒 味厚氣輕陰中微陽
入手太陰經血分足少陰經氣分 【垣】收肺氣補
氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此與乾薑
同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之藥故治嗽
以之爲君但有外邪者不可驟用恐閉其邪氣必先

發散而後用之乃良有痰者以半夏爲佐喘者以阿膠爲佐但分兩少不同耳　海五味皮甘肉酸核中辛苦都有鹹味故名五味子仲景八味丸用此爲腎氣丸述類象形也　孫眞人云五月常服五味子以補五藏氣遇溽暑之時困乏無力無氣以動與人參黃芪麥門冬少加黃蘗煎湯服使人精神頓加兩足筋力涌出　又云六月常服五味子以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎故入手太陰足少陰也　生䜴碎用

麥門冬　氣寒　味甘微苦　陽中微陰降也無毒　入手太陰經氣分　垣治肺中伏火脉氣欲絕加五味子人參三味爲生脉之劑補肺中元氣不足　按涼而能補補而不泥無逾於麥門冬者傷寒勞復與夫溫熱病及雜病陰不濟陽而煩熱燥渴者用之以生津液濡枯而退熱最有奇功又與地黃阿膠麻仁同爲潤經益血復脉通心之劑與五味子枸杞子同爲生脉之劑　去心不宜用湯浸

天門冬　氣寒　味微苦　氣薄味厚陰也　陽中之陰無毒　入手太陰足少陰經氣分之藥　垣保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪爲主用之神効　苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門冬之功也　榮衛枯涸濕劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同爲生脉之劑此上焦獨取寸口之意　去心剉細用

枳實　氣微寒　味苦辛　無毒　潔氣厚味薄浮而升微降陰中陽也　垣沉也陰也　除寒熱破結實消痰癖治心下痞逆氣脇痛　海枳殼主高枳實主下高者主氣下者主血故殼主胸膈皮毛之病實主心腹脾胃之病大同小異朱肱活人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯非用此治心下痞也果知誤下氣將

陷而成痞故先用此使不致於痞也若已成痞而用此則失之晚矣不惟不能消痞反損胷中之氣先之一字有謂也　珍枳實枳殼氣味功用俱同上世亦無分別魏晉以來始分實殼之用潔古東垣又分治高治下之說大抵其功皆能利氣氣下則痰喘止氣行則痞脹消氣通則刺痛止氣利則後重除故以枳實利胸膈枳殼利腸胃然仲景治胸痺痞滿以枳實爲要藥諸方治下血痔利大便閉塞裏急後重又以枳殼爲通用則枳實不獨治下而殼不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已則二

物分之可也不分亦無傷　麩炒去瓤搗羅過用、
旋覆花　氣溫　味鹹甘　有小毒　主結氣脇下滿
除水去五藏間寒熱消胸上痰結唾如膠漆消堅軟
痞治噫氣通血脈　張仲景治傷寒汗下後心下痞
堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物
旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸
用之尤多　〔成〕鞕則氣堅旋覆之鹹以軟痞堅也
貝母　氣平　味辛苦　無毒　主傷寒煩熱淋瀝邪
氣風痓疝瘕腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直
咳嗽上氣止煩渴安五藏利骨髓　〔海〕貝母乃肺經

氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷
胸湯主之白散亦可以其內有貝母也成無己云辛
散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣　內口鼻中
有米許大者心一顆宜去之搗細用
烏梅　氣溫平　味酸濇　無毒　〔海〕烏梅脾肺二經
血分藥也能收肺氣治燥嗽肺欲收急食酸以收之
〔珍〕烏梅白梅所主諸病皆取其酸收之義惟仲景
治蚘厥烏梅丸及蟲䘌中用者取蟲得酸即止之義
稍有不同耳　梅花開於冬而實熟於夏得木之全
氣故其味最酸所謂曲直作酸也肝為乙木膽為甲

木人之舌下有四竅兩竅通膽液故食梅則津生者
類相感應也故素問云味過於酸肝氣以津又云酸
走筋筋病無多食酸不然物之味酸者多矣何獨梅
能生津耶　〔修治〕去核微炒用　忌猪肉
赤小豆　氣平　味甘酸辛　陰中之陽　無毒　〔圖〕
小豆逐津液利小便久服令人肌膚枯燥　〔海〕治水
者惟知治水而不知補胃則失之壅滯赤小豆消水
通氣而健脾胃乃其藥也　〔珍〕赤小豆小而色赤心
之穀也其性下行通乎小腸能入陰分治有形之病
故行津液利小便消脹除腫止吐而治下利腸澼解

酒病除寒熱癰腫排膿散血而通乳汁下胞衣產難
皆病之有形者久服則降令太過津血滲泄所以令
人則瘦身重也
苦酒 醋　氣溫　味酸　無毒　張仲景治黃汗有黃
芪芍藥桂枝苦酒湯治黃疸有麻黃醇酒湯用苦酒
清酒方見金匱要略蓋取其酸收之義而又有散瘀
解毒之功
寒沉藏也 味之厚者陰中之陰味厚則泄故苦鹹氣寒是
黃連　氣寒　味苦　無毒　氣味俱厚可升可降陰
中陽也入手少陰經其用有六瀉心藏火一也去中

焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之　海入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實瀉脾也爲子能令母實實則瀉其子治血防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使　去鬚剉細用

黃芩　氣寒　味苦　無毒　可升可降陰也　陰中微陽入手太陰血分　潔氣涼味苦甘氣厚味薄浮而升陽中陰也入手少陽陽明經酒炒則上行　湯黃芩之中枯而飄者瀉肺火利氣消痰除風熱消肌表之熱細實而堅者瀉大腸火養陰退陽補膀胱寒水滋其化源高下之分與枳實枳殼同例　潔黃芩之用有九瀉肺熱一也上焦皮膚風熱風濕二也去諸熱三也利胸中氣四也消痰膈五也除脾經諸濕六也夏月須用七也婦人產後養陰退陽八也安胎九也酒炒上行主上部積血非此不能除下利膿血腹痛後重身熱久不能止者與芍藥甘草同用之凡諸瘡痛不可忍者宜芩連苦寒之藥詳上下分身稍及引經藥用之　頌張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用之　珍潔古老人言黃芩瀉肺火治脾濕東垣言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪言黃芩治上中二焦火而仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽證下後心下滿而不痛瀉心湯並用之成無已言黃芩苦而入心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經矣蓋黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺即所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在半表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無已注傷寒論但云柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅斂腸胃之氣殊昧其治火之妙楊士瀛直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退熱乃寒能勝熱折火之本也仲景又云少陽病腹中痛者去黃芩加芍藥心下悸小

便不利者去黃芩加茯苓似與別錄治少腹絞痛利小腸之文不合成氏言黃芩寒中苦能堅腎故去之蓋亦不然至此當以意逆之辨以脉證可也若因飲寒受寒腹中痛及飲水心下悸小便不利而脈不數者是裏無熱證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者黃芩其可不用乎故善觀書者先求其理毋徒泥其文　去皮併黑腐剉細竹篩齊用

黃蘖　氣寒　味苦　無毒　氣味俱厚沉而降陰也苦厚微辛陰中之陽入足少陰經為足太陽引經藥　〔瑄〕治腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力於黃芪湯中少加用之使兩膝中氣力湧出痿即去矣蜜炒此一味為細末治口瘡如神癱瘓必用之藥　瀉膀胱之熱利下竅　瀉膀胱經火補本經及腎不足苦寒安蛕療下焦虛堅腎經曰苦以堅之　足少陰劑腎苦燥故腎停濕也梔子黃芩入肺黃連入心黃蘖入腎燥濕所歸各從其類也活人書解毒湯上下內外通治之　去皮剉碎生用則降實火熟用酒製則治上鹽製則治下蜜製則治中而不傷胃

梔子　氣寒　味苦　無毒　〔潔〕氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也　〔瑄〕沉也陰也入手太陰肺經血分　海藏本草不言梔子能吐仲景用為吐藥梔子本非吐藥為邪氣在上拒而不納食令上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也或用為利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁用梔子豉湯煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用梔子以治肺煩香豉以治腎躁　仲景以梔子色赤味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁

〔瑄〕仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之因其虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液府藏無潤養內生虛熱非此物不可去也又治心經留熱小便赤澁用去皮梔子火煨大黃連翹炙甘草等分末之水煎三錢服無不利也　凡使須要如雀腦并鬚長有九路赤色者為上去心胸中熱用仁去肌表熱用皮治上焦中焦連殼用下焦去殼治血病炒黑用

石膏　氣寒　味甘辛　無毒　入手太陰經少陽經足陽明經　〔潔〕石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重

而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯熱小便濁赤大渴引飲自汗苦頭痛之藥仲景用白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有血虛發熱象白虎證及脾胃虛勞形體病證初得之時與此證同醫者不識而誤用之不可勝救也

垣石膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥身以前胃之經也胸前肺之室也邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎

之名又治三焦皮膚大熱入手少陽也凡病脈數不退者宜用之胃弱者不可用　按溫熱病煩熱而渴脈洪大而數且長者非用石膏不能取効冬月有此脈證亦宜用之仲景製白虎湯為正傷寒設也東垣處暑以後勿用之說不可拘泥　此即市所謂寒水石者也亦謂之軟石膏細理白澤者良碎之如粟米大先煮數十沸乃入餘藥以其氣味難出故也

知母　氣寒　味苦　氣味俱厚沉而降陰也　陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分　[垣]其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化原之陰仲景用此入白虎湯治不得眠者煩躁也煩出於肺躁出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米使不速下也又凡病小便閟塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而不渴者乃真水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以化法當用黃檗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自通　凡用揀肥潤裏白者去毛切引經上行則用酒浸焙乾下行則用鹽水潤焙　忌鐵

秦皮　氣寒　味苦　無毒　沉也降也　[海]主熱利下重下焦虛經云以苦堅之故用白頭翁黃檗秦皮苦之劑也治風寒濕痺目中青瞖白膜男子少精婦人帶下小兒驚癇宜作湯洗目俗呼為白樳木取皮漬水浸出青藍色與紫草同用以增光暈尤佳大戟為之使惡吳茱萸　珍梣皮色青氣寒味苦性濇乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其平木也治下利崩帶取其收濇也又能治男子少精益精有子皆取其濇而補也故老子云天道貴濇此藥乃服食及驚癇崩利所宜而人止知其治目一節幾於

廢棄良為可惋

白頭翁　氣寒　味苦辛　無毒　氣厚味薄可升可降陰中陽也　主温瘧狂易寒熱癥瘕積聚逐血止痛　張仲景治熱利下重用白頭翁湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿羶腥鼻衄無此不効毒痢有此獲功　㕍熱毒下利紫血鮮血者宜之

大黃　氣寒　味苦　無毒　氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒　㘣大黃苦峻下走用之于

下必生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或頭腫或膈上熱疾生也　㓂仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不効惟在量其虛實而已　㘣大黃苦寒善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也肝肺之火既退則陰血復其舊矣㓂氏不明說而云邪熱客之何以開悟後人也　㺯大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖

曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷榮血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所至為痞滿又云濁氣在上則生䐜脹是矣病發于陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成氏註傷寒論亦不知分別此義　㕍

本草稱大黄推陳致新其効最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處治非一切輕用也梁武帝因發熱欲服大黄姚僧坦曰大黄乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脉洪而實此有宿妨非用大黄無瘥理帝從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

芒硝 氣大寒 味鹹苦辛 有小毒 [成]內經云鹹味下泄爲陰又云鹹以耎之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹耎之熱盛者以寒消之故張仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以耎堅去實熱結不至堅者不可用也 [海]本草云朴硝味辛是辛以潤腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能耎堅也其義皆是本草言芒硝利小便而墮胎然傷寒妊娠可下者用此兼大黄引之直入大腸潤燥耎堅瀉熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺澀秘結俱爲水少火盛經

云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用芒硝大黄相須爲使也 [潔]芒硝氣薄味厚沉而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二也破堅積熱塊三也 [珍]朴硝是初得一煎而成者故力緊急而不和止可施於麤獷之人及傅塗之劑而已芒硝是朴硝淋過煉成故其性和緩仲景治傷寒多用之以此故也硝稟太陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也 生用

香豉 氣寒 味苦 無毒 陰中之陰也 主傷寒頭痛煩躁滿悶 生用 [珍]黑豆性平作豉則溫既經蒸署故能升能散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟則大能止汗亦麻黄根節之義也

茵陳蒿 氣微寒 味苦辛 無毒 陰中微陽入足太陽經 除煩熱主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利 [海]張仲景治傷寒熱甚發黃身面悉黃者用之極効一僧因傷寒後發汗不徹有留熱面身皆黄多熱期年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二

二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每用三錢水四合煎二合去滓食後温服以知為度此藥以山茵蔯為本故書之 海仲景茵蔯梔子大黃湯治濕熱也梔子蘗皮湯治燥熱也如苗澇則濕黃旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃用茵蔯附子湯大抵以茵蔯為君主而佐以大黃附子各隨其寒熱也 去莖用葉手搓碎用

栝蔞實 氣寒 淡甘微苦 無毒 海栝樓實治胸痺者以其味甘性潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼失其降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其為治嗽之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱為治消渴之神藥 珍張仲景治胸痺痛引心背欬唾喘息及結胸滿痛皆用栝蔞實乃取其甘寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味元不苦而隨文傳會爾 肥大結實者連子連皮細切用今人止用核仁非也

栝蔞根 氣寒 味甘微苦酸無毒 主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫毒瘀血及熱狂時疾 海栝蔞根純陰解煩渴行津液心中枯涸者非此不能除與辛酸同用導腫氣 珍栝蔞根味甘微苦酸其莖葉味酸酸能生津感召之理故能止渴潤枯微苦降火甘不傷胃昔人只言其苦寒似未深察 擣細羅過用

土瓜根 氣寒 味苦 有小毒 主療諸邪氣熱結逐四時骨節中水療天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞能吐下人

連軺 氣寒 味甘苦 有小毒 主下熱氣益陰精故仲景治傷寒瘀熱在裏欲發黃用麻黃連軺赤小豆湯

竹葉 氣寒 味甘 無毒 淡竹為上甘竹次之 主胸中痰熱欬逆上氣 諸竹性皆寒故知其葉一致也張仲景竹葉湯惟用淡竹 潔竹葉苦平陰中微陽 垣竹葉辛苦寒可升可降陽中陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之上衝

梓白皮 氣寒 味苦 無毒 主熱毒去三蟲時氣温病頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五合煎汁每服入合取瘥折熱之劑必以苦為主又曰大熱之氣寒以取之是也

葶藶子　氣寒　味辛　無毒　沉也陰中陽也　垣
葶藶大降氣與辛酸同用以導腫氣本草十劑云泄可去閉葶藶大黄之屬此二味皆大苦寒一泄血閉一泄氣閉蓋葶藶之苦寒氣味俱厚不減大黄又性過於諸藥以泄陽分肺中之閉亦能泄大便為體輕象陽故也　海苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病人虛實用之不可不審　同糯米焙熟去米擣細用

商陸　氣平　味辛　有毒　白者苦冷得大蒜良赤

者有大毒忌犬肉　主水腫疝瘕痺瘀五藏散水氣
珍苦寒沉也降也陰也其性下行專於行水與甘遂大戟異性而同功胃氣虛弱者不可用　取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿漉出入甑以黑豆葉一重商陸一重蒸之從午至亥取出去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

甘遂　氣寒　味苦　有毒　反甘草　主下五水逐留飲宿食破癥堅積聚利水穀道　潔味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用　珍腎主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治痰之本也不可過服但中病則止可爾仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也　去莖於槐砧上細剉用生甘草湯薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁漉出用東流水淘六七次以水清為度然後用麪包煨熟用

芫花　氣溫　味辛　有毒　張仲景治傷寒太陽證表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之若表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小

青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大小便而泄乃內經所謂潔淨府去陳莝法也夫飲有五皆由內啜水漿外受濕氣鬱蓄而為留飲流于肺則為支飲令人喘咳寒熱吐沫背寒流于脇則為懸飲令人欬唾痛引缺盆兩脇流于心下則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩運流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉重注痛或作水氣胕腫芫花大戟甘遂之性逐水泄濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐

用之取効甚捷不可過劑洩人眞元也陳言三因方
以十棗湯藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫
之證蓋善𢖍逐過者也楊士瀛直指方云破癖須用芫
花行水後便養胃可也　留數年陳久者良用時以
好醋煮十數沸去醋以水浸一宿晒乾用

大戟　氣寒　味苦辛　有毒　陰中微陽瀉肺損眞
氣得棗良　治十二水腹滿急痛積聚頭疼發汗利
大小腸　海大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝者苦
燥除之也　以漿水煮軟去骨晒乾用

蜀漆（常山苗也）　氣寒　味苦辛　純陽　有毒　主傷寒
（傷寒藥性）
寒熱溫瘧吐胸中痰飲破血　〔成〕火邪錯逆加蜀漆
之辛以散之　熱則不甚吐人

海藻　氣寒　味鹹　有小毒　反甘草　〔潔〕氣味俱
厚純陰沉也治癭瘤馬刀諸瘡堅而不潰者經云鹹
能耎堅榮氣不從外為浮腫隨各引經藥治之腫無
不消　成鹹味湧泄故海藻之鹹以泄水氣也　〔珍〕
海藻鹹能潤下寒能泄熱引水故能消癭瘤結核陰
㿗之堅聚而除浮腫脚氣留飲痰氣之濕熱使邪氣
自小便出也

龍骨　氣平　味甘　無毒　入手足少陰厥陰經
澀可去脫故成氏云龍骨能收斂浮越之正氣固大
腸而鎮驚　傷寒方中只入煎宜搗碎生用　忌魚
及鐵器

牡蠣　氣平（微寒）　味鹹　無毒　主治傷寒寒熱溫瘧
洒洒止汗止心痛溫大小腸去脇下堅滿　〔好〕能軟
積氣之痞經曰鹹能耎堅　入足少陰鹹為耎堅之
劑以柴胡引之能去脇下之鞕以茶引之能消結核
以大黃引之能除股間腫地黃為之使能益精收澀
止小便本腎經之藥也　火煅童便淬搗羅用

赤石脂　氣大溫　味甘酸辛　無毒　陽中之陰固
（傷寒藥性）
脫　〔海〕澀可去脫石脂為收斂之劑赤入丙白入庚
〔珍〕五石脂皆手足陽明藥也其味甘其氣溫其體
重其性澀澀而重故能收濕止血而固下甘而溫故
能益氣生肌而調中中者腸胃肌肉驚悸黃疸是也
下者腸澼泄利崩帶失精是也五種主療大抵相同
故本經不分條目但云各隨五色補五藏別錄雖分
五種而性味主治亦不甚相遠但以五味配五色為
異亦是強分爾赤白二種一入氣分一入血分故時
用尚之張仲景用桃花湯治下利便膿血取赤石脂
之重澀入下焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣

分而補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也
搗細綿裹煎

代赭石　氣寒　味苦甘　無毒　[海]入手少陰足厥陰經怯則氣浮重劑所以鎮之代赭之重以鎮虛逆故張仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞕噫氣不除者旋覆代赭湯主之　珍代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病　生搗細羅過用

禹餘糧　氣寒　味甘鹹　無毒　[珍]禹餘糧手足陽明血分重劑也其性濇故主下焦前後諸病　生搗細羅過用

鉛丹　氣微寒　味辛微鹹　無毒　主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣　仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹乃收歛神氣以鎮驚也　濇可去脫而固氣　體重而性沉其色紅故走血分

文蛤　氣平　味鹹　無毒　主惡瘡蝕五痔　傷寒病在陽當以汗解反以冷水噀之或灌之其熱欝遏不得出而反增者以文蛤散主之蛤水族也其性寒故用以利水而勝熱以為草木之液莫之能尚云爾
夢溪筆談云即今吳人所食花蛤也

水蛭　氣平　味鹹苦　有毒　畏石灰食鹽　主逐惡血瘀血破血癥積聚利水道　水蛭噉血之物也故能逐死血不用草木而用生物者以為欲血非生物不能活故用䖟虫亦此義　采得以簺竹筒盛待乾用米泔浸一夜暴乾展其身看腹中有子皆去之以冬豬脂煎令焦黃然後用

䖟蟲　氣平　味苦　有毒　主逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅　劉河間云䖟食血而治血因其性而為用也成無已云苦走血血結不行者以苦攻之故治畜血用䖟蟲乃肝經血分藥也
去翅足炒熟用

豬膚　氣寒　味甘　無毒　入足少陰經　豬水畜也其氣先入腎少陰客熱是以豬膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷痢

豬膽汁　氣寒　味苦　無毒　仲景白通湯加此汁與人尿鹹寒同與熱劑合去格拒之寒又與醋相合內穀道中酸苦益陰以潤燥瀉便　本經云治傷寒熱渴又白豬蹄可用雜青色者不可食瘀疾亦不可
與人尿同體補肝而和陰引置陽不被格拒能入心而通脉

婦人裩襠　主陰易病　當陰上割燒末服方寸匕若

女患陽易即男子視也陰陽易病者人患時行病起後合陰陽便相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利　妙在復氣

人尿　氣寒　味鹹　無毒　陶若人初得頭痛直飲人尿數升亦多愈合蔥豉作湯服彌佳　珍小便性溫不寒飲之入胃隨脾之氣上歸于肺下通水道而入膀胱乃其舊路也故能治肺病引火下行凡人精氣清者為血濁者為氣濁之清者為津液清之濁者為小便小便與血同類也故其味鹹而走血治諸血病也成無巳云傷寒少陰證下利不止厥逆無脈乾嘔欲飲水者加人尿豬膽汁鹹苦寒物于白通湯姜附藥中其氣相從可去格拒之患也

傷寒證治準繩帙之八